Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Angin-Heel-Halsspray

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 bis 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Angin-Heel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Angin-Heel beachten?
3. Wie ist Angin-Heel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Angin-Heel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Angin-Heel und wofür wird es angewendet?

Angin-Heel ist eine homöopathische Arzneispezialität.
Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Angin-Heel ist ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel, das sich aus verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln zusammensetzt, deren Arzneimittelbilder einander ergänzen.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Für dieses Arzneimittel ist folgendes Anwendungsgebiet zugelassen:

Zur Linderung von entzündungsbedingten Halsschmerzen und Schluckbeschwerden.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in dem genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach 3 bis 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Angin-Heel wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren
sowie bei Kindern von 6 bis 11 Jahren (nur nach ärztlicher Anordnung).

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Angin-Heel beachten?

Angin-Heel darf nicht angewendet werden,
- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen die Wirkstoffe, Pflanzen aus der Familie der Korbblütler oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Angin-Heel anwenden.

Im Fall einer Verschlechterung des Allgemeinbefindens, von Atembeschwerden, hohem Fieber, eitriger Entzündung im Hals oder heftigen Kopfschmerzen ist unverzüglich ein Arzt um Rat zu fragen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Angin-Heel darf nicht inhaliert werden.
Nicht in die Nase oder Augen sprühen!

Kinder
Angin-Heel ist für die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren nicht geeignet.
Die Anwendung dieses Arzneimittels darf bei Kindern von 6 bis 11 Jahren nur nach ärztlicher Anordnung erfolgen.

Anwendung von Angin-Heel zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Anwendung von Angin-Heel zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.
Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt. Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind bisher nicht bekannt geworden.

Angin–Heel enthält Alkohol und Spuren von Lactose
Dieses Arzneimittel enthält ca. 91 mg Alkohol (Ethanol) in 4 Sprühstößen. Bei geschädigter Schleimhaut kann ein brennendes Gefühl auftreten. Die Menge in 4 Sprühstößen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 3 ml Bier oder 1 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine weiteren wahrnehmbaren Auswirkungen.

Dieses Arzneimittel enthält Spuren von Lactose-Monohydrat (weniger als 10 mg pro maximale Tagesdosis). Diese Menge stellt kein Risiko für Patienten mit Lactoseintoleranz dar. Bitte nehmen Sie Angin–Heel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist Angin-Heel anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
Pro Gabe bis zu 4 Sprühstöße, je nach Beschwerden bis zu maximal 12-mal täglich

Kinder von 6 bis 11 Jahren:
Pro Gabe 1 bis 2 Sprühstöße, je nach Beschwerden bis zu maximal 8-mal täglich
Die Anwendung von Angin-Heel darf bei Kindern von 6 bis 11 Jahren nur nach ärztlicher Anordnung erfolgen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Art der Anwendung

Zur Anwendung in der Mundhöhle

Bedienungsanleitung



1. Sprühdüse drehen, bis sie waagrecht steht.
2. Den Zeigefinger auf den Sprühkopf legen. Vor dem erstmaligen Benutzen von Angin-Heel-Halsspray den Sprühkopf mehrmals kurz drücken, bis ein feiner Sprühnebel entsteht.
3. Die Sprühdüse in die Mundöffnung einführen und auf die entzündete Stelle richten.
4. Den Sprühkopf so oft betätigen, wie in der Dosierungsempfehlung angegeben. Dabei die Flasche möglichst senkrecht halten.

Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, dass die Sprühflasche nur von einer Person benutzt wird.
Das Halsspray darf nicht inhaliert werden.
Um eine Inhalation zu vermeiden, darf während der Verabreichung des Sprühstoßes nicht eingeatmet werden.
Kinder sind entsprechend anzuleiten, dass während des Einsprühens der Atem anzuhalten ist.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 3 bis 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Anwendung bei Kindern
Angin-Heel ist für die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren nicht geeignet.

Wenn Sie eine größere Menge von Angin-Heel angewendet haben, als Sie sollten
Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Anwendung von Angin-Heel vergessen haben
Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
Allergische Reaktionen können auftreten. Die Häufigkeit des Auftretens dieser Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: http://www.basg.gv.at/

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Angin-Heel aufzubewahren?

In der Originalverpackung aufbewahren.
Für die Originalpackung sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
Nach dem ersten Öffnen nicht über 30 °C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen beträgt 6 Monate.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Angin-Heel enthält

100 g enthalten:
- Die Wirkstoffe sind: Apis mellifica D4 5,357 g, Arnica montana D4 5,357 g, Atropa bella-donna D4 10,714 g, Hepar sulfuris D6 10,714 g, Hydrargyrum bicyanatum D8 5,357 g, Phytolacca americana D4 5,357 g.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Glycerol 85%, gereinigtes Wasser, Ethanol 96% , Spuren von Lactose-Monohydrat.

  1 Sprühstoß entspricht ca. 140 mg Lösung.

  Gesamtethanolgehalt ca. 20,6 Vol.-%

Wie Angin-Heel aussieht und Inhalt der Packung

Angin-Heel ist eine klare, farblose Lösung (Spray zur Anwendung in der Mundhöhle).
Die Lösung wird in Flaschen aus Braunglas mit gasfreiem Pumpsystem aus Kunststoff in einem Umkarton geliefert.

Packungsgröße: 20 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber und Hersteller:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2 - 4
76532 Baden-Baden
Deutschland

Vertrieb:
Schwabe Austria GmbH
Richard-Strauss-Straße 13
1230 Wien, Österreich

Z. Nr.: 338953

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2020.