

PACKUNGSBEILAGE

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Angina-Gastreu® R1 Tropfen zum Einnehmen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Angina-Gastreu R1 und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Angina-Gastreu R1 beachten?
3. Wie ist Angina-Gastreu R1 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Angina-Gastreu R1 aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Angina-Gastreu R1 und wofür wird es angewendet?

Angina-Gastreu R1 ist eine homöopathische Arzneispezialität.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Erkrankungen.

Angina-Gastreu R1 ist ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel, das sich aus verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln zusammensetzt, deren Arzneimittelbilder einander ergänzen.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Akute Infekte der oberen Luftwege und des Rachenraums, Halsschmerzen.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Angina-Gastreu R1 beachten?

Angina-Gastreu R1 darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Apis mellifica, Atropa bella-donna, Calcium iodatum, Kalium bichromicum (Chrom), Teucrium marum, Hydrargyrum bichloratum

(Quecksilber), Phytolacca americana oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind

- bei Nierenfunktionsstörungen,
- in Schwangerschaft und Stillzeit,
- bei Säuglingen und Kindern unter 6 Jahren

Auf Grund des Bestandteils Calcium iodatum darf das Arzneimittel bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Angina-Gastreu R1 einnehmen.

Bei Anzeichen einer Vereiterung der Rachenmandeln mit erschwerter Mundöffnung, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem Auswurf ist unverzüglich ein Arzt um Rat zu fragen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung und Behandlung bedürfen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Angina-Gastreu R1 enthält geringe Mengen an Ethanol (Alkohol), weniger als 100 mg pro Einzelgabe.

Kinder

Angina-Gastreu R1 darf bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden.

Die Anwendung von Angina-Gastreu R1 bei Kindern von 6 bis 12 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Einnahme von Angina-Gastreu R1 zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Einnahme von Angina-Gastreu R1 zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel (Nikotin, Alkohol, Kaffee) ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Angina-Gastreu R1 darf wegen des Bestandteils Hydrargyrum bichloratum (Quecksilber) in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

3. Wie ist Angina-Gastreu R1 anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Bei akuten Beschwerden alle 2 Stunden bis zu maximal 6 mal täglich 5 Tropfen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung auf 3 mal täglich je 5 Tropfen zu reduzieren.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen. Die Tropfen können bei Bedarf in etwas Wasser verdünnt eingenommen werden.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Das Arzneimittel sollte wegen des Bestandteils Hydrargyrum bichloratum (Quecksilber) ohne ärztlichen Rat nicht länger als eine Woche eingenommen werden.

Anwendung bei Kindern

Angina-Gastreu R1 darf bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden.

Die Anwendung von Angina-Gastreu R1 bei Kindern von 6 bis 12 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von Angina-Gastreu R1 eingenommen haben, als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Bei Einnahme des gesamten Inhaltes einer 22 ml-Flasche werden 6,5 g Alkohol und einer 50 ml-Flasche 15 g Alkohol aufgenommen. Dies kann insbesondere bei Kindern zu Symptomen wie Unruhe, Gleichgewichtsstörungen, Benommenheit oder Müdigkeit führen. In diesen Fällen sollte Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Wenn Sie die Anwendung von Angina-Gastreu R1 vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nach Anwendung kann auf Grund des Bestandteils Hydrargyrum bichloratum (Quecksilber) vermehrter Speichelfluss auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen. In Einzelfällen können auf Grund des Bestandteils Kalium bichromicum Hautreaktionen auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen. Die Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Angina-Gastreu R1 aufzubewahren?

Für das ungeöffnete Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Nach Anbruch nicht über 30°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und Behältnis nach „verwendbar bis:“/ „verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach Anbruch beträgt die Haltbarkeit 1 Jahr.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Angina-Gastreu R1 enthält

10g (=10,5ml, 1ml=32 Tropfen) enthalten:

- Die Wirkstoffe sind:
Apis mellifica D4 1g, Atropa bella-donna D4 1g, Calcium iodatum D4 1g, Kalium bichromicum D4 0,01g, Teucrium marum D6 1g, Hydrargyrum bichloratum D5 1g, Phytolacca americana D4 1g.
- Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol 96 Vol-%, gereinigtes Wasser

Gesamtethanolgehalt ca. 38 Vol.-%

Wie Angina-Gastreu R1 aussieht und Inhalt der Packung

Angina-Gastreu R1 ist eine klare farblose Lösung (Tropfen) zum Einnehmen in Braunglasflaschen mit Tropfeinsatz und Schraubverschluss.

Packungsgrößen: 22 ml und 50 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32, DE-64625 Bensheim
Tel.: +49 62 51 / 10 97 0
Fax.: +49 62 51 / 33 42
Email: info@reckeweg.de

Vertrieb

Aponova Pharma Handels-GmbH
Mitterweg 4
AT-6265 Hart im Zillertal

Z. Nr.:

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2019.

<----->
--->