

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Arthroheel Injektionslösung

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Arthroheel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Arthroheel beachten?
3. Wie ist Arthroheel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Arthroheel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Arthroheel und wofür wird es angewendet?

Arthroheel ist eine homöopathische Arzneispezialität.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Erkrankungen.

Arthroheel ist ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel, das sich aus verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln zusammensetzt, deren Arzneimittelbilder einander ergänzen.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel ist folgendes Anwendungsgebiet zugelassen:

- Linderung von Schmerzen und Gelenksteifheit bei Arthrose, insbesondere des Kniegelenkes.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in dem genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen ab 18 Jahren.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Arthroheel beachten?

Arthroheel darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen die Wirkstoffe, andere Vertreter aus der Familie der Korbblütler, Giftumachgewächse oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Arthroheel anwenden. Bei Verschlechterung des Allgemeinzustandes, anhaltenden, neu auftretenden oder unklaren Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

Aus grundsätzlichen Erwägungen darf Echinacea nicht angewendet werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen,

Kollagenosen, Autoimmun-Erkrankungen, Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruserkrankungen. Aufgrund des Bestandteiles Echinacea sollte dieses Arzneimittel ohne Rücksprache mit dem Arzt nicht länger als 8 Wochen ununterbrochen angewandt werden.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Kinder und Jugendliche

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Anwendung von Arthroheel zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt. Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine ausreichenden Daten zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Arthroheel enthält Natrium

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Ampulle, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

3. Wie ist Arthroheel anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Allgemeine Hinweise

- Die unten aufgeführten Dosierungsangaben können als allgemeine Orientierungshilfe für die Anwendung von Arthroheel genutzt werden.
- Es liegt in der Entscheidung des Arztes, in welchem zeitlichen Abstand die einzelnen Injektionen gegeben werden, jedoch sollte es nicht mehr als 1 Dosis innerhalb von 24 Stunden sein.
- Injektionen in ein Gelenk (i.a.) dürfen nur unter sterilen Bedingungen und von entsprechend erfahrenen Ärzten gegeben werden.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene ab 18 Jahren




1- bis 3-mal wöchentlich je 1 Ampulle Arthroheel Tr (blauer Punkt) und Arthroheel Ze (grüner Punkt).

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Art der Anwendung

Zur intradermalen (in die Haut, i.d.), subkutanen (unter die Haut, s.c.), intramuskulären (in einen Muskel, i.m.), intraartikulären (in das Gelenk, i.a.) und periartikulären (um das Gelenk herum, p.a.) Anwendung. Es wird empfohlen, vor der Anwendung Arthroheel Tr und Arthroheel Ze in einer Spritze miteinander zu mischen.

Anleitung zum Öffnen einer Ampulle



Ampulle vorsichtig öffnen! Bitte befolgen Sie die Anweisungen.

Ein Aufsägen der Glasampulle ist nicht erforderlich. Halten Sie die Ampulle mit dem Kopf schräg nach oben und lassen Sie die sich darin befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen. Brechen Sie dann den Ampullenkopf ab, indem Sie auf den Farbpunkt Druck ausüben.

Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

Dauer der Anwendung

Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild und wird vom Arzt bestimmt. Sollte keine Besserung eintreten oder sich die Beschwerden verschlimmern, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von Arthroheel angewendet haben, als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Anwendung von Arthroheel vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Allergische Reaktionen wie Hautallergien, Rötung/Schwellung an der Einstichstelle bis hin zu starken allergischen Reaktionen (Anaphylaxie) können auftreten.

Die Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: +43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Arthroheel aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Ampulle nach „Verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Sollten Arthroheel Tr und Arthroheel Ze in einer Spritze miteinander gemischt werden, ist diese Mischung sofort zu verabreichen.

Nur klare, farblose Lösungen verwenden.

Nur zur einmaligen Anwendung. Restmengen verwerfen.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Arthroheel enthält

- Die Wirkstoffe einer Ampulle Arthroheel Tr (blauer Punkt) zu 2,2 ml (= 2,2 g) sind:

Achillea millefolium	D3	2,20 mg
Aconitum napellus	D2	1,32 mg
Arnica montana	D2	2,20 mg
Atropa bella-donna	D2	2,20 mg
Bellis perennis	D2	1,10 mg
Calendula officinalis	D2	2,20 mg
Echinacea	D2	0,55 mg
Echinacea purpurea	D2	0,55 mg
Hamamelis virginiana	D1	0,22 mg
Hepar sulfuris	D6	2,20 mg
Hypericum perforatum	D2	0,66 mg
Matricaria recutita	D3	2,20 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni	D6	1,10 mg
Symphytum officinale	D6	2,20 mg

- Die Wirkstoffe einer Ampulle Arthroheel Ze (grüner Punkt) zu 2,0 ml (= 2,0 g) sind:

Acidum alpha-liponicum	D8	2,00 mg
------------------------	----	---------

Arnica montana	D4	200,00 mg
Cartilago suis	D6	2,00 mg
Coenzym A	D8	2,00 mg
Embryo totalis suis	D6	2,00 mg
Funiculus umbilicalis suis	D6	2,00 mg
Nadidum	D8	2,00 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D8	2,00 mg
Placenta totalis suis	D6	2,00 mg
Rhus toxicodendron	D2	10,00 mg
Sanguinaria canadensis	D4	3,00 mg
Solanum dulcamara	D3	10,00 mg
Sulfur	D6	3,60 mg
Symphytum officinale	D6	10,00 mg

- Die sonstigen Bestandteile sind: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Wie Arthroheel aussieht und Inhalt der Packung

Arthroheel Tr (blauer Punkt) ist eine klare, farblose Injektionslösung in Ampullen aus Klarglas zu je 2,2 ml.

Arthroheel Ze (grüner Punkt) ist eine klare, farblose Injektionslösung in Ampullen aus Klarglas zu je 2,0 ml.

Packungsgröße: 6 Ampullen (3 Ampullen Arthroheel Tr und 3 Ampullen Arthroheel Ze)

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden, Deutschland

Vertrieb:

Schwabe Austria GmbH

Richard-Strauss-Straße 13

1230 Wien, Österreich

Z. Nr.: 337687

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2024.