

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Atomoxetin AmaroX 10 mg Hartkapseln
Atomoxetin AmaroX 18 mg Hartkapseln
Atomoxetin AmaroX 25 mg Hartkapseln
Atomoxetin AmaroX 40 mg Hartkapseln
Atomoxetin AmaroX 60 mg Hartkapseln
Atomoxetin AmaroX 80 mg Hartkapseln
Atomoxetin AmaroX 100 mg Hartkapseln
Atomoxetin

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Atomoxetin AmaroX und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Atomoxetin AmaroX beachten?
3. Wie ist Atomoxetin AmaroX einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Atomoxetin AmaroX aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Atomoxetin AmaroX und wofür wird es angewendet?

Wofür wird Atomoxetin AmaroX angewendet

Atomoxetin AmaroX enthält Atomoxetin und dient zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Es wird angewendet:

- bei Kindern ab 6 Jahren
- Jugendlichen und
- Erwachsenen

Es wird als Teil eines umfassenden Behandlungsprogramms dieser Erkrankung verwendet, das aber ebenso nicht-medikamentöse Maßnahmen wie Beratungen und Verhaltenstherapie erfordert.

Es ist nicht für die ADHS-Behandlung bei Kindern unter 6 Jahren vorgesehen, da die Wirksamkeit und die Sicherheit des Arzneimittels bei dieser Patientengruppe nicht bekannt sind.

Bei Erwachsenen ist eine ADHS-Behandlung mit Atomoxetin AmaroX angezeigt, wenn die Krankheitsanzeichen sehr belastend sind und Ihr berufliches oder soziales Leben in Mitleidenschaft ziehen und wenn die ADHS-Anzeichen bereits in Ihrer Kindheit vorhanden waren.

Wie es wirkt

Atomoxetin AmaroX erhöht die verfügbare Menge des Botenstoffes Noradrenalin im Gehirn. Diese chemische Substanz, die auch natürlicherweise produziert wird, erhöht bei ADHS-Patienten die Aufmerksamkeit und vermindert Impulsivität und Hyperaktivität. Dieses Arzneimittel wurde Ihnen verschrieben, um Ihnen zu helfen, die Symptome von ADHS zu kontrollieren. Dieses Arzneimittel gehört nicht zu Gruppe der Stimulanzien und hat daher kein Suchtpotenzial.

Nach Beginn der Einnahme des Arzneimittels kann es einige Wochen dauern, bis sich Ihre Symptome vollständig verbessern.

Über ADHS

Kinder und Jugendliche mit ADHS finden es schwierig:

- ruhig zu sitzen und
- sich zu konzentrieren.

Es ist aber nicht ihre Schuld, dass sie das nicht schaffen. Viele Kinder und Jugendliche müssen sich anstrengen, um diese Dinge zu schaffen. ADHS kann im Alltag zu Problemen führen. Für Kinder und Jugendliche mit ADHS können das Lernen und die Erledigung von Hausaufgaben schwierig sein. Sie haben Probleme damit, sich zu Hause, in der Schule oder anderswo angemessen zu verhalten. ADHS hat keinen Einfluss auf die Intelligenz eines Kindes oder Jugendlichen.

Erwachsene mit ADHS haben ähnliche Schwierigkeiten wie betroffene Kinder; dies kann zu Problemen führen mit:

- der Arbeit
- Beziehungen
- einem geringen Selbstwertgefühl
- der Ausbildung

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Atomoxetin Amarox beachten?

Atomoxetin Amarox darf NICHT eingenommen werden:

- wenn Sie allergisch gegen Atomoxetin oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie in den letzten 2 Wochen einen Monoaminoxidase-Hemmer (MAO-Hemmer), wie z. B. Phenelzin eingenommen haben. Ein MAO-Hemmer wird manchmal zur Behandlung von Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen angewendet. Die gleichzeitige Anwendung von Atomoxetin Amarox und MAO-Hemmern kann schwerwiegende, möglicherweise lebensgefährliche Nebenwirkungen zur Folge haben. Sie müssen auch mindestens 14 Tage nach dem Absetzen von Atomoxetin Amarox warten, bevor Sie einen MAO-Hemmer einnehmen.
- wenn Sie eine bestimmte Augenerkrankung namens Engwinkelglaukom (erhöhter Augeninnendruck) haben.
- wenn Sie schwerwiegende Herzprobleme haben, die durch eine Erhöhung der Herzfrequenz und/oder des Blutdrucks verschlechtert werden könnten, weil Atomoxetin Amarox dazu führen könnte.
- wenn Sie schwerwiegende Probleme mit den Blutgefäßen in Ihrem Gehirn haben – wie z. B. einen Schlaganfall hatten, eine Auswölbung und Schwächung an einer Stelle Ihrer Blutgefäße (Aneurysma) oder verengte oder verstopfte Blutgefäße im Kopf haben.
- wenn Sie einen Tumor des Nebennierenmarks (ein sogenanntes Phäochromozytom) haben.

Nehmen Sie Atomoxetin Amarox nicht ein, wenn einer der oben genannten Punkte auf Sie zutrifft, weil Atomoxetin Amarox diese Probleme verschlimmern kann. Wenn Sie unsicher sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Atomoxetin Amarox einnehmen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Sowohl Erwachsene als auch Kinder sollen die folgenden Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen beachten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Atomoxetin Amarox einnehmen, wenn Sie:

- Gedanken haben, sich das Leben zu nehmen, oder wenn Sie kurz davor sind zu versuchen, sich das Leben zu nehmen.

- Probleme mit dem Herzen (einschließlich Herzfehlern) oder einen erhöhten Herzfrequenz haben. Atomoxetin Amarox kann Ihre Herzfrequenz (Puls) erhöhen. Es wurde von plötzlichem Tod bei Patienten mit Herzfehlern berichtet.
- einen hohen Blutdruck haben. Atomoxetin Amarox kann den Blutdruck erhöhen.
- einen niedrigen Blutdruck haben. Atomoxetin Amarox kann bei Menschen mit niedrigem Blutdruck Schwindel oder Ohnmacht auslösen.
- Probleme durch plötzliche Änderungen Ihres Blutdrucks oder Ihre Herzfrequenz haben.
- eine Herz-Kreislaufkrankung oder in der Vergangenheit einen Schlaganfall erlitten haben.
- Leberprobleme haben, da Sie eine niedrigere Dosis benötigen könnten.
- psychotische Symptome haben, einschließlich Halluzinationen (Stimmen hören oder Dinge sehen, die nicht da sind), an Dinge glauben, die nicht wahr oder fragwürdig sind.
- an Manie (sich über die Maßen erregt fühlen, was zu ungewöhnlichem Verhalten führt) und an Agitiertheit (Unruhe) leiden.
- sich aggressiv fühlen.
- sich wütend und feindselig fühlen.
- in der Vergangenheit Epilepsie oder Krampfanfälle aus irgendeinem anderen Grund hatten. Atomoxetin Amarox kann zu einer Erhöhung der Häufigkeit von Krampfanfällen führen.
- an ungewöhnlichen Stimmungsschwankungen leiden oder Sie sich sehr unglücklich fühlen.
- schwer kontrollierbare, wiederholte Zuckungen von Körperteilen haben oder Sie wie unter Zwang unpassende Geräusche und Wörter von sich geben.

Serotoninsyndrom

Ein Serotoninsyndrom ist ein potenziell lebensbedrohlicher Zustand, der bei Einnahme von Atomoxetin Amarox in Kombination mit bestimmten anderen Arzneimitteln auftreten kann (siehe Abschnitt 2. „Einnahme von Atomoxetin Amarox zusammen mit anderen Arzneimitteln“). Zu den Anzeichen und Symptomen eines Serotoninsyndroms kann eine Kombination der folgenden Erscheinungen gehören: Verwirrtheit, Ruhelosigkeit, Koordinationsstörungen und Steifheit, Halluzinationen, Koma, schneller Herzschlag, erhöhte Körpertemperatur, schnelle Blutdruckschwankungen, Schwitzen, Hitzewallungen, Zittern, überaktive Reflexe, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt oder gehen Sie in das nächstgelegene Krankenhaus, wenn Sie glauben, dass bei Ihnen ein Serotoninsyndrom vorliegt.

Die Behandlung mit Atomoxetin Amarox kann bei Ihnen zu Aggressivität, Feindseligkeit oder Gewaltbereitschaft führen oder diese Symptome verschlimmern, wenn sie vor der Behandlung bereits vorhanden waren. Sie kann auch ungewöhnliche Verhaltens- oder Stimmungsänderungen hervorrufen (einschließlich körperlicher Angriffe, Drohverhalten und Gedanken, anderen zu schaden). Wenn Sie oder Ihre Familie und/oder Freunde eine dieser Reaktionen bemerken, sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie mit der Behandlung beginnen, wenn einer der oben genannten Punkte auf Sie zutrifft, weil Atomoxetin Amarox diese Probleme verschlimmern kann. Ihr Arzt wird überwachen, wie dieses Arzneimittel bei Ihnen wirkt.

Untersuchungen, die Ihr Arzt durchführen wird, bevor Sie mit der Einnahme von Atomoxetin Amarox beginnen

Diese Untersuchungen sollen zeigen, ob Atomoxetin Amarox das richtige Arzneimittel für Sie ist.

Ihr Arzt wird folgende Untersuchungen durchführen:

- Messen von Blutdruck und Herzfrequenz (Puls) vor und während der Einnahme von Atomoxetin Amarox
- Messen von Körpergröße und Gewicht bei Kindern und Jugendlichen vor und während der Einnahme von Atomoxetin Amarox

Ihr Arzt wird mit Ihnen über folgende Dinge sprechen:

- alle anderen Arzneimittel, die Sie anwenden
- ob es in Ihrer Familie plötzliche unerklärbare Todesfälle gab
- jegliche andere medizinische Probleme (wie z. B. Herzprobleme) bei Ihnen oder jemanden in Ihrer Familie.

Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Arzt so viele Informationen wie möglich geben. Dies wird Ihrem Arzt bei der Entscheidung helfen, ob Atomoxetin Amarox das richtige Arzneimittel für Sie ist. Ihr Arzt wird entscheiden, ob vor Beginn der Einnahme des Arzneimittels weitere Untersuchungen notwendig sind.

Einnahme von Atomoxetin Amarox zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden. Dies betrifft auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel. Ihr Arzt wird entscheiden, ob Sie Atomoxetin Amarox in Kombination mit Ihren anderen Arzneimitteln einnehmen können. In einigen Fällen wird Ihr Arzt die Dosis anpassen oder Ihre Dosis langsamer erhöhen müssen.

Atomoxetin Amarox kann die Wirkung anderer Arzneimittel beeinflussen oder von anderen Arzneimitteln beeinflusst werden. Dazu gehören:

- Einige Antidepressiva, Opioide wie Tramadol und Arzneimittel zur Behandlung von Migräne, sogenannte Triptane. Diese Arzneimittel können mit Atomoxetin Amarox interagieren und zu einem Serotoninsyndrom führen, einem potenziell lebensbedrohlichen Zustand. (Siehe Abschnitt 2., Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, Serotoninsyndrom).

Nehmen Sie Atomoxetin Amarox nicht zusammen mit sogenannten MAO-Hemmern (Monoaminoxidase-Hemmern), die zur Behandlung von Depressionen angewendet werden, ein. Siehe Abschnitt 2 „Atomoxetin Amarox darf nicht eingenommen werden“.

Wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kann Atomoxetin Amarox die Wirkung dieser Arzneimittel beeinflussen oder Nebenwirkungen hervorrufen. Wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel anwenden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Atomoxetin Amarox einnehmen:

- Arzneimittel, die den Blutdruck erhöhen oder die zur Blutdruckeinstellung angewendet werden
- Arzneimittel gegen Depression, z. B. Imipramin, Venlafaxin, Mirtazapin, Fluoxetin und Paroxetin
- einige Arzneimittel gegen Husten und Erkältungen, die Wirkstoffe enthalten, die den Blutdruck beeinflussen. Es ist wichtig, dass Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker sprechen, bevor Sie solche Arzneimittel anwenden.
- einige Arzneimittel zur Behandlung psychischer Erkrankungen
- Arzneimittel, die das Risiko für ein Auftreten von Krampfanfällen erhöhen
- einige Arzneimittel, die bewirken, dass Atomoxetin Amarox länger als normal im Körper bleibt (wie Chinidin und Terbinafin)
- Salbutamol (ein Arzneimittel zur Behandlung von Asthma) kann bei Einnahme oder Injektion zu Herzrasen führen. Dies wird aber keine Verschlechterung Ihres Asthmas bewirken.

Die unten aufgeführten Arzneimittel können zu einem erhöhten Risiko für Herzrhythmusstörungen führen, wenn sie zusammen mit Atomoxetin Amarox eingenommen werden:

- Arzneimittel, die zur Kontrolle des Herzrhythmus angewendet werden
- Arzneimittel, die die Salzkonzentration im Blut verändern
- Arzneimittel zur Malariaphylaxe und -behandlung
- einige Antibiotika (z. B. Erythromycin und Moxifloxacin)

Wenn Sie unsicher sind, ob ein Arzneimittel, das Sie anwenden, zur oben aufgeführten Liste gehört, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie Atomoxetin Amarox einnehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob dieses Arzneimittel ein ungeborenes Baby schädigen kann oder in die Muttermilch übergeht.

- Dieses Arzneimittel wird während der Schwangerschaft nicht empfohlen, es sei denn, Ihr Arzt rät Ihnen ausdrücklich dazu.
- Wenn Sie stillen, wird empfohlen entweder die Einnahme dieses Arzneimittels zu vermeiden oder abzustillen.

Wenn Sie

- schwanger sind oder stillen,
 - vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden,
 - planen, Ihr Kind zu stillen,
- fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen



Achtung: Dieses Arzneimittel kann die Reaktionsfähigkeit und Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen.

Nach der Einnahme von Atomoxetin AmaroX könnten Sie sich müde, schläfrig oder benommen fühlen. Daher müssen Sie vorsichtig sein, wenn Sie mit einem Fahrzeug fahren oder Maschinen bedienen, bevor Sie wissen, wie Atomoxetin AmaroX bei Ihnen wirkt. Wenn Sie sich müde, schläfrig oder benommen fühlen, dürfen Sie kein Fahrzeug fahren oder Maschinen bedienen.

Wichtige Informationen über den Inhalt der Kapseln

Öffnen Sie die Atomoxetin AmaroX Hartkapseln nicht, weil der Inhalt der Kapseln Augenreizungen verursachen kann. Im Falle eines Augenkontaktes mit dem Kapselinhalt müssen Sie das betroffene Auge unverzüglich mit Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen. Hände und Hautstellen, die möglicherweise mit dem Kapselinhalt in Kontakt gekommen sind, müssen umgehend mit Wasser abgewaschen werden.

Atomoxetin AmaroX enthält Natrium

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Kapsel, d. h., es ist nahezu „natriumfrei“.

3. Wie ist Atomoxetin AmaroX einzunehmen?

- Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Dies ist normalerweise einmal oder zweimal täglich (morgens und am späten Nachmittag oder frühen Abend).
- Kinder sollen dieses Arzneimittel nicht ohne Hilfe eines Erwachsenen einnehmen.
- Wenn Sie Atomoxetin AmaroX einmal täglich einnehmen und sich schläfrig oder unwohl fühlen kann Ihr Arzt mit Ihnen die Einnahme auf zweimal täglich umstellen.
- Die Kapseln sollen im Ganzen geschluckt werden und können mit oder ohne eine Mahlzeit eingenommen werden.
- Die Kapseln dürfen nicht geöffnet und der Inhalt darf nicht aus den Kapseln entnommen und in anderer Weise eingenommen werden.
- Wenn Sie das Arzneimittel jeden Tag zur gleichen Uhrzeit einnehmen, hilft es Ihnen an die Einnahme zu denken.

Wie viel einzunehmen ist

Kinder (ab 6 Jahren und älter) oder Jugendliche:

Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie viel Atomoxetin AmaroX Sie täglich einnehmen sollen. Er wird diese Menge Ihrem Gewicht entsprechend berechnen. Zu Behandlungsbeginn wird Ihr Arzt normalerweise eine geringere Dosis verordnen, bevor er die Menge Atomoxetin AmaroX, die Sie einnehmen sollen, Ihrem Gewicht entsprechend anpassen wird.

- Körpergewicht bis zu 70 kg: Beginn der Behandlung mit einer Gesamttagesdosis von 0,5 mg pro kg Körpergewicht für mindestens 7 Tage. Ihr Arzt kann dann entscheiden diese Dosis auf die empfohlene Tagesdosis während der Dauerbehandlung von etwa 1,2 mg pro kg Körpergewicht zu erhöhen.
- Körpergewicht über 70 kg: Beginn der Behandlung mit einer Gesamttagesdosis von 40 mg für mindestens 7 Tage. Ihr Arzt kann dann entscheiden diese Dosis auf die empfohlene Tagesdosis während der Dauerbehandlung von 80 mg zu erhöhen. Die maximale empfohlene Tagesdosis, die Ihr Arzt verschreiben wird, beträgt 100 mg.

Erwachsene:

- Die Behandlung mit Atomoxetin AmaroX soll mit einer Gesamttagesdosis von 40 mg für mindestens 7 Tage begonnen werden. Ihr Arzt kann dann entscheiden, diese Dosis auf die empfohlene Tagesdosis von 80 bis 100 mg zu erhöhen. Die maximale Tagesdosis, die Ihr Arzt verschreiben wird, beträgt 100 mg.

Falls Sie Probleme mit der Leber haben, kann der Arzt eine geringere Dosierung verschreiben.

Wenn Sie eine größere Menge von Atomoxetin AmaroX eingenommen haben, als Sie sollten
Benachrichtigen Sie unverzüglich Ihren Arzt oder die nächste Notfallambulanz und informieren Sie sie darüber, wie viele Kapseln Sie eingenommen haben. Die häufigsten Beschwerden, die im Zusammenhang mit Überdosierungen berichtet wurden, sind Magen-Darm-Probleme, Schläfrigkeit, Schwindel, Zittern und Verhaltensauffälligkeiten. Sehr selten wurde auch von einem Serotoninsyndrom berichtet, einem potenziell lebensbedrohlichen Zustand. (Siehe Abschnitt 2., Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, Serotoninsyndrom).

Wenn Sie die Einnahme von Atomoxetin AmaroX vergessen haben

Wenn Sie eine Einnahme vergessen haben, müssen Sie diese so schnell wie möglich nachholen. Sie dürfen aber in einem Zeitraum von 24 Stunden nicht mehr als Ihre tägliche Gesamtdosis einnehmen. Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Atomoxetin AmaroX abbrechen

Wenn Sie Atomoxetin AmaroX absetzen, sind damit üblicherweise keine Nebenwirkungen verbunden, allerdings können Ihre ADHS-Symptome wieder auftreten. Sie sollten mit Ihrem Arzt sprechen, bevor Sie die Behandlung beenden.

Maßnahmen, die Ihr Arzt während Ihrer Behandlung mit Atomoxetin AmaroX ergreifen wird

Ihr Arzt wird einige Untersuchungen durchführen

- vor der ersten Einnahme, um sicherzustellen, dass Atomoxetin AmaroX für Sie sicher und von Nutzen ist.
- nach Beginn der Einnahme mindestens alle 6 Monate, möglicherweise auch öfter.

Diese Untersuchungen werden auch bei jeder Dosisänderung durchgeführt und beinhalten:

- das Erfassen der Körpergröße und des Gewichts bei Kindern und Jugendlichen;
- das Messen von Blutdruck und Puls;

- das Abklären, ob Sie Probleme während der Einnahme von Atomoxetin Amarox haben oder ob sich Nebenwirkungen verschlechtert haben.

Langzeitbehandlung

Sie müssen Atomoxetin Amarox nicht Ihr ganzes Leben lang einnehmen. Wenn Sie Atomoxetin Amarox länger als ein Jahr einnehmen, wird Ihr Arzt Ihre Behandlung überprüfen, um festzustellen, ob Sie das Arzneimittel noch benötigen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Obwohl bei einigen Patienten Nebenwirkungen auftreten, berichten die meisten, dass Atomoxetin Amarox ihnen hilft. Ihr Arzt wird mit Ihnen über diese Nebenwirkungen sprechen:

Einige Nebenwirkungen können schwerwiegend sein. **Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.**

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Patienten betreffen)

- Empfinden oder Vorhandensein eines sehr schnellen Herzschlags oder Herzrhythmusstörungen
- Gedanken oder Gefühle sich das Leben nehmen zu wollen
- Aggressivität
- Wut und Feindseligkeit
- Gefühls- oder Stimmungsschwankungen
- schwerwiegende allergische Reaktionen mit Anzeichen von
 - Schwellung des Gesichts oder Rachens
 - Schwierigkeiten beim Atmen
 - Nesselsucht (kleine erhabene und juckende Hautstellen – Quaddeln)
- Krampfanfälle
- Psychotische Symptome einschließlich Halluzinationen (wie z. B. Stimmen hören oder Dinge sehen, die nicht da sind), Dinge glauben, die nicht wahr sind oder misstrauisch sein.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben ein erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen wie:

- Gedanken oder Gefühle, sich das Leben nehmen zu wollen (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)
- Gefühls- oder Stimmungsschwankungen (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)

Erwachsene haben ein geringeres Risiko (kann bis zu 1 von 1 000 Behandelten betreffen) **für Nebenwirkungen wie:**

- Krampfanfälle
- Psychotische Symptome einschließlich Halluzinationen (wie z. B. Stimmen hören oder Dinge sehen, die nicht da sind), Dinge glauben, die nicht wahr sind oder misstrauisch sein.

Selten (kann bis zu 1 von 1 000 Behandelten betreffen)

- Leberschädigung

Sie müssen die Behandlung mit Atomoxetin Amarox abbrechen und unverzüglich Ihren Arzt benachrichtigen, wenn bei Ihnen Folgendes auftritt:

- dunkler Urin
- gelbliche Haut oder gelbliche Augen

- Bauchschmerzen, die bei Druck unterhalb des rechten Rippenbogens stärker werden (schmerzhafte Bauchdeckenspannung)
- Übelkeit ohne erkennbaren Grund
- Müdigkeit
- Juckreiz
- grippeähnliche Beschwerden

Folgende weitere Nebenwirkungen wurden berichtet. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn diese Ihnen erhebliche Beschwerden bereiten.

Sehr häufige Nebenwirkungen (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen)	
KINDER über 6 Jahre und JUGENDLICHE	ERWACHSENE
– Kopfschmerzen – Bauchschmerzen – verminderter Appetit (kein Hungergefühl) – Übelkeit oder Erbrechen – Schläfrigkeit – erhöhter Blutdruck – erhöhter Herzschlag (Puls) Bei den meisten Patienten können diese Beschwerden nach einiger Zeit abklingen.	– Übelkeit – Mundtrockenheit – Kopfschmerzen – verminderter Appetit (kein Hungergefühl) – Einschlafstörungen, Durchschlafstörung und frühzeitiges Erwachen – erhöhter Blutdruck – erhöhter Herzschlag (Puls)

Häufige Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)	
KINDER über 6 Jahre und JUGENDLICHE	ERWACHSENE
– Reizbarkeit oder Unruhe (Agitiertheit) – Schlafprobleme, einschließlich frühzeitigem Aufwachen – Depression – Gefühl von Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit – Angstgefühl – Tics (Zuckungen) – große Pupillen (das Schwarze in der Mitte des Auges) – Schwindel – Verstopfung – Appetitlosigkeit – Magenverstimmungen, Verdauungsprobleme – geschwollene, gerötete und juckende Haut – Hautausschlag – Antriebs- und Teilnahmslosigkeit (Lethargie) – Brustschmerzen – Müdigkeit – Gewichtsverlust	– Unruhe (Agitiertheit) – vermindertes sexuelles Interesse – Schlafstörungen – Depression – Gefühl von Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit – Angstgefühl – Schwindel – ein ungewöhnlicher Geschmack oder eine Geschmacksveränderung, die nicht verschwindet – Zittern – Kribbeln oder Taubheitsgefühl in Händen oder Füßen – Schläfrigkeit, Benommenheit, Müdigkeit – Verstopfung – Bauchschmerzen – Verdauungsstörung – Blähungen – Erbrechen – Hitzewallungen – Empfinden oder Vorhandensein eines sehr schnellen Herzschlages – geschwollene, gerötete und juckende Haut – vermehrtes Schwitzen – Hautausschlag – Schwierigkeiten beim Wasserlassen (Urinieren) wie nicht Wasser lassen zu

	können, häufiges oder stockendes Wasserlassen, Schmerzen beim Wasserlassen – Entzündung der Vorsteherdrüse (Prostatitis) – Leistenschmerzen bei Männern – Erektionsschwierigkeiten – verzögerter Orgasmus – Schwierigkeiten beim Aufrechterhalten einer Erektion – Regelblutungskrämpfe – Kraftlosigkeit, Energielosigkeit – Müdigkeit – Antriebs- und Teilnahmslosigkeit (Lethargie) – Schüttelfrost – Gefühl von Nervosität und Gereiztheit – Durstgefühl – Gewichtsverlust
--	--

Gelegentliche Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)	
KINDER über 6 Jahre und JUGENDLICHE	ERWACHSENE
– Ohnmachtsanfall – Zittern – Migräne – Verschwommenes Sehen – ungewöhnliches Hautempfinden, wie beispielsweise Brennen, Prickeln, Jucken oder Kribbeln – Kribbeln oder Taubheitsgefühl in Händen oder Füßen – Krampfanfälle – Empfinden oder Vorhandensein eines sehr schnellen Herzschlags (QT-Verlängerung) – Kurzatmigkeit – vermehrtes Schwitzen – juckende Haut – Kraftlosigkeit, Energielosigkeit	– Ruhelosigkeit – Tics (Zuckungen) – Ohnmachtsanfall – Migräne – Verschwommenes Sehen – Unregelmäßiger, ungewöhnlicher Herzrhythmus (QT-Verlängerung) – kalte Finger und Zehen, – Brustschmerzen – Kurzatmigkeit – erhabene, rote, juckende Ausschläge (Nesselsucht) – Muskelkrämpfe – erhöhter Harndrang – Probleme beim Orgasmus oder Ausbleiben des Orgasmus – unregelmäßige Regelblutung – Ejakulationsversagen

Seltene Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 1 000 Behandelten betreffen)	
KINDER über 6 Jahre und JUGENDLICHE	ERWACHSENE
– schlechte Durchblutung, die zu tauben und blassen Zehen und Fingern führt (Raynaud-Syndrom) – Schwierigkeiten beim Wasserlassen (Urinieren) wie häufiges oder stockendes Wasserlassen, Schmerzen beim Wasserlassen – verlängerte und schmerzhaftere Erektionen – Leistenschmerzen bei männlichen Kindern und Jugendlichen	– schlechte Durchblutung, die zu tauben und blassen Zehen und Fingern führt (Raynaud-Syndrom) – verlängerte und schmerzhaftere Erektionen

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)
KINDER über 6 Jahre und JUGENDLICHE
– Unwillkürliches Zähneknirschen (Bruxismus)

Wirkung auf das Wachstum

Zu Beginn der Behandlung mit Atomoxetin Amarox zeigten einige Kinder vermindertes Wachstum (Gewicht und Größe).

Im Zuge einer Langzeitbehandlung glichen sich allerdings Gewicht und Körpergröße an die Altersgruppe an. Daher wird der Arzt das Gewicht und die Körpergröße bei Kindern während der Behandlung beobachten. Sollte das Kind nicht erwartungsgemäß wachsen oder nicht an Gewicht zunehmen, kann der Arzt die Dosis anpassen oder entscheiden, Atomoxetin Amarox für einen gewissen Zeitraum abzusetzen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem (Details siehe unten) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

5. Wie ist Atomoxetin Amarox aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterpackung nach „Verwendbar bis“/„Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Atomoxetin Amarox enthält

Der Wirkstoff ist: Atomoxetin.

Jede 10 mg-Hartkapsel enthält Atomoxetinhydrochlorid entsprechend 10 mg Atomoxetin.

Jede 18 mg-Hartkapsel enthält Atomoxetinhydrochlorid entsprechend 18 mg Atomoxetin.

Jede 25 mg- Hartkapsel enthält Atomoxetinhydrochlorid entsprechend 25 mg Atomoxetin.

Jede 40 mg-Hartkapsel enthält Atomoxetinhydrochlorid entsprechend 40 mg Atomoxetin.

Jede 60 mg-Hartkapsel enthält Atomoxetinhydrochlorid entsprechend 60 mg Atomoxetin.

Jede 80 mg-Hartkapsel enthält Atomoxetinhydrochlorid entsprechend 80 mg Atomoxetin.

Jede 100 mg-Hartkapsel enthält Atomoxetinhydrochlorid entsprechend 100 mg Atomoxetin.

Die sonstigen Bestandteile sind: Vorverkleisterte Stärke (Mais), Dimeticon

Kapselhülle:

10 mg

Kapseloberteil: Titandioxid, Gelatine, Natriumdodecylsulfat

Kapselunterteil: Titandioxid, Gelatine, Natriumdodecylsulfat

18 mg

Kapseloberteil: Eisenoxid gelb, Gelatine, Natriumdodecylsulfat

Kapselunterteil: Titandioxid, Gelatine, Natriumdodecylsulfat

25 mg

Kapseloberteil: Titandioxid, Indigocarmin, Gelatine, Natriumdodecylsulfat

Kapselunterteil: Titandioxid, Gelatine, Natriumdodecylsulfat

40 mg

Kapseloberteil: Eisenoxid gelb, Indigocarmin, Gelatine, Natriumdodecylsulfat

Kapselunterteil: Titandioxid, Indigocarmin, Gelatine, Natriumdodecylsulfat

60 mg

Kapseloberteil: Titandioxid, Indigocarmin, Gelatine, Natriumdodecylsulfat

Kapselunterteil: Eisenoxid gelb, Gelatine, Natriumdodecylsulfat

80 mg

Kapseloberteil: Eisenoxid gelb, Eisenoxid rot, Titandioxid, Gelatine, Natriumdodecylsulfat

Kapselunterteil: Titandioxid, Gelatine, Natriumdodecylsulfat

100 mg

Kapseloberteil: Eisenoxid gelb, Eisenoxid rot, Titandioxid, Gelatine, Natriumdodecylsulfat

Kapselunterteil: Eisenoxid gelb, Eisenoxid rot, Titandioxid, Gelatine, Natriumdodecylsulfat

Drucktinte (schwarz):

Schellack, Eisenoxid schwarz, Kaliumhydroxid

Wie Atomoxetin AmaroX aussieht und Inhalt der Packung

Atomoxetin AmaroX 10 mg Hartkapseln

Weiß, undurchsichtige Hartgelatine kapseln der Größe „5“, mit dem Aufdruck „I“ auf dem Oberteil und „105“ auf dem Unterteil, gefüllt mit weißem bis cremefarbenem körnigem Pulver.

Atomoxetin AmaroX 18 mg Hartkapseln

Gelb-weiß, undurchsichtige Hartgelatine kapseln der Größe „4“, mit dem Aufdruck „I“ auf dem Oberteil und „106“ auf dem Unterteil, gefüllt mit weißem bis cremefarbenem körnigem Pulver.

Atomoxetin AmaroX 25 mg Hartkapseln

Undurchsichtige blau-weiß Hartgelatine kapseln der Größe „3“, mit dem Aufdruck „I“ auf dem Oberteil und „107“ auf dem Unterteil, gefüllt mit weißem bis cremefarbenem körnigem Pulver.

Atomoxetin AmaroX 40 mg Hartkapseln

Blaue undurchsichtige Hartgelatine kapseln der Größe „2“, mit dem Aufdruck „I“ auf dem Oberteil und „108“ auf dem Unterteil, gefüllt mit weißem bis cremefarbenem körnigem Pulver.

Atomoxetin Amarox 60 mg Hartkapseln

Blaue-gelbe undurchsichtige Hartgelatinekapseln der Größe „2“, mit dem Aufdruck „I“ auf dem Oberteil und „109“ auf dem Unterteil, gefüllt mit weißem bis cremefarbenem körnigem Pulver.

Atomoxetin Amarox 80 mg Hartkapseln

Braun-weiße undurchsichtige undurchsichtige Hartgelatinekapseln der Größe „2“, mit dem Aufdruck „I“ auf dem Oberteil und „110“ auf dem Unterteil, gefüllt mit weißem bis cremefarbenem körnigem Pulver.

Atomoxetin Amarox 100 mg Hartkapseln

Braune undurchsichtige Hartgelatinekapseln der Größe „1“, mit dem Aufdruck „I“ auf dem Oberteil und „111“ auf dem Unterteil, gefüllt mit weißem bis cremefarbenem körnigem Pulver.

Atomoxetin Amarox Hartkapseln sind in Blisterpackungen mit 7, 28, 30, 56 und 98 Hartkapseln erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Amarox Pharma B.V.
Rouboslaan 32
2252 TR Voorschoten
Niederlande

Hersteller

Amarox Pharma B.V.
Rouboslaan 32
2252 TR Voorschoten
Niederlande

Atomoxetin Amarox 10 mg Hartkapseln Z.Nr.:
Atomoxetin Amarox 18 mg Hartkapseln Z.Nr.:
Atomoxetin Amarox 25 mg Hartkapseln Z.Nr.:
Atomoxetin Amarox 40 mg Hartkapseln Z.Nr.:
Atomoxetin Amarox 60 mg Hartkapseln Z.Nr.:
Atomoxetin Amarox 80 mg Hartkapseln Z.Nr.:
Atomoxetin Amarox 100 mg Hartkapseln Z.Nr.:

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

AT	Atomoxetin Amarox 10mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg Hartkapseln
CZ	Atomoxetinum Amarox 10mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tvrdé tobolky
DK	Atomoxetin Amarox
FI	Atomoxetin Amarox 10mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg kovat kapselit
NL	Atomoxetine Amarox 10mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg harde capsules
PL	Atomoxetinum Amarox
HU	Atomoxetin Amarox 10mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg kemény kapszula
DE	Atomoxetin Amarox 10mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg Hartkapseln
NO	Atomoxetine Amarox

RO	Atomoxetină AmaroX 10mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg capsulă tare
ES	Atomoxetina Tarbis 10mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg cápsulas duras EFG
SE	Atomoxetin AmaroX 10mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg hårda kapslar

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2026.