Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Axeel-Tabletten

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Bei Fortdauern der Krankheitssymptome ist ein Arzt aufzusuchen.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Axeel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Axeel beachten?
3. Wie ist Axeel einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Axeel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Axeel und wofür wird es angewendet?

Homöopathische Arzneispezialität ohne genehmigte therapeutische Anwendungsgebiete.

Axeel ist ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel. Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 12 Monaten.

Bei Fortdauern der Krankheitssymptome ist ein Arzt aufzusuchen.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Axeel beachten?

Axeel darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Axeel einnehmen.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 1 Jahr liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Säuglingen nicht angewendet werden.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Einnahme von Axeel zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Einnahme von Axeel zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Bei der Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Axeel hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Axeel enthält Lactose

Bitte nehmen Sie Axeel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Lactoseunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist Axeel einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Jugendliche ab 12 Jahre und Erwachsene:

1 Tablette 3-mal täglich

In akuten Fällen: 1 Tablette alle ½ - 1 Stunde bis zu 12-mal täglich. Danach Weiterbehandlung mit der Standarddosierung 1 Tablette 3-mal täglich.

Anwendung bei Kindern

Kinder 6 bis 11 Jahre

1 Tablette 2-mal täglich

In akuten Fällen: 1 Tablette alle 1 - 2 Stunden bis zu 8-mal täglich. Danach Weiterbehandlung mit der Standarddosierung 1 Tablette 2-mal täglich.

Kinder 2 bis 5 Jahre

1 Tablette 1-2-mal täglich

In akuten Fällen: 1 Tablette alle 1 - 2 Stunden bis zu 6-mal täglich. Danach Weiterbehandlung mit der Standarddosierung 1 Tablette 1-2-mal täglich.

Kinder 12 – 23 Monate

1 Tablette täglich

In akuten Fällen: 1 Tablette alle 1 - 2 Stunden bis zu 4-mal täglich. Danach Weiterbehandlung mit der Standarddosierung 1 Tablette täglich.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Tabletten langsam im Mund zergehen lassen. Bei Kleinkindern soll die Tablette zerdrückt und mit etwas Wasser vermischt gegeben werden.

Die Einnahme erfolgt 30 Minuten vor oder nach einer Mahlzeit.

Bei Fortdauern der Krankheitssymptome ist ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Axeel eingenommen haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

Wenn Sie die Einnahme von Axeel vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5,
1200 Wien
Österreich
Fax: +43 (0) 50 555 36207

Website: http://www.basg.gv.at/

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Axeel aufzubewahren?

In der Originalverpackung aufbewahren.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Axeel enthält

Die Wirkstoffe in 1 Tablette sind:

Glandula suprarenalis suis	D10	100 mg
Hypophysis suis	D10	100 mg
Hypothalamus suis	D10	100 mg

Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat

Wie Axeel aussieht und Inhalt der Packung

Axeel sind weiße bis gelbweiße, runde, beidseits abgeflachte Tabletten in Tablettendosen mit einem Stopfen aus Kunststoff.

Eine Packung enthält 25, 100 Tabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2 – 4
76532 Baden-Baden, Deutschland

Reg.Nr.: 637657

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2017.