

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Bisoprolol Accord 2,5 mg Filmtabletten Bisoprolol Accord 5 mg Filmtabletten Bisoprolol Accord 10 mg Filmtabletten Bisoprololfumarat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Medikament wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Bisoprolol Accord Filmtabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Bisoprolol Accord Filmtabletten beachten?
3. Wie sind Bisoprolol Accord Filmtabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Bisoprolol Accord Filmtabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Bisoprolol Accord Filmtabletten und wofür werden sie angewendet?

Der Wirkstoff in diesem Medikament ist Bisoprololfumarat. Bisoprololfumarat ist ein Arzneimittel aus der Gruppe der Beta-Blocker. Beta-Blocker schützen das Herz vor übersteigter Herztätigkeit. Dieses Medikament wirkt, indem es die Körperreaktion auf manche Nervenimpulse insbesondere im Herzen beeinflusst. Infolgedessen reduziert Bisoprololfumarat die Herzfrequenz und bewirkt, dass die Pumpfähigkeit des Herzens, Blut durch den Körper zu pumpen, wirkungsvoller ist. Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz) tritt ein, wenn der Herzmuskel schwach ist und nicht genug Blut für den Bedarf des Körpers pumpen kann.

Bisoprolol Accord 2,5 mg, 5 mg und 10 mg Filmtabletten werden in Kombination mit anderen Medikamenten zur Behandlung stabiler Herzinsuffizienz verwendet.

Bisoprolol Accord 5 mg und 10 mg Filmtabletten werden auch zur Behandlung von Bluthochdruck (Hypertension) und Angina Pectoris (Brustschmerzen, die durch Verschluss der Arterien, die den Herzmuskel versorgen) eingesetzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Bisoprolol Accord Filmtabletten beachten?

Bisoprolol Accord Filmtabletten dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Bisoprololfumarat oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie an starkem Asthma leiden.
- wenn Sie schwere Durchblutungsstörungen in den Gliedmaßen haben (wie Raynaud-Krankheit), was verursacht, dass Ihre Finger oder Zehen kribbeln oder blass bzw. blau werden.

- wenn Sie an unbehandeltem Phäochromozytom leiden, einem seltenen Tumor der Nebenniere.
- wenn Sie metabolische Azidose haben, eine Erkrankung bei der das Blut zu viel Säure enthält.

Bisoprolol Accord Filmtabletten dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie an einer der folgenden Herzerkrankungen leiden:

- akute Herzinsuffizienz
- Verschlechterung der Herzinsuffizienz die eine intravenöse Behandlung mit Arzneimitteln zur Steigerung der Herzmuskelkraft erfordert.
- niedrige Herzfrequenz.
- niedriger Blutdruck.
- bestimmte Herzerkrankungen, die eine sehr niedrige Herzfrequenz oder unregelmäßigen Herzschlag verursachen.
- kardiogener Schock, eine akute schwerwiegende Herzerkrankung, die zu niedrigem Blutdruck und Kreislaufversagen führt.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Bisoprolol Accord Filmtabletten einnehmen. Es kann sein, dass er Sie ganz besonders beobachten möchte (zum Beispiel Durchführung zusätzlicher Behandlungen oder häufigerer Kontrolluntersuchungen), wenn Sie an einer der folgenden Krankheiten leiden:

- Diabetes
- Strenges Fasten (Fasten ohne feste Nahrung)
- Bestimmte Herzerkrankungen wie Herzrhythmusstörungen oder starke Brustschmerzen im Ruhezustand (Prinzmetal-Angina)
- Nieren- oder Leberproblemen
- Weniger starke Durchblutungsstörungen in Ihren Gliedmaßen
- Weniger starkes Asthma oder chronische Lungenerkrankung
- Vorbestehender schuppiger Hautausschlag (Schuppenflechte)
- Tumor der Nebenniere (Medulla) (Phäochromozytom)
- Schilddrüsenerkrankung

Bitte informieren Sie Ihren Arzt auch, wenn Sie sich den folgenden Behandlungen unterziehen müssen:

- Desensibilisierungstherapie (zum Beispiel zur Vermeidung von Heuschnupfen), da Bisoprololfumarat die Wahrscheinlichkeit einer allergischen Reaktion oder die Schwere einer solchen Reaktion erhöhen kann.
- Anästhesie (zum Beispiel für einen chirurgischen Eingriff) da dieses Arzneimittel die Reaktion Ihres Körpers auf diese Situation beeinträchtigen kann.

Wenn Sie an einer chronischen Lungenkrankheit oder leichterem Asthma leiden, informieren Sie bitte Ihren Arzt umgehend, wenn bei Ihnen neue Probleme beim Atmen, Husten, Keuchen nach Belastung etc. unter Einnahme von Bisoprolol Accord Filmtabletten auftreten.

Doping

Die Anwendung des Arzneimittels Bisoprolol Accord kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen.

Einnahme von Bisoprolol Accord Filmtabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.
Folgende Arzneimittel dürfen nicht ohne ausdrückliche Anweisung Ihres Arztes zusammen mit Bisoprolol Accord Filmtabletten eingenommen werden:

- bestimmte Arzneimittel zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen (Antiarrhythmika der Klasse I wie zum Beispiel Chinidin, Disopyramid, Lidocain, Phenytoin; Flecainid, Propafenon)
- Bestimmte Arzneimittel zur Behandlung von Bluthochdruck, Angina pectoris oder Herzrhythmusstörungen (Kalziumantagonisten wie Verapamil und Diltiazem)
- Bestimmte Arzneimittel zur Behandlung von Bluthochdruck wie Clonidin, Methyldopa, Moxonidin, Rilmenidin. **Beenden Sie jedoch die Einnahme dieses Arzneimittels nicht** ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie die folgenden Arzneimittel zusammen mit Bisoprololfumarat Tabletten einnehmen; Ihr Arzt muss Ihren Zustand möglicherweise häufiger überprüfen:

- Bestimmte Medikamente gegen Bluthochdruck oder Angina pectoris (Kalziumantagonisten vom Dihydropyridin-Typ, z.B. Felodipin und Amlodipin)
- Bestimmte Medikamente zur Behandlung von unregelmäßigem oder abnormalem Herzschlag (Antiarrhythmika der Klasse III, z.B. Amiodaron)
- Betablocker zur örtlichen Anwendung (z.B. Timolol - Augentropfen zur Behandlung eines Glaukoms)
- Bestimmte Medikamente zur Behandlung von z.B. Alzheimer-Erkrankung oder zur Glaukombehandlung (Parasympathomimetika, z.B. Tacrin oder Carbachol) oder zur Behandlung akuter Herzprobleme (Sympathomimetika, z.B. Isoprenalin und Dobutamin)
- Antidiabetika einschließlich Insulin
- Narkosemittel (z.B. während einer Operation)
- Digitalis zur Behandlung einer Herzinsuffizienz
- Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) zur Behandlung von Arthritis, Schmerzen oder Entzündungen (z.B. Ibuprofen oder Diclofenac)
- Andere Medikamente, die eine erwünschte oder unerwünschte Blutdrucksenkung bewirken können, wie zum Beispiel Antihypertensiva, bestimmte Medikamente gegen Depressionen (trizyklische Antidepressiva wie Imipramin oder Amitriptylin), bestimmte Medikamente zur Behandlung von Epilepsie bzw. Narkosemittel (Barbiturate wie Phenobarbital) oder bestimmte Medikamente zur Behandlung von psychischen Störungen charakterisiert durch Realitätskontaktverlust (Phenothiazine wie Levomepromazin)
- Mefloquin zur Vorbeugung oder Behandlung von Malaria
- Medikamente gegen Depressionen, so genannte Monoaminoxidasehemmer (ausgenommen MAO-B Hemmer) wie Moclobemid.

Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Bei Anwendung von Bisoprolol Accord Filmtabletten während der Schwangerschaft besteht das Risiko einer schädlichen Wirkung auf Ihr ungeborenes Kind. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden,

fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt um Rat. Ihr Arzt wird entscheiden, ob Sie Bisoprolol Accord Filmtabletten während der Schwangerschaft einnehmen können.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Bisoprololfumarat in die Muttermilch übergeht. Daher wird Stillen während einer Behandlung mit Bisoprolol Accord Filmtabletten nicht empfohlen.

Bisoprolol Accord Filmtabletten enthalten Natrium

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Dosis, d. h. es ist nahezu „natriumfrei“.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen



Die Verkehrstüchtigkeit oder Fähigkeit Maschinen zu bedienen kann, je nachdem wie gut Sie das Medikament vertragen, beeinträchtigt sein. Bitte sind Sie besonders vorsichtig zu Beginn der Therapie, bei Erhöhung der Dosis, Änderung des Medikaments und in Kombination mit Alkohol.

3. Wie sind Bisoprolol Accord Filmtabletten einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Bei einer Behandlung mit Bisoprolol Accord Filmtabletten ist regelmäßige Überwachung von Ihrem Arzt erforderlich. Dies ist besonders wichtig während Einleitung der Therapie, während einer Dosiserhöhung, und bei Beendigung der Behandlung.

Bisoprolol Accord Filmtabletten sollten morgens mit oder ohne Nahrungsmittel eingenommen werden. Schlucken Sie die Tablette/n im Ganzen mit etwas Wasser und kauen oder zerdrücken Sie sie nicht. Die Tabletten können in gleiche Dosen geteilt werden.

Eine Behandlung mit Bisoprolol Accord Filmtablette ist im Allgemeinen langfristig.

Erwachsene

Brustschmerzen und Bluthochdruck

Ihr Arzt wird die Behandlung mit der niedrigsten möglichen Dosis (5 mg) einleiten. Zu Beginn der Behandlung wird Ihr Arzt Sie sorgfältig überwachen. Ihr Arzt wird Ihre Dosis erhöhen, um die für Sie bestmögliche Dosierung zu ermitteln.

Die empfohlene Höchstdosis beträgt 20 mg pro Tag.

Patienten mit Nierenerkrankung

Bei Patienten mit schwerer Nierenerkrankung sollte eine Dosis von 10 mg Bisoprolol einmal täglich nicht überschritten werden. Bitte wenden Sie sich vor Einnahme dieses Medikaments an Ihren Arzt.

Patienten mit Lebererkrankung

Bei Patienten mit schwerer Lebererkrankung sollte eine Dosis von 10 mg Bisoprolol einmal täglich nicht überschritten werden. Bitte wenden Sie sich vor Einnahme dieses Medikaments an Ihren Arzt.

Herzinsuffizienz

Bevor Sie mit der Einnahme von Bisoprolol Accord Filmtabletten beginnen, sollten Sie bereits andere Arzneimittel zur Behandlung von Herzinsuffizienz nehmen, einschließlich eines ACE-Hemmers, Diuretikums und (als zusätzliche Option) Herzglykosids.

Die Behandlung mit Bisoprolol Accord Filmtabletten muss mit einer niedrigen Dosis eingeleitet und dann schrittweise erhöht werden. Ihr Arzt entscheidet über die Erhöhung der Dosis; dies wird im Allgemeinen nach folgendem Schema durchgeführt:

- 1,25 mg Bisoprololfumarat einmal täglich für eine Woche
- 2,5 mg Bisoprololfumarat einmal täglich für eine Woche
- 3,75 mg Bisoprololfumarat einmal täglich für eine Woche
- 5 mg Bisoprololfumarat einmal täglich für vier Wochen
- 7,5 mg Bisoprololfumarat einmal täglich für vier Wochen
- 10 mg Bisoprololfumarat einmal täglich als Erhaltungstherapie

Die empfohlene Tageshöchstdosis von Bisoprololfumarat beträgt 10 mg.

Abhängig von der Verträglichkeit des Medikaments kann Ihr Arzt den Zeitraum zwischen den Dosiserhöhungen verlängern. Wenn sich Ihre Erkrankung verschlimmert oder Sie das Medikament nicht mehr vertragen, kann es notwendig sein, die Dosis wieder zu reduzieren oder die Behandlung abzubrechen. Bei manchen Patienten kann eine Erhaltungsdosis von weniger als 10 mg Bisoprololfumarat ausreichend sein. Ihr Arzt wird Sie davon unterrichten, wie Sie vorgehen sollen. Falls Sie die Behandlung völlig abbrechen müssen, wird Ihr Arzt Sie im Allgemeinen anweisen, die Dosis schrittweise zu reduzieren, da sich Ihre Erkrankung sonst verschlimmern kann.

Anwendung bei Kindern

Die Anwendung von Bisoprolol Accord Filmtabletten bei Kindern wird nicht empfohlen.

Ältere Patienten

Im Allgemeinen ist eine Dosisanpassung bei älteren Patienten nicht erforderlich. Es wird empfohlen, die Behandlung mit der niedrigsten möglichen Dosis einzuleiten.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Dosis von Bisoprolol Accord Filmtabletten zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Bisoprolol Accord Filmtabletten eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Bisoprolol Accord Filmtabletten eingenommen haben, als Sie sollten, kontaktieren Sie bitte sofort Ihren Arzt. Ihr Arzt wird entscheiden, welche Maßnahmen notwendig sind. Als Symptome einer Überdosierung können verlangsamte Herzfrequenz, schwere Atemprobleme, Benommenheit oder Zittern (durch zu niedrigen Blutzucker) auftreten.

Wenn Sie die Einnahme von Bisoprolol Accord Filmtabletten vergessen haben

Falls Sie die Einnahme einer Dosis Ihres Arzneimittels vergessen haben, nehmen Sie es sobald Sie sich daran erinnern, es sei denn, es ist schon Zeit für die nächste Dosis. Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, um eine vergessene Dosis auszugleichen.

Wenn Sie die Einnahme von Bisoprolol Accord Filmtabletten abbrechen

Brechen Sie die Behandlung nicht plötzlich ab oder ändern Sie nicht die empfohlene Dosis, ohne mit Ihrem Arzt gesprochen zu haben. Wenn es notwendig ist, die Behandlung abzubrechen, muss dies schrittweise erfolgen, um Nebenwirkungen zu vermeiden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Um schwerwiegende Reaktionen zu vermeiden, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt, wenn eine Nebenwirkung Sie erheblich beeinträchtigt, plötzlich auftritt oder sich rasch verschlimmert.

Die schwerwiegendsten Nebenwirkungen sind in Verbindung mit der Herzfunktion:

- verlangsamte Herzfrequenz (kann bis zu 1 von 10 Behandelten mit chronischer Herzinsuffizienz und bis zu 1 von 100 Behandelten mit Bluthochdruck oder Angina pectoris betreffen)
- Verschlechterung der Herzinsuffizienz (kann bis zu 1 von 10 Behandelten mit chronischer Herzinsuffizienz und bis zu 1 von 100 Behandelten mit Bluthochdruck oder Angina pectoris betreffen)
- Langsamer oder unregelmäßiger Herzschlag (kann mehr als 1 von 100 Behandelten mit chronischer Herzinsuffizienz betreffen)
- Verstärkung der Beschwerden von Durchblutungsstörungen in den Beinen insbesondere zu Behandlungsbeginn (keine Angabe der Häufigkeit).

Wenn Sie sich schwindelig oder schwach fühlen oder Atembeschwerden haben, verständigen Sie sobald wie möglich Ihren Arzt.

Weitere Nebenwirkungen werden nachfolgend entsprechend ihrer Häufigkeit aufgeführt:

Häufige Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen):

- Müdigkeit*, Schwächegefühl (bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz), Schwindelanfälle*, Kopfschmerzen*
- Kälte- oder Taubheitsgefühl in Händen oder Füßen
- Niedriger Blutdruck, insbesondere bei Patienten mit Herzinsuffizienz.
- Magen-Darm-Störungen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Verstopfung.

Gelegentliche Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):

- Schlafstörungen
- Depressionen
- Schwindelanfall beim Aufstehen
- Atemschwierigkeiten bei Patienten mit Asthma oder chronischer Lungenerkrankung
- Muskelschwäche, Muskelkrämpfe

Seltene Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen):

- Hörstörungen
- Allergischer Schnupfen (verstopfte oder laufende Nase)
- Verminderter Tränenfluss (kann ein Problem sein, wenn Sie Kontaktlinsen tragen)
- Leberentzündung, was zu Gelbfärbung der Haut oder der Augenbindehaut führen kann
- Veränderte Leberfunktions- und Blutlipidwerte bei manchen Blutuntersuchungen
- Allergie-ähnliche Reaktionen wie Juckreiz, Erröten, Hautausschlag. Suchen Sie sofort Ihren Arzt auf, wenn bei Ihnen schwerere allergische Reaktionen wie Gesicht-, Hals-, Zungen-, Mund- oder Rachenschwellungen oder Atembeschwerden auftreten.
- Potenzstörungen
- Alpträume, Halluzinationen
- Ohnmacht

Sehr seltene Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 10000 Behandelten betreffen):

- Reizung und Rötung der Augen (Konjunktivitis)
- Haarausfall
- Auftreten oder Verschlimmerung von schuppigem Hautausschlag (Schuppenflechte): Schuppenflechte ähnlicher Hautausschlag

* Im Fall der Behandlung von Bluthochdruck oder Angina Pectoris treten diese Beschwerden insbesondere zu Behandlungsbeginn oder bei Änderungen der Dosierung auf. Sie sind im Allgemeinen leichter Natur und verschwinden oft innerhalb von 1 bis 2 Wochen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH,

Fax: + 43 (0) 50 555 36207,

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Bisoprolol Accord Filmtabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach ‚Verwendbar bis‘ oder ‚Verw. bis‘ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 30 °C lagern.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**Was Bisoprolol Accord Filmtabletten enthalten**

Der Wirkstoff ist Bisoprololfumarat. Jede Tablette enthält entweder 2,5 mg, 5 mg oder 10 mg Bisoprololfumarat.

Die sonstigen Bestandteile sind mikrokristalline Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Povidon K-30, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (E470b), Hypromellose E-15 (E464), Macrogol 400 (E553), Titandioxid (E171), Talkum.

Wie Bisoprolol Accord Filmtabletten aussehen und Inhalt der Packung:

Weiß bis weißliche runde, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung ‚b1‘ auf der einen Seite und einer Bruchkerbe auf der anderen Seite.

Weiß bis weißliche runde, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung ‚b2‘ auf der einen Seite und einer Bruchkerbe auf der anderen Seite.

Weiß bis weißliche runde, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung ‚b3‘ auf der einen Seite und einer Bruchkerbe auf der anderen Seite.

Packungsgrößen von je 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 und 100 Tabletten sind in allen Wirkungsstärken verfügbar. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200,
3526KV Utrecht,
Niederlande

Hersteller:

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Accord Healthcare B.V.,
Winthontlaan 200,
3526KV Utrecht,
Niederlande

Zul. Nr.:

2,5 mg: 1-31179
5 mg: 1-31180
10 mg: 1-31181

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Name des Mitgliedsstaats	Bezeichnung des Arzneimittels
<u>Österreich</u>	<u>Bisoprolol Accord 2.5mg/5 mg/ 10mg Filmtabletten</u>
<u>Frankreich</u>	<u>Bisoprolol Accord Healthcare 2,5/5/10 mg comprimé pelliculé sécable</u>
<u>Italien</u>	<u>Bisoprolol Accord Healthcare 2.5mg/5mg/10mg compresse rivestite con film</u>
<u>Portugal</u>	<u>Bisoprolol Accord 5 mg/10 mg comprimidos revestidos por película</u>
<u>Niederlande</u>	<u>Bisoprololfumaraat Accord 2,5 mg/5 mg/10 mg filmomhulde Tabletten</u>
<u>Vereinigtes Königreich</u>	<u>Bisoprolol 2.5mg/5mg/10mg Film-coated tablet</u>
<u>Bulgarien</u>	<u>Bisoprolol Accord 2.5mg/5 mg/10mg film-coated tablets</u>
<u>Deutschland</u>	<u>Bisoprolol Accord 2.5mg/5 mg/10mg Filmtabletten</u>
<u>Estland</u>	<u>Bisoprolol Accord</u>
<u>Finnland</u>	<u>Bisoprolol Accord 2.5mg/5 mg/10mg kalvopäällysteinen tabletti</u>
<u>Irland</u>	<u>Bisoprolol 2.5mg/5 mg/10mg Film-coated tablet</u>

<u>Lettland</u>	<u>Bisoprolol Accord 2.5mg/5 mg/10mg apvalkotās tabletes</u>
<u>Polen</u>	<u>Bicardiol</u>
<u>Schweden</u>	<u>Bisoprolol Accord 2.5mg/5 mg/10mg filmdragerad tablet</u>
<u>Slowakische Republik</u>	<u>Bisoprolol Accord 2.5mg/5 mg/10mg filmom obalené tablety</u>

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Jänner 2022.