

## **PACKUNGSBEILAGE**

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **Canephron Tropfen**

Wirkstoffe: Mischextrakt aus Rosmarinblätter, Liebstöckelwurzel und Tausendgüldenkraut

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dieses gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was sind Canephron Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Canephron Tropfen beachten?
3. Wie sind Canephron Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Canephron Tropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was sind Canephron Tropfen und wofür werden sie angewendet?**

Canephron Tropfen sind ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung und zur Ergänzung spezifischer Maßnahmen bei leichten Beschwerden im Rahmen von entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege; zur Durchspülung der Harnwege und zur Verminderung der Ablagerung von Nierengrieß.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für die genannten Anwendungsgebiete registriert ist.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Canephron Tropfen beachten?**

**Canephron Tropfen dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Liebstöckelwurzel, Rosmarinblätter, Tausendgüldenkraut, gegen andere Doldenblütler (Umbelliferen, z.B. Anis, Fenchel), Anethol (Bestandteil von ätherischen Ölen von z.B. Anis, Fenchel) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind
- Bei Magengeschwüren
- bei Ödemen (Wasseransammlung im Gewebe) infolge eingeschränkter Herz- oder Nierenfunktion.
- wenn vom Arzt eine reduzierte Flüssigkeitsaufnahme empfohlen wurde.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Canephron Tropfen einnehmen.

Beim Auftreten von Fieber, Krämpfen, Blut im Urin, Beschwerden beim Wasserlassen oder akuter Harnverhaltung ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen, da diese Symptome Zeichen eines schweren Krankheitsverlaufs sein können.

## **Kinder**

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Einnahme bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen.

## **Einnahme von Canephron Tropfen mit anderen Arzneimitteln**

Es sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Ihren Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

## **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, wird die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

## **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

## **Dieses Arzneimittel enthält 760 mg Alkohol**

(Ethanol) pro 5,0 ml entsprechend 152 mg/ml (bis zu 19% v/v). Die Menge in 5,0 ml dieses Arzneimittels entspricht weniger als 19 ml Bier oder 8 ml Wein.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel Auswirkungen auf Erwachsene und Jugendliche hat oder dass bei Kindern Auswirkungen wahrnehmbar sind.

Die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel kann die Wirkungen anderer Arzneimittel verändern. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Wenn Sie alkoholabhängig sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

## **3. Wie sind Canephron Tropfen einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene 3-mal täglich 5 ml Flüssigkeit. Die Tagesdosis entspricht 15 ml Flüssigkeit.

## **Anwendung bei Kindern**

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Einnahme bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen.

## **Art der Anwendung**

Zum Einnehmen.

Eine Einzeldosis Canephron Tropfen ist jeweils morgens, mittags und abends einzunehmen.

Canephron Tropfen können gegebenenfalls gleichzeitig mit anderen Flüssigkeiten eingenommen werden. Auf reichliche Flüssigkeitszufuhr ist zu achten.

Vor Gebrauch schütteln!

## **Dauer der Anwendung**

Wenn das Arzneimittel wirksam ist und Sie es gut vertragen, können Sie es über einen Zeitraum von 4 Wochen anwenden (nach 2 Wochen der Anwendung muss ein Arzt konsultiert werden). Bei einem Krankheitsrückfall, kann die Behandlung mit diesem Arzneimittel wiederholt werden. Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## **Wenn Sie eine größere Menge von Canephron Tropfen eingenommen haben als Sie sollten**

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

## **Wenn Sie die Einnahme von Canephron Tropfen vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel können Canephron Tropfen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Häufig können Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auftreten (1 bis 10 Behandelte von 100).

Überempfindlichkeitsreaktionen können auftreten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion dürfen Canephron Tropfen nicht nochmals eingenommen werden.

## **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können die Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5  
1200 WIEN  
ÖSTERREICH  
Fax: +43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie sind Canephron Tropfen aufzubewahren?**

Nicht über 25° C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nach Anbruch der Flasche ist das Arzneimittel 6 Monate haltbar.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Behältnis (Glasflasche) nach „verwendbar bis:“ bzw. „verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Canephron Tropfen enthalten**

- Die Wirkstoffe sind:  
100 g enthalten einen Mischextrakt aus Rosmarinblätter, Liebstöckelwurzel und Tausendgüldenkraut (entsprechend je 0,6 g Arzneidroge pro 100 g Fertigprodukt, DEV (Droge-Extrakt-Verhältnis) 1:56); 1. Auszugsmittel: Ethanol 59 % (Vol.-%), 2. - 4. Auszugsmittel Wasser)  
(5 ml = 4,89 g)
- Die sonstigen Bestandteile sind Ethanol und gereinigtes Wasser.  
Gesamthethanolgehalt: ca. 18,3 Vol.-% Alkohol (Ethanol).

### **Wie Canephron Tropfen aussehen und Inhalt der Packung**

Gelbbraune Tropfen zum Einnehmen (Lösung) mit Geruch nach Liebstöckel.

Braunglasflasche mit Dichtungsring und Ausgießhilfe aus Polyethylen sowie Schraubkappe aus Polypropylen in Packungsgrößen zu 50 ml, 100 ml und 2 x 100 ml

Kalibrierter Messbecher aus Polypropylen mit der Dosiereinteilung 5 ml.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

BIONORICA SE  
Kerschensteinerstraße 11-15  
92318 Neumarkt  
Deutschland  
Tel.: +49 9181 231 – 90  
Fax: +49 9181 231 – 265  
E-Mail: info@bionorica.de

Reg.Nr.: HERB-00020

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2021.**