

**PACKUNGSBESCHRIFTUNGEN**

**GEBRAUCHSINFORMATION**

**CEFAZID 120 mg - Filmtabletten für Hunde**

**1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaber:  
*aristavet* Veterinärspezialitäten GmbH & Co.  
Argonnenstr. 3A  
D – 88250 Weingarten

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:  
PenCef Pharma GmbH  
Schützenanger 9  
D - 37081 Göttingen

**2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

CEFAZID 120 mg - Filmtabletten für Hunde – Cefalexin (als Monohydrat)

**3. WIRKSTOFF UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

1 Filmtablette enthält:

**Wirkstoff:**

Cefalexin	120,0 mg
(entsprechend Cefalexin-Monohydrat	127,0 mg)

**4. ANWENDUNGSGEBIETE**

Zur Behandlung von bakteriellen Infektionen der Haut (einschließlich tiefer und oberflächlicher Pyodermie) bei Hunden, die durch Cefalexin-empfindliche Erreger verursacht werden.

**5. GEGENANZEIGEN**

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Beta-Lactam-Antibiotika Antibiotika oder einem der sonstigen Bestandteile.  
Nicht anwenden bei Niereninsuffizienz.  
Nicht anwenden bei bekannter Resistenz gegenüber Cephalosporine und Penicilline.

Nicht anwenden bei Kaninchen, Meerschweinchen, Hamstern oder Rennmäusen.

## 6. NEBENWIRKUNGEN

Gelegentlich können Erbrechen und/oder Durchfall auftreten. Allergische Reaktionen sind möglich.

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

## 7. ZIELTIERART

Hund

## 8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Die empfohlene Dosis beträgt 25 mg/kg Körpergewicht zweimal täglich.  
Je nach klinischer Beurteilung sollte die Dauer der Behandlung 7 - 28 Tage betragen.

Bei oberflächlichen und tiefen Pyodermien sollte die Behandlung mindestens 21 Tage in Abhängigkeit von der Schwere der klinischen Symptome erfolgen.

Zur Gewährleistung der richtigen Dosierung und Vermeidung einer Unterdosierung muss das Körpergewicht so genau wie möglich bestimmt werden.

## 9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Die Eingabe sollte unmittelbar vor der Futteraufnahme erfolgen.

## 10. WARTEZEIT

Nicht zutreffend.

Hinweis: Nicht bei Tieren anwenden, die der Lebensmittelgewinnung dienen

## 11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern.

Die Blisterstreifen in der Faltschachtel aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton/dem Blisterstreifen angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## 12. BESONDERE WARNHINWEISE

### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren**

Die Anwendung des Tierarzneimittels sollte nach Möglichkeit auf der Grundlage einer Empfindlichkeitsprüfung der vom Tier isolierten Bakterien und unter Berücksichtigung der amtlichen und örtlichen Regelungen für den Einsatz von antimikrobiellen Substanzen erfolgen.

Eine von den Anweisungen in der Zusammenfassung der Merkmale des Tierarzneimittels abweichende Anwendung des Tierarzneimittels kann die Prävalenz Cefalexin-resistenter Bakterien erhöhen und die Wirksamkeit einer Behandlung mit anderen Betalactam-Antibiotika herabsetzen, weil Kreuzresistenzen auftreten können.

#### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender**

Penicilline und Cephalosporine können nach Injektion, Inhalation, oraler Aufnahme oder Hautkontakt zu Überempfindlichkeitsreaktionen (Allergie) führen. Bei Penicillin-Überempfindlichkeit ist eine Kreuzallergie gegen Cephalosporine möglich. Gelegentlich können schwerwiegende allergische Reaktionen vorkommen.

1. Vermeiden Sie den Umgang mit diesem Tierarzneimittel, falls Sie überempfindlich sind oder Ihnen angeraten wurde, den Kontakt mit derartigen Tierarzneimitteln zu vermeiden.
2. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung des Tierarzneimittels, um einen unnötigen direkten Kontakt zu vermeiden. Nach der Anwendung Hände waschen.
3. Falls bei Ihnen nach der Anwendung Symptome wie z.B. Hautausschlag auftreten, suchen Sie einen Arzt auf und zeigen Sie dem Arzt diesen Warnhinweis. Bei schwerwiegenden Symptomen wie Schwellungen im Gesichtsbereich, der Lippen oder der Augen oder Atembeschwerden ist umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bei versehentlicher Einnahme ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen. Zeigen Sie dem Arzt die Packungsbeilage oder das Etikett.

Nach der Anwendung die Hände waschen.

#### **Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation**

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und Laktation beim Hund ist nicht belegt. Nur anwenden nach entsprechender Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen**

Die gleichzeitige Anwendung von Cephalosporinen der ersten Generation mit Aminoglykosiden oder einigen Diuretika wie z.B. Furosemid kann das Risiko einer Nierentoxizität erhöhen. Bei Kombination von Cefalexin mit bakteriostatisch wirksamen Chemotherapeutika (Tetracycline, Chloramphenicol, Makrolide und Rifampicin) können sich die Wirkungen antagonisieren.

#### **Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel), falls erforderlich**

Es wurde gezeigt, dass die Verabreichung eines Vielfachen der empfohlenen Dosis Cefalexin zu keinen schwerwiegenden Nebenwirkungen führt.

#### **13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Tierarzt, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

#### **14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

November 2014

**15. WEITERE ANGABEN**

Packungsgrößen: 40 (60 oder 600) Filmtabletten

Z. Nr.: 8-00398

Für den Tierarzt: Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung.

Vertrieb:

*aristavet* Veterinärspezialitäten GmbH & Co.

Zweigniederlassung Wien

Nussdorfer Str. 38

A-1090 Wien

Telefon: 01 / 317 84 00

e-mail: tierarzneimittel@aristavet.de