

## GEBRAUCHSINFORMATION

### Choliren ReVet RV5 - Injektionslösung für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

**1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaber und Hersteller:  
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim  
Tel.: +49 62 51 / 10 97 0 · Fax: +49 62 51 / 33 42  
[info@reckeweg.de](mailto:info@reckeweg.de)

**2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Choliren ReVet RV5 - Injektionslösung für Tiere

**3. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

1 ml Injektionslösung enthält:

**Arzneilich wirksame Bestandteile:**

0,33 g Carduus marianus C3, 0,33 g Flor de piedra C3, 0,33 g Okoubaka C3.

**Sonstige Bestandteile:**

Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Farblose, klare Lösung

**4. ANWENDUNGSGEBIETE**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.  
Dazu gehören:

- akute und chronische Hepatopathien verschiedener Genese (z.B. Hepatitis, Leberdegeneration),
- toxisch-metabolische und toxisch-nutritive Leber- und Pankreasschäden,
- Pankreatopathien,
- primäre und sekundäre Nierenerkrankungen,
- Stauungen im Pfortadersystem,
- Nierenparenchymschäden (unterstützend),
- Indigestion und Maldigestion,
- unspezifische Durchfälle,
- Kolik bei chronischer Leptospirose und Pankreatitis,
- zur Appetitanregung bei rekonvaleszenten Tieren.

Spezielle pathogenetische und klinische Beziehung zum Hund:

- Nierenschädigung, auch mit beginnender Urämie,
- Aggressivität.

Die Anwendung dieser homöopathischen Arzneispezialität in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

## 5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen, insbesondere gegen Pflanzen der Familie der Korbblütler oder einem der sonstigen Bestandteile.

## 6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie Nebenwirkungen bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

## 7. ZIELTIERART(EN)

Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Katzen, Hunde.

## 8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur subkutanen, intramuskulären oder intravenösen Anwendung.

### Dosierung:

Entsprechend der Tierart und in Abhängigkeit vom Körpergewicht beträgt die Einzeldosis:

Reptilien	ca. 0,1 - 0,5 ml
Kleinnagetiere	ca. 0,1 - 0,2 ml
Kaninchen, Frettchen	ca. 0,1 – 0,5 ml
Ziervögel, Tauben	ca. 0,1 – 0,5 ml
Welpen, Katzen	ca. 0,5 – 1,0 ml
Hunde	ca. 1,0 – 2,0 ml

### Häufigkeit und Dauer der Anwendung:

Die Häufigkeit und Dauer der Anwendung richten sich in erster Linie nach den Grundsätzen der Homöopathie und dem vorliegenden Krankheitsbild.

In akuten Fällen:

1-2 Injektionen pro Tag, über 3-4 Tage. Mit zunehmender Besserung seltener.

In chronischen Fällen:

2 Injektionen pro Woche, über 2-3 Wochen. Mit zunehmender Besserung seltener.

Nach einleitender Injektionstherapie ist die Weiterführung der Behandlung oral mit Choliren ReVet RV5 – Globuli für Tiere möglich.

## 9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Siehe unter Abschnitt Dosierung.

Bei Unklarheiten holen Sie bitte fachliche Beratung ein.

## 10. WARTEZEIT

Null Tage.

## 11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern.

Lichtschutz erforderlich; Präparat daher stets im Umkarton aufbewahren.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Nicht konserviert. Die Ampullen sind nach dem Anbruch sofort aufzubrauchen oder zu entsorgen.

## 12. BESONDERE WARNHINWEISE

### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren**

Bei längerer, nicht indizierter Anwendung von Homöopathika können Arzneimittelprüfsymptome auftreten.

### **Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode**

Wie alle Arzneimittel während der Trächtigkeit, Laktation und Legeperiode nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt anwenden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen**

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn dieses homöopathische Arzneimittel gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

Juni 2014

**15. WEITERE ANGABEN**

Z. Nr.: 8-30034

Rezept- und apothekenpflichtig

Packungsgrößen: 10 mal 2 ml Klarglasampullen