

GEBRAUCHSINFORMATION FÜR
Cyclio 60 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Virbac S.A.
1ère Avenue L.I.D. 2065m
F-06516 Carros Cedex

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Cyclio 60 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen
Pyriproxifen

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Pipette mit 0,6 ml durchsichtige Lösung enthält:

Wirkstoff:
Pyriproxifen 60,0 mg

Sonstige Bestandteile:
Butylhydroxytoluol (E321) 0,6 mg

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Verhinderung der Vermehrung von pyriproxifen-empfindlichen Flöhen (*Ctenocephalides felis*) durch Hemmung der Ei- und Larvenentwicklung für 3 Monate bei Katzen.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht bei Katzen von weniger als 1 kg Körpergewicht sowie bei kranken oder rekonvaleszenten Tieren anwenden.

6. NEBENWIRKUNGEN

Unter den selten auftretenden Nebenwirkungen wurde an der Applikationsstelle über vorübergehende Hautreaktionen (Schuppenbildung, lokale Alopezie, Pruritus, Erythem) und generell über Pruritus oder Alopezie nach Anwendung berichtet. Hypersalivation oder Erbrechen wurden ausnahmsweise nach der Behandlung beobachtet.

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Katze

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Einmalige Applikation einer Pipette pro Katze (entspricht einer Mindestdosierung von 10 mg Pyriproxifen pro kg Körpergewicht). Eine Pipette mit 0,6 ml Inhalt genügt für eine Katze mit einem Körpergewicht von 1 bis 6 kg.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Das Tierarzneimittel soll direkt im Nackenbereich auf die Haut des Tieres aufgetragen werden. Es ist darauf zu achten, dass der Ansatz der Pipette während der Applikation die Haut ständig berührt. Der Inhalt der Pipette wird durch vorsichtiges 4maliges Pressen des Pipettenansatzes herausgedrückt.

Eine zweite Applikation kann nach 3 Monaten vorgenommen werden. Die Wirksamkeit hält dann 3 weitere Monate vor.

10. WARTEZEIT

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf der Pipette angegebenen Verfalldatum <Verwendbar bis: Ende {MM/JJJJ}> nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Falls mehrere Tiere in demselben Haushalt leben, sollte jedes Tier mit geeigneten Mitteln behandelt werden.

Bei häufiger und wiederholter Anwendung von Antiparasitika können Parasiten Resistenzen gegen den verwendeten Wirkstoff bzw. der Wirkstoff-Gruppe entwickeln.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Wird ein Flohbefall bei der ersten Behandlung festgestellt oder tritt Flohbefall während der Behandlung auf, so können die Flöhe mit geeigneten Insektiziden eliminiert werden.

Der Einfluss eines Bades oder von Wasser unmittelbar nach der Behandlung wurde nicht geprüft. Daher ist nicht auszuschließen, dass die Wirksamkeit beeinträchtigt werden kann, wenn das Tier unmittelbar nach der Behandlung nass gemacht oder shampooiert wird.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Nach Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen.

Bei Augenirritation ärztlichen Rat einholen.

Nach der Anwendung Hände waschen.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Studien an Labortieren (Ratte, Mäuse, Kaninchen) zeigten bei therapeutischer Dosierung von Pyriproxifen weder teratogene noch embryotoxische Effekte.

Es wird jedoch nicht empfohlen das Tierarzneimittel bei trächtigen oder laktierenden Katzen anzuwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

In klinischen Feldstudien wurde keine Wechselwirkung zwischen Organophosphaten oder Pyrethroiden und Pyriproxifen beobachtet.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel):

Durch Überdosierung verursachte Symptome sind nicht bekannt. In Untersuchungen mit täglicher Anwendung der 3-fachen Dosis an 3 aufeinanderfolgenden Tagen konnten keine Unverträglichkeitsreaktionen festgestellt werden.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Da Pyriproxifen für Fische oder bestimmte im Wasser lebende Organismen toxisch ist, darf es nicht in Gewässer gelangen.

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon abstammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

15. WEITERE ANGABEN

Packungsgrößen:

Packung mit 1 Pipette, 2 Pipetten oder 4 Pipetten zu je 0,6 ml.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Zul.-Nr.: 8-00469

Mitvertrieb in AT:

VIRBAC Österreich GmbH

A-1180 Wien