

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR PATIENTEN

### **Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel**

Wirkstoff: Dexpanthenol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel beachten?
3. Wie ist Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel und wofür wird es angewendet?**

Panthothensäure ist ein wasserlösliches Vitamin, welches als Coenzym-A an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Dexpanthenol/Panthenol kann bei äußerlicher Anwendung einen erhöhten Panthothensäurebedarf der geschädigten Haut bzw. Schleimhaut ausgleichen.

Anwendungsgebiete:

Behandlung nichtentzündlicher Hornhauterkrankungen (Keratopathien), z.B. Hornhautdystrophien, Hornhautdegenerationen, rezidivierende Hornhauterosionen und -läsionen bei Kontaktlinsträgern.

Zusätzliche Medikation zur Unterstützung des Heilungsverlaufs bei Hornhaut- und Bindehautschädigung, Verätzung und Verbrennung.

Zur Unterstützung einer spezifischen Therapie von durch Bakterien, Viren oder Pilze verursachten Hornhauterkrankungen.

Hinweis:

Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel ist nicht geeignet zur Heilung infektiöser Hornhautprozesse bakteriellen, viralen oder mykotischen Ursprungs, sondern nur als Unterstützung zu einer spezifischen Therapie dieser Hornhauterkrankungen.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel beachten?**

**Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Dexpanthenol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel anwenden.

Kontaktlinsenträger sollen während des Tragens der Linsen Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel nicht benutzen, da dies zu Verschmierung der Kontaktlinse sowie eventuell zu Unverträglichkeiten mit dem Linsenmaterial führen könnte.

Bei Augenschmerzen, Tränenfluss oder Augenrötungen oder wenn sich der Zustand des behandelten Auges verschlechtert, ist eine Überempfindlichkeit auf Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel nicht ausgeschlossen.

Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel enthält das Konservierungsmittel Cetrimid, das insbesondere bei häufigerer und längerer Anwendung Reizungen des Auges (Brennen, Rötungen, Fremdkörpergefühl) hervorrufen und das Hornhautepithel schädigen kann. Für die Langzeitbehandlung sind daher Arzneimittel ohne Konservierungsmittel zu bevorzugen.

Wichtig sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen durch Ihren Augenarzt. Denn falsch oder unzureichend behandelt, kann das Auge ernsthaft geschädigt werden!

**Anwendung von Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel zusammen mit anderen Arzneimitteln**  
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind nicht bekannt, dennoch hat bei zusätzlicher Behandlung mit anderen Arzneimitteln zur Anwendung am Auge zwischen der Anwendung der unterschiedlichen Arzneimittel mindestens ein Zeitraum von 5 Minuten zu liegen. Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel ist auf jeden Fall als letztes anzuwenden.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da die sichere Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eindeutig geklärt ist, ist Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel während dieser Zeit nicht zu verwenden.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**



Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel kann vorübergehend zu verschwommenem Sehen führen und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder beim Bedienen von Maschinen beeinträchtigen. Diese Tätigkeiten sind erst bei vollständiger Wiederherstellung der Sehleistung wieder aufzunehmen.

### **3. Wie ist Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

#### *Dosierung:*

Soweit nicht anders verordnet, und je nach Schwere und Ausprägung der Beschwerden tropfen Sie 3 bis 5-mal täglich oder häufiger und vor dem Schlafengehen 1 Tropfen in den Bindehautsack.

#### *Art der Anwendung:*

Zur Anwendung am Auge.

Das Augengel ist grundsätzlich so anzuwenden, dass ein Kontakt der Tubenspitze mit Fingern, Auge oder Gesichtshaut vermieden wird.

Halten Sie beim Tropfen die Tube senkrecht über das Auge, ohne den Bindehautsack zu berühren. So entsteht ein kleiner Tropfen, der sich leicht von der Tubenspitze löst. Durch mehrere Lidschläge sowie Bewegung des Augapfels wird das Augengel gleichmäßig verteilt.



Verschließen Sie die Tube nach dem Gebrauch wieder mit der Schutzkappe. Die Verschlusskappe ist zugleich als Standfuß geeignet und ermöglicht Ihnen das senkrechte Abstellen der Tube. Die Tube darf nicht ohne Verschlusskappe abgelegt oder aufbewahrt werden.

*Dauer der Anwendung:*

Die Anwendungsdauer ist soll bis zur subjektiven Besserung der Beschwerden erfolgen. Bei länger dauernder Anwendung ist ärztlicher Rat einzuholen. Siehe auch Abschnitt „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“.

**Wenn Sie eine größere Menge von Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel angewendet haben, als Sie sollten**

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

**Wenn Sie die Anwendung von Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben, sondern holen Sie die Anwendung so schnell wie möglich nach und dosieren Sie anschließend mit gleicher Menge und im gleichen Zeitabstand wie oben angegeben bzw. wie vorher von Ihrem Arzt verordnet weiter.

**Wenn Sie die Anwendung von Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel abbrechen**

Brechen Sie die Anwendung von Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ab.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Allergische Reaktionen sind möglich, die Häufigkeit ist nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Bei Augenschmerzen, Tränenfluss oder Augenrötungen, oder wenn sich der Zustand des behandelten Auges verschlechtert, ist eine Überempfindlichkeit auf Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel nicht ausgeschlossen.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
 Traisengasse 5  
 1200 WIEN  
 ÖSTERREICH  
 Fax: + 43 (0) 50 555 36207  
 Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel aufzubewahren?**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. der Tube nach „Verwendbar bis“ bzw. „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Das Arzneimittel ist nach Anbruch 6 Wochen haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall.. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel enthält**

Der Wirkstoff ist: Dexpanthenol. 1 g Augengel enthält 50 mg Dexpanthenol. 1 g entspricht 44 Tropfen. 1 Tropfen enthält ca. 1,15 mg Dexpanthenol.

Die sonstigen Bestandteile sind: Cetrimid 0,1 mg/g als Konservierungsmittel, Dinatriumedetat, Carbomer, Natriumhydroxid und Wasser für Injektionszwecke

### **Wie Dexpanthenol AGEPHA 5% Augengel aussieht und Inhalt der Packung**

Klares, farbloses, wässriges, tropffähiges Augengel, frei von sichtbaren Partikeln.

Viskosität: 5500 – 9500 cP

pH: 6,4 – 7,2

1 Umkarton enthält 1 Tube zu 10 g Augengel.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Agepha PHARMA s.r.o.

SK-90301 Senec

Tel.Nr.: +421 692 054 363

Fax Nr.: +421 245 528 069

E-mail: [office@agepha.com](mailto:office@agepha.com)

**Z.Nr.:**

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2017.**