

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Doxazosin Genericon 2 mg Tabletten

Doxazosin Genericon 4 mg Tabletten

Wirkstoff: Doxazosin

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. [Siehe Abschnitt 4.](#)

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Doxazosin Genericon und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Doxazosin Genericon beachten?
3. Wie ist Doxazosin Genericon einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Doxazosin Genericon aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Doxazosin Genericon und wofür wird es angewendet?

Der Wirkstoff in den Tabletten, Doxazosin, gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln (Alphablocker), die durch Erweiterung der Blutgefäße den Blutdruck senken und bei Patienten mit gutartiger Vergrößerung der Prostata den Harnfluss durch Entspannung der Muskulatur in Prostata und Harnblase verbessern.

Doxazosin Genericon wird angewendet für die Behandlung von

- Bluthochdruck.
- Beschwerden bei gutartiger Vergrößerung der Vorsteherdrüse (benigne Prostatahyperplasie), wenn keine Operation erforderlich ist.

Doxazosin Genericon wird bei Erwachsenen angewendet.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Doxazosin Genericon beachten?

Doxazosin Genericon darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Doxazosin, ähnliche Wirkstoffe (andere Chinazoline, z.B. Prazosin, Terazosin) oder einen der in [Abschnitt 6](#) genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie beim Aufstehen oder Aufsetzen einen Blutdruckabfall haben oder schon einmal hatten, der zu Schwindel oder Benommenheit führen kann (orthostatische Hypotonie).
- wenn Sie an einer gutartigen Vergrößerung der Prostata (benigne Prostatahyperplasie) leiden und gleichzeitig eine Einengung der oberen Harnwege, eine chronische Harnwegsinfektion oder Blasensteine haben.
- wenn Sie ständig Harn verlieren (Überlaufblase) oder nicht genügend Harn bilden (Anurie), mit oder ohne fortschreitender Einschränkung der Nierenfunktion. In diesem Fall dürfen Sie Doxazosin Genericon nicht als einziges Arzneimittel zur Behandlung einnehmen.
- wenn Sie einen niedrigen Blutdruck haben (ist nur zutreffend, wenn Sie wegen einer gutartigen Vergrößerung der Prostata behandelt werden).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Doxazosin Genericon einnehmen.

Besonders zu Behandlungsbeginn oder bei Dosiserhöhung können durch einen Blutdruckabfall beim Aufstehen oder Aufsetzen Beschwerden wie Schwindel und Schwächegefühl, in seltenen Fällen auch Ohnmachtsanfälle, auftreten (orthostatische Hypotonie). Daher wird Ihr Arzt am Anfang der Behandlung regelmäßig Ihren Blutdruck kontrollieren.

Vermeiden Sie zu Beginn der Behandlung Umstände, bei denen Sie sich infolge von Schwindel oder Schwächeanfällen verletzen könnten.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Doxazosin Genericon ist erforderlich,

- wenn Sie sich einer Augenoperation aufgrund einer Linsentrübung (Kataraktoperation) unterziehen müssen. Informieren Sie Ihren Augenarzt vor der Operation, dass Sie Doxazosin einnehmen oder eingenommen haben, da es zu Komplikationen während der Operation kommen kann. Der operierende Arzt kann dadurch entsprechende Vorbereitungen treffen, um diese Komplikationen zu beherrschen.
- wenn Sie eine eingeschränkte Leberfunktion haben.
- wenn Sie eine akute Herzerkrankung haben, wie z.B. eine Flüssigkeitsansammlung in der Lunge (Lungenödem) oder eine Herzleistungsschwäche. Ihr Arzt wird Ihre Herzfunktion regelmäßig überwachen.
- wenn Sie unter schweren Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße leiden (Angina pectoris). Eine zu rasche oder zu starke Verringerung des Blutdrucks kann zu einer Verschlechterung der Beschwerden führen.
- wenn Sie gleichzeitig Arzneimittel zur Behandlung von Erektionsstörungen (Phosphodiesterase-5-Inhibitoren [PDE-5-Hemmer], z.B. Sildenafil, Tadalafil und Vardenafil) einnehmen. Die gleichzeitige Anwendung kann durch einen zu niedrigen Blutdruck zu Schwindel und Benommenheit führen, da beide Arzneimittel gefäßerweiternd wirken. Nehmen Sie Doxazosin Genericon in einer regelmäßigen Tagesdosis ein, bevor Sie Arzneimittel zur Behandlung von Erektionsstörungen einnehmen, um so die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass derartige Beschwerden bei Ihnen auftreten. Die Einnahme der Arzneimittel hat in einem ausreichenden zeitlichen Abstand zu erfolgen. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe, falls Sie unter der Behandlung mit Doxazosin Genericon eine Dauererektion haben, die länger als 4 Stunden anhält.

Vor Beginn einer Behandlung mit Doxazosin Genericon könnte Ihr Arzt verschiedene Kontrolluntersuchungen durchführen, um das Vorliegen anderer Krankheiten wie etwa Prostatakarzinom auszuschließen, die mit den gleichen Beschwerden wie eine benigne Prostatahyperplasie verbunden sein können.

Kinder und Jugendliche

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Doxazosin Genericon bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist nicht erwiesen. Aus diesem Grund wird die Anwendung nicht empfohlen.

Einnahme von Doxazosin Genericon zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie bereits eines der folgenden Arzneimittel einnehmen/anwenden:

- andere Arzneimittel zur Behandlung von hohem Blutdruck und andere gefäßerweiternde Arzneimittel (Alphablocker)
- Arzneimittel zur Behandlung von Erektionsstörungen (PDE-5-Hemmer, z.B. Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil) (siehe Abschnitt [„Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“](#))

- Gefäßerweiternde Arzneimittel (z.B. Nitrate zur Behandlung von Brustschmerzen)
- Arzneimittel, die Östrogene enthalten (z.B. Arzneimittel zur Hormonersatztherapie oder zur Empfängnisverhütung)
- blutdrucksteigernde Arzneimittel (Sympathomimetika, z.B. Dopamin, Ephedrin, Adrenalin, Metaraminol, Methoxamin und Phenylephrin)
- bestimmte Arzneimittel gegen bakterielle Infektionen oder Pilzinfektionen (Clarithromycin, Itraconazol, Ketoconazol, Telithromycin oder Voriconazol)
- Arzneimittel gegen HIV-Infektionen (Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir oder Saquinavir)
- Nefazodon (gegen Depression)
- Cimetidin (gegen Sodbrennen und säurebedingte Magenbeschwerden)

Doxazosin kann einige Laborwerte beeinflussen. Ihr Arzt sollte dies vor entsprechenden Laboruntersuchungen (z.B. Phäochromozytom-Diagnostik) berücksichtigen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Sie dürfen Doxazosin Genericon während der Schwangerschaft nur in unbedingt notwendigen Fällen und nur auf Anweisung Ihres Arztes einnehmen.

Doxazosin kann in geringen Mengen in die Muttermilch übertreten. Stillen Sie daher nur, wenn Ihr Arzt Ihnen dazu geraten hat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Achtung: Dieses Arzneimittel kann die Reaktionsfähigkeit und Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen!

Besonders zu Beginn der Behandlung oder bei Erhöhung der Dosis können Benommenheit, Schwindel oder Müdigkeit auftreten. Führen Sie kein Fahrzeug und bedienen Sie keine Maschinen, wenn Sie solche Nebenwirkungen bei sich bemerken.

Doxazosin Genericon enthält Lactose.

Bitte nehmen Sie Doxazosin Genericon erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Doxazosin Genericon enthält Natrium.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablette, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

3. Wie ist Doxazosin Genericon einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Behandlung von Bluthochdruck

Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 1 mg Doxazosin einmal täglich. Falls erforderlich, kann Ihr Arzt die Dosis schrittweise in Abständen von 1–2 Wochen erhöhen. Die höchste empfohlene Dosis beträgt 16 mg Doxazosin einmal täglich.

Behandlung von Beschwerden bei gutartiger Vergrößerung der Prostata

Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 1 mg Doxazosin einmal täglich. Falls erforderlich, kann Ihr Arzt die Dosis schrittweise in Abständen von 1–2 Wochen erhöhen. Die durchschnittliche Erhaltungsdosis beträgt 2–4 mg Doxazosin einmal täglich. Die höchste empfohlene Dosis beträgt 8 mg Doxazosin einmal täglich.

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion und ältere Patienten

Die Dosis ist so niedrig wie möglich zu halten und Dosiserhöhungen sollen nur unter strenger Beobachtung zu erfolgen.

Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion

Wenn Ihre Leberfunktion eingeschränkt ist, ist Doxazosin besonders vorsichtig zu dosieren.
Wenn Ihre Leberfunktion stark eingeschränkt ist, wird eine Anwendung nicht empfohlen.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Doxazosin Genericon bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist nicht erwiesen. Aus diesem Grund wird die Anwendung nicht empfohlen.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Nehmen Sie die Tabletten unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ein. Sie können die Tabletten unabhängig von einer Mahlzeit einnehmen.

Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Doxazosin Genericon eingenommen haben, als Sie sollten

Die häufigsten Anzeichen einer Überdosierung sind ein starker Blutdruckabfall mit Schwindel, Benommenheit oder Ohnmachtsanfällen. Legen Sie sich auf den Rücken und lagern Sie Ihre Füße so, dass sie höher liegen als Ihr Kopf. Wenden Sie sich umgehend an einen Arzt oder ein Krankenhaus. Der Arzt kann entsprechend der Schwere der Überdosierung bzw. der Art der Beschwerden über die erforderlichen Maßnahmen entscheiden.

Nehmen Sie die Gebrauchsinformation oder die Verpackung von Doxazosin Genericon mit, damit der Arzt weiß, welchen Wirkstoff Sie eingenommen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Doxazosin Genericon vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Nehmen Sie stattdessen einfach die folgende Dosis zur gewohnten Zeit ein.

Wenn Sie die Einnahme von Doxazosin Genericon abbrechen

Die Behandlung mit Doxazosin Genericon darf nur in Absprache mit Ihrem Arzt geändert oder beendet werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt, wenn eine der folgenden Beschwerden bei Ihnen auftritt:

- **allergische Reaktionen** mit Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge oder Rachen, Schwierigkeiten beim Atmen oder Schlucken, Nesselsucht und Juckreiz (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)
- **Herzklopfen** (Palpitationen), **schneller Herzschlag** (Tachykardie) (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)
- **Schmerzen in der Brust** (Angina pectoris), **Herzrhythmusstörungen**, **Herzinfarkt** oder **Schlaganfall** (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)
- **Leberentzündung**: Lebererkrankung mit Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Fieber, Juckreiz, Gelbfärbung von Haut und Schleimhäuten und dunkel gefärbtem Urin (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen)

- **Gelbsucht:** Gelbfärbung von Haut und Schleimhäuten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen)

Wenn Sie eine oder mehrere dieser Beschwerden an sich bemerken, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

Andere mögliche Nebenwirkungen

Sehr häufig (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen)

- Schwindel
- Kopfschmerzen

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)

- Infektionen der Atemwege, Infektionen der Harnwege
- Angstzustände
- Schlaflosigkeit
- Nervosität
- Benommenheit
- Missempfindungen wie Kribbeln oder Taubheitsgefühl (Parästhesie)
- Schläfrigkeit
- Schwindel beim Aufstehen oder Aufsetzen (orthostatischer Schwindel)
- Sehstörungen
- Drehschwindel (Vertigo)
- Schwindel
- niedriger Blutdruck, Blutdruckabfall beim Aufstehen oder Aufsetzen (orthostatische Hypotonie)
- Entzündung der Atemwege (Bronchitis)
- Schwellungen der Nasenschleimhaut
- Schnupfen (Rhinitis)
- Husten
- Atembeschwerden (Dyspnoe)
- Durchfall
- Bauchschmerzen
- Übelkeit
- Verdauungsstörung (Dyspepsie)
- Mundtrockenheit
- Juckreiz
- verstärktes Schwitzen
- Muskelschmerzen
- Rückenschmerzen
- Blasenschwäche (Harninkontinenz)
- Entzündung der Harnblase
- Erhöhte Harnausscheidung
- Schwächegefühl
- Brustschmerzen
- grippeähnliche Beschwerden
- Flüssigkeitsansammlungen in den Gliedmaßen (periphere Ödeme)
- Müdigkeit
- Unwohlsein

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)

- Appetitlosigkeit
- Durst
- Gicht

- gesteigerter Appetit
- Ruhelosigkeit
- Depression
- Schlafstörungen
- Gedächtnisverlust
- Gefühlsschwankungen
- Zittern
- verminderte Berührungs- und Schmerzempfindlichkeit (Hypästhesie)
- Ohnmachtsanfall (Synkope)
- Konzentrationsstörungen
- abnormaler Tränenfluss
- Bindehautentzündung
- Ohrgeräusche (Tinnitus)
- Hitzewallungen
- Hautrötung
- Durchblutungsstörungen in den Gliedmaßen
- Blässe
- Nasenbluten
- Entzündungen im Bereich der oberen Luftwege
- Rachenentzündung
- Erbrechen
- Entzündung des Magen-Darmtrakts (Gastroenteritis)
- Blähungen
- Verstopfung
- Geschmacksstörungen
- abnorme Leberfunktionswerte (im Blut)
- Haarausfall
- Hautausschlag
- Blutungen in der Haut oder den Schleimhäuten (Purpura)
- Muskelkrämpfe
- Gelenkschmerzen
- Muskelschwäche
- Muskelzucken
- Muskelsteife
- häufiger Harndrang
- erschwertes oder schmerzhaftes Harnlassen (Dysurie)
- Blut im Harn (Hämaturie)
- häufiger Harnabsatz (Polyurie)
- Impotenz
- Schmerzen
- Schwellungen im Gesicht
- Fieber
- Schüttelfrost
- Gewichtszunahme

Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen)

- Lichtscheue (Photophobie)
- Magen-Darm-Verschluss
- verminderte Körpertemperatur bei älteren Personen
- Erhöhung von bestimmten Leber- und Nierenwerten (Transaminasen, BUN, Kreatinin)
- verringerter Kaliumspiegel im Blut
- Verringerung der roten und weißen Blutkörperchen und Blutplättchen (Hämatokrit, Erythrozyten, Leukozyten und Thrombozyten)

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen)

- Verminderung der Blutplättchen (Thrombozytopenie)
- Verminderung der weißen Blutkörperchen (Leukopenie)
- verschwommenes Sehen
- langsamer Herzschlag (Bradykardie)
- Kehlkopfschwellung
- Verengung/Verkrampfung der Atemwege (Bronchospasmen)
- Gallestau (Cholestase)
- Nesselsucht (Urticaria)
- Beschwerden bei der Blasenentleerung (Miktionsstörungen)
- vermehrte Harnproduktion (Diurese)
- vermehrtes nächtliches Harnlassen (Nykturie)
- Vergrößerung der Brustdrüse beim Mann (Gynäkomastie)
- schmerzhafte Dauererektion des Penis (Priapismus): Nehmen Sie umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch.

Nebenwirkungen, deren Häufigkeit nicht bekannt ist, umfassen:

- Komplikationen bei Augenoperationen (Intraoperatives Floppy-Iris-Syndrom; IFIS)
- Samenerguss in die Harnblase (retrograde Ejakulation)

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Doxazosin Genericon aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterpackung nach „Verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 30 °C lagern.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Doxazosin Genericon enthält

Der Wirkstoff ist: Doxazosin (als Mesilat).

Doxazosin Genericon 2 mg: Jede Tablette enthält 2 mg Doxazosin (als Mesilat).

Doxazosin Genericon 4 mg: Jede Tablette enthält 4 mg Doxazosin (als Mesilat).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Mikrokristalline Cellulose, Lactose, Magnesiumstearat, Natriumdodecylsulfat, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), kolloidales wasserfreies Siliciumdioxid.

Wie Doxazosin Genericon aussieht und Inhalt der Packung

Doxazosin Genericon 2 mg Tabletten sind weiße, längliche Tabletten mit einer Bruchkerbe auf einer Seite und der Prägung „D2“ auf der gleichen Seite.

Doxazosin Genericon 4 mg Tabletten sind weiße, längliche Tabletten mit einer Bruchkerbe auf einer Seite und der Prägung „D4“ auf der gleichen Seite.

Doxazosin Genericon ist in Packungen mit 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 98, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 oder 1000 Tabletten in PVC/PVDC/Aluminium-Blisterpackungen erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

A-8054 Graz

E-Mail: genericon@genericon.at

Zulassungsnummer:

Doxazosin Genericon 2 mg: 1-23635

Doxazosin Genericon 4 mg: 1-23636

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2021.