

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann

Wirkstoff:

Trockenextrakt aus entfetteten Kürbissamen (Cucurbitae semen)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 6 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann beachten?
3. Wie sind Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann und wofür werden Sie angewendet?

Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann sind ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel und enthalten einen Extrakt aus entfetteten Kürbissamen des Steirischen Ölkürbis (Cucurbitae semen von Cucurbita pepo L. convar. citrullina var. styriaca). In der Volksmedizin finden die Kürbiskerne seit Jahrhunderten Verwendung, insbesondere bei Blasenentleerungs-Störungen des Mannes im fortgeschrittenen Alter.

Anwendungsgebiete:

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Vorbeugung und Behandlung von Funktionsstörungen der ableitenden Harnwege infolge einer gutartigen Vergrößerung der Prostata, die zu folgenden Beschwerden beim Harnlassen führen kann:

- häufiger, oft nächtlicher Harndrang
- Blasenschwäche, Nachträufeln- dünner, kraftloser Harnstrahl
- verzögertes Wasserlassen
- unzureichende Blasenentleerung

Vor Beginn der Behandlung sollten schwerwiegende Ursachen durch den Arzt ausgeschlossen werden.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für das genannte Anwendungsgebiet registriert ist.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei erwachsenen Männern ab 18 Jahren.

Wenn Sie sich nach 6 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann beachten?

Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Bei Verschlimmerung der Beschwerden oder bei Auftreten von Fieber, Krämpfen, Blut im Urin, Schmerzen beim Harnlassen oder akutem Harnverhalten muss unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.

Kinder und Jugendliche

Aufgrund der Anwendungsgebiete ist dieses Arzneimittel für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht vorgesehen.

Einnahme von Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Aufgrund der Anwendungsgebiete ist dieses Arzneimittel nicht zur Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit bestimmt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann enthalten Maltodextrin.

Diabetiker-Hinweis: 1 Filmtablette enthält 0,02 Broteinheiten (BE).

3. Wie sind Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der Anweisung ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene:

Während der ersten 2-4 Wochen der Behandlung 2 x 1 Tablette täglich, am besten morgens und vor der Nachtruhe.

Danach kann die Dosis je nach Beschwerdegrad auf 1 Tablette täglich reduziert werden, wobei die Einnahme am besten vor der Nachtruhe erfolgt.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen

Die Filmtabletten sollten mit ausreichend Flüssigkeit unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden.

Dauer der Anwendung:

Wenn Sie sich nach 6 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Die Dauer der Anwendung sollte zumindest 3 Monate betragen und ist nicht begrenzt.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Aufgrund der Anwendungsgebiete ist dieses Arzneimittel für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht vorgesehen.

Wenn Sie eine größere Menge von Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann eingenommen haben, als Sie sollten

Es ist kein Fall von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Beobachtet wurden:

Sehr selten: leichte Magen- Darmbeschwerden

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen,

Traisengasse 5,

1200 WIEN,

ÖSTERREICH.

Fax: + 43 (0) 50 555 36207,

Website: <http://www.basg.gv.at/>.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann aufzubewahren?

Nicht über 30° C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ und dem Blister nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann enthalten

Der Wirkstoff ist:

Trockenextrakt entfetteten Kürbissamen (Cucurbitae semen),

1 Filmtablette enthält:

400 mg Trockenextrakt aus entfetteten Kürbissamen (Cucurbitae semen von Cucurbita pepo L. convar. citrullina var. styriaca, steirischer Ölkürbis),
(Droge-Extrakt-Verhältnis 21-36:1), Auszugsmittel Ethanol 60% m/m

Die sonstigen Bestandteile sind:

Maltodextrin, vorverkleisterte Stärke, mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat, Siliciumdioxid, Crospovidon, Cellulosepulver, basisches Butylmethacrylat-Copolymer (Eudragit E 12,5), Talk, Titandioxid (E171), Macrogol 5600-6600

Wie Dr. Böhm Kürbis 400 mg Filmtabletten für den Mann aussehen und Inhalt der Packung
cremefarbige, oblonge, bikonvexe Filmtabletten in PVC/PVDC - Aluminium – Blisterpackung.

Packungsgrößen: 15, 30, 60 oder 90 Filmtabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3
8010 Graz

Reg. Nr.:

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2018.