

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Erdotek 225 mg – Granulat

Wirkstoff: Erdosteine

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme von Erdotek 225 mg - Granulat beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Erdotek 225 mg – Granulat und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Erdotek 225 mg – Granulat beachten?
3. Wie ist Erdotek 225 mg – Granulat einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Erdotek 225 mg – Granulat aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Erdotek 225 mg – Granulat und wofür wird es angewendet?

Erdotek 225 mg – Granulat enthält den Wirkstoff Erdosteine – ein Mukolytikum (=Schleimlöser), welches die Zähigkeit des Bronchialsekrets verringert, deren Abhusten erleichtert und dadurch die Atmung verbessert.

Anwendungsgebiete:

Atemwegserkrankungen, die zur Bildung von zähem Sekret führen, welches nicht oder ungenügend abgehustet werden kann, wie akute Bronchitis, akute Schübe einer chronischer Erkrankung.

Wenn Sie sich nach drei Tagen der Anwendung nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Erdotek 225 mg – Granulat beachten?

Erdotek 225 mg - Granulat darf nicht eingenommen werden,

- Wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Erdosteine oder einen der sonstigen Bestandteile von Erdotek 225 mg – Granulat sind.
- Von Kindern und Jugendlichen
- Wenn Sie an einem Mangel des Enzyms Cystathionin-Synthetase leiden und eine Methionin - freie Diät einhalten müssen (z.B. bei Homocystinurie)
- Bei einer schweren Nierenerkrankung
- Wenn Sie an Phenylketonurie leiden, da Erdotek 225 mg – Granulat Aspartam enthält und dieses zu Phenylalanin verstoffwechselt wird, was schädliche Auswirkungen haben kann.
- Bei einer schweren Lebererkrankung
- Wenn sie an einem Magengeschwür leiden

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Erdotek 225 mg - Granulat ist erforderlich

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt falls sich Anzeichen und Symptome einer Überempfindlichkeitsreaktion zeigen. Die Einnahme von Erdotek 225 mg – Granulat muss dann sofort abgebrochen werden.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bevor Sie Erdotek 225 mg - Granulat einnehmen, wenn Sie Leber- oder Nierenprobleme haben.

Kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt bevor Sie Erdotek 225 mg - Granulat einnehmen, wenn Sie von Ihrem Arzt schon früher darauf hingewiesen wurden, dass Sie unter Zuckerunverträglichkeiten leiden.

Das das Arzneimittel Natriumbenzoat enthält kann es zu allergischen Reaktionen (auch verzögert) kommen.

Bei Einnahme von Erdotek 225 mg - Granulat mit anderen Arzneimitteln

Erdotek 225 mg - Granulat kann mit anderen Medikamenten gegen Husten und Erkältung sowie chronischen Atemwegserkrankungen, zum Beispiel Antibiotika Theophyllin oder bronchienerweiternden und entzündungshemmenden Medikamenten angewendet werden.

Beachten Sie jedoch, dass die gleichzeitige Anwendung von Erdotek 225 mg - Granulat mit hustenstillenden Medikamenten (Antitussiva) nicht empfohlen wird. Hustenstillende Medikamente verhindern das Abhusten des Sekretes und infolge kann es zu einem Sekretstau, mit erhöhtem Risiko einer zusätzlichen Infektion sowie eines Bronchienkrampfes, kommen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittel Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da nicht genügend Daten über die Anwendung von Erdosteine in schwangeren oder stillenden Frauen vorliegen, wird die Anwendung von Erdotek 225 mg – Granulat in Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Erdotek 225 mg - Granulat hat keine beziehungsweise vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. Wie ist Erdotek 225 mg – Granulat einzunehmen?

Nehmen Sie das Arzneimittel immer genau nach den Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis lautet: 1 Portionsbeutel zweimal täglich vor den Mahlzeiten. Lösen Sie den Inhalt eines Portionsbeutels in einem Glas Wasser und trinken Sie es unverzüglich. Die maximale Tagesdosis beträgt 600 mg Erdostein.

Bei schwerer Leberinsuffizienz ist Erdotek aufgrund des Fehlens klinischer Daten nicht anzuwenden. Bei Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion ist die Dosis zu halbieren (=1 Portionsbeutel pro Tag).

Bei Niereninsuffizienz und einer Creatinin Clearance $>25\text{ml/min}$ ist keine Dosisanpassung notwendig. Aufgrund fehlender klinischer Daten ist Erdotek für Patienten mit einer Creatinin Clearance $<25\text{ml/min}$ nicht geeignet. Erdotek darf bei Kindern und Jugendlichen nicht angewendet werden.

Anwendungsdauer

Die Erleichterung sollte nach 3 Tagen einsetzen; sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Die Anwendung sollte nicht länger als 10 Tage erfolgen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie zuviel Erdotek eingenommen haben

Wenn Sie eine höhere Dosis als empfohlen eingenommen haben können Schwitzen, Schwindel und Hitzewallungen auftreten.

Im Falle einer Überdosierung kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt.

Wenn Sie vergessen haben Erdotek einzunehmen

Nehmen Sie die nächste Dosis wie gewöhnlich ein.

Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, nehmen Sie bei der nächsten Anwendung nicht die doppelte Dosis ein.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch Erdotek 225 mg - Granulat Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Einige Nebenwirkungen treten sehr selten auf.

(können bei bis zu 1 von 10000 Personen auftreten)

Kopfschmerzen, Erkältungssymptome, Schwierigkeiten bei der Atmung, Geschmacksänderungen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Magenschmerzen (Sodbrennen), Hautausschläge, Rötungen der Haut, Ekzem (=entzündliche Hauterkrankung).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen melden. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen.

Trasengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at>

5. Wie ist Erdotek 225 mg – Granulat aufzubewahren?

Das Arzneimittel darf nicht über 25°C gelagert werden.

Sie dürfen Erdotek 225 mg - Granulat nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Entsorgen Sie angefangene Arzneimittel nicht über das Abwasser oder den normalen Haushaltsmüll. Fragen Sie Ihren Apotheker wie Sie Arzneimittel die Sie nicht mehr verwenden entsorgen sollen. Diese Massnahmen helfen die Umwelt zu schützen.

6. Inhalt der Packung und weitere Information

Was Erdotek 225 mg – Granulat enthält

- Der Wirkstoff ist: 225 mg Erdosteine pro Portionsbeutel.
- Die weiteren Bestandteile sind: Natriumbenzoat, Saccharose, Aspartam, Carboxymethylstärke Natrium, Zitronenaroma

Wie Erdotek 225 mg – Granulat aussieht und Inhalt der Packung

Beschreibung: Feines, weißes Pulver mit charakteristischem angenehmen Geruch und Geschmack.

Packungsinhalt: Packung mit 30 Portionsbeuteln

Pharmazeutischer Unternehmer

Edmond Pharma S.r.l., Strada Statale dei Giovi, 131, 20037 - Paderno Dugnano (MI), Italien

Hersteller

Angelini Pharma Česká republika s.r.o
Pátevní 7, 63 500 Brno, Czech Republic

Z.Nr.: 1-25319

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2017