

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

EUCILLIN “B” – Salbe

Wirkstoffe: Bacitracin, Dequaliniumchlorid, Diphenylpyralinhydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist EUCILLIN “B” - Salbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von EUCILLIN “B” - Salbe beachten?
3. Wie ist EUCILLIN “B” - Salbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist EUCILLIN “B” - Salbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist EUCILLIN “B” - Salbe und wofür wird sie angewendet?

Eucillin „B“ – Salbe ist eine Wund- und Heilsalbe mit 2 Wirkstoffen, die Erreger abtöten, sowie einem Wirkstoff, der Juckreiz mildert.

Eucillin „B“ – Salbe wird angewendet bei oberflächlichen Entzündungen und Infektionen der Haut, wie Furunkel, Karbunkel, Entzündungen der Haarfollikel (Follikulitis), Impetigo contagiosa (eine klein- oder großblasige bakterielle Hautinfektion verursacht durch Staphylokokken oder Streptokokken) infizierte Ekzeme, Hautwolf (Intertrigo).

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von EUCILLIN “B” - Salbe beachten?

EUCILLIN “B” - Salbe darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Bacitracin, Dequaliniumchlorid, Diphenylpyralinhydrochlorid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Neugeborenen, da die Wirkstoffe vermehrt über die Haut aufgenommen werden können.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Eucillin „B“ – Salbe anwenden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Eucillin “B” - Salbe ist erforderlich,

- falls Nebenwirkungen (Hautreizungen) auftreten. In diesem Fall ist die Behandlung zu unterbrechen und ärztlicher Rat einzuholen.
- bei blasigen und nässenden Hauterkrankungen.

Anwendung von EUCILLIN „B“ – Salbe zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Gleichzeitige Anwendung mancher Salben oder Cremes kann die Wirkung von Eucillin „B“ - Salbe vermindern. Hierzu gehören Salben oder Cremes, die Salze höherer Fettsäuren (z.B. Olein- oder Palmitinsäure) oder Lezithin enthalten.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wenn Ihr Arzt Ihnen Eucillin „B“ - Salbe verordnet hat, kann diese während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

3. Wie ist EUCILLIN „B“ - Salbe anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis bei Erwachsenen, Jugendlichen, Kindern und Kleinkindern (ab 1 Monat): zwei- bis fünfmal täglich Eucillin „B“ - Salbe dünn auf die erkrankten Hautstellen auftragen und leicht verteilen.

Eucillin „B“ - Salbe darf nicht bei Neugeborenen angewendet werden, da die Wirkstoffe vermehrt über die Haut aufgenommen werden können (siehe Abschnitt „EUCILLIN „B“ – Salbe darf nicht angewendet werden“).

Eucillin „B“ - Salbe soll bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion niedriger dosiert werden.

Art der Anwendung:

Zur Anwendung auf der Haut.

Die Salbe wird auf die erkrankten Hautstellen dünn aufgetragen; falls notwendig, kann darüber ein Verband angelegt werden. Die Salbe kann auch direkt auf den Verband aufgetragen und dieser dann auf die Wundfläche aufgelegt werden.

Dauer der Anwendung:

Eucillin „B“ – Salbe soll so lange angewendet werden wie vom Arzt verordnet.

Wenn Sie eine größere Menge von EUCILLIN “B” - Salbe angewendet haben, als Sie sollten

Da Eucillin „B“ - Salbe kaum durch die Haut aufgenommen wird, sind bei Anwendung größerer Salbenmengen keine Nebenwirkungen zu erwarten. Falls Sie eine grössere Menge Eucillin „B“ – Salbe unter einem Plastikverband aufgetragen haben, können Heutreizungen auftreten.

Wenn Sie die Anwendung von EUCILLIN “B” - Salbe vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Setzen Sie Ihre Behandlung wie gewohnt fort.

Wenn Sie die Anwendung von EUCILLIN “B” - Salbe abbrechen

Bei Abbruch der Anwendung ist ein Behandlungserfolg nicht mehr gewährleistet.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 Behandelte von 1000): Hautgeschwüre und lokales Absterben von Hautgewebe

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar): allergische Reaktionen

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN, ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist EUCILLIN “B” - Salbe aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton/der Tube nach „Verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach dem ersten Öffnen der Tube 3 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was EUCILLIN "B" - Salbe enthält

Die Wirkstoffe pro 1g Salbe sind:

Bacitracin	500 I.E.
Dequaliniumchlorid	4 mg
Diphenylpyralinhydrochlorid	1 mg

Die sonstigen Bestandteile sind: weißes Vaseline und dickflüssiges Paraffin.

Wie EUCILLIN "B" - Salbe aussieht und Inhalt der Packung

Weißer, opaleszierende Salbe in einer Tube.

Inhalt: 15 g.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber

SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH
Leystraße 129
1200 Wien

Hersteller

MoNo chem-pharm Produkte GmbH
Leystraße 129
1200 Wien

Z.Nr.: 7762

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2021.