

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Everio Airmaster 50 Mikrogramm/100 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation **Everio Airmaster 50 Mikrogramm/250 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation** Salmeterol/Fluticasonpropionat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Everio Airmaster und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Everio Airmaster beachten?
3. Wie ist Everio Airmaster anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Everio Airmaster aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Everio Airmaster und wofür wird es angewendet?

Everio Airmaster enthält zwei Arzneimittel, Salmeterol und Fluticasonpropionat:

- Salmeterol ist ein langwirksames bronchienerweiterndes Mittel (Bronchodilatator). Bronchienerweiternde Mittel sorgen dafür, dass die Atemwege in den Lungen frei bleiben. Dadurch kann die Luft leichter ein- und ausgeatmet werden. Die Wirkung hält mindestens 12 Stunden an.
- Fluticasonpropionat ist ein Kortikosteroid, das Schwellungen und Reizungen in der Lunge verringert.

Der Arzt hat Ihnen dieses Arzneimittel zur Vorbeugung von Atemproblemen verschrieben, wie z. B.:

- Asthma

Sie müssen Everio Airmaster täglich wie von Ihrem Arzt verordnet anwenden. Das wird sicherstellen, dass es richtig wirkt, um Ihr Asthma zu kontrollieren.

Everio Airmaster hilft Atemnot und Keuchen zu vermeiden. Everio Airmaster sollte allerdings nicht angewendet werden, um einen Anfall von Atemnot oder Keuchen zu mildern. Wenn es bei Ihnen zu einem plötzlichen Anfall von Atemnot oder Keuchen kommt, müssen Sie einen schnellwirksamen „Befreier“- („Notfall“-) Inhalator verwenden, wie z. B. Salbutamol. Sie sollten Ihren schnellwirksamen „Notfall“-Inhalator immer dabei haben.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Everio Airmaster beachten?

Everio Airmaster darf nicht angewendet werden

Wenn Sie allergisch gegen Salmeterol, Fluticasonpropionat oder den anderen Inhaltsstoff Lactose-Monohydrat sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Everio Airmaster anwenden, wenn folgendes auf Sie zutrifft:

- Herzerkrankungen, einschließlich unregelmäßigem oder schnellem Herzschlag
- Schilddrüsenüberfunktion
- hoher Blutdruck
- Diabetes mellitus (Everio Airmaster kann zu einer Erhöhung des Blutzuckers führen)
- niedrige Kaliummenge in Ihrem Blut
- bestehende oder frühere Tuberkulose (TB) oder andere Infektionen der Lunge

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn bei Ihnen verschwommenes Sehen oder andere Sehstörungen auftreten.

Kinder

Dieses Arzneimittel ist nicht bei Kindern unter 12 Jahren anzuwenden.

Doping

Die Anwendung des Arzneimittels Everio Airmaster kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen.

Anwendung von Everio Airmaster zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden oder kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden. Das ist wichtig, weil es sein kann, dass Everio Airmaster nicht zum gleichzeitigen Einnehmen mit einigen anderen Arzneimitteln geeignet ist.

Informieren Sie Ihren Arzt vor Beginn der Anwendung von Everio Airmaster, falls Sie folgende Arzneimittel einnehmen.

- Beta-Blocker (z. B. Atenolol, Propranolol und Sotalol). Beta-Blocker werden zumeist bei Bluthochdruck oder Herzerkrankungen wie Angina pectoris verwendet.
- Arzneimittel, um Infektionen zu behandeln (wie Ketoconazol, Itraconazol und Erythromycin), einschließlich mancher Arzneimittel zur HIV-Behandlung (wie Ritonavir, Cobicistat-haltige Produkte). Einige dieser Arzneimittel können die Menge von Fluticasonpropionat oder Salmeterol in Ihrem Körper erhöhen. Dies kann Ihr Risiko von Nebenwirkungen, einschließlich unregelmäßigem Herzschlag, durch Everio Airmaster erhöhen oder diese verschlimmern. Ihr Arzt wird Sie möglicherweise sorgfältig beobachten, wenn Sie diese Arzneimittel einnehmen.
- Kortikosteroide (zum Einnehmen oder durch Injektion). Wurden Ihnen diese Mittel vor kurzem verabreicht, kann dies das Risiko einer Beeinträchtigung Ihrer Nebenniere durch Everio Airmaster erhöhen.
- Diuretika, auch bekannt als „Wassertabletten“, die zur Behandlung von Bluthochdruck angewendet werden.
- Andere Bronchodilatoren (wie etwa Salbutamol).
- Arzneimittelklasse Xanthine, wie etwa Aminophyllin und Theophyllin. Diese werden oft zur Behandlung von Asthma eingesetzt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es ist unwahrscheinlich, dass Everio Airmaster Ihre Fähigkeit zum Fahren und Bedienen von Maschinen beeinträchtigt.

Everio Airmaster enthält Lactose

Everio Airmaster enthält 13 Milligramm Lactose in jeder abgegebenen Dosis. Bitte wenden Sie dieses

Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist Everio Airmaster anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

- Verwenden Sie Everio Airmaster jeden Tag, bis Ihr Arzt die Absetzung anordnet. Wenden Sie nicht mehr als die empfohlene Dosis an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.
- Hören Sie nicht auf Everio Airmaster anzuwenden oder verringern Sie nicht die Dosis von Everio Airmaster, ohne vorher mit Ihrem Arzt zu sprechen.
- Everio Airmaster muss durch den Mund in die Lunge eingeatmet werden.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren und älter

- Everio Airmaster 50/100 – Eine Inhalation zweimal täglich
- Everio Airmaster 50/250 – Eine Inhalation zweimal täglich

Ihre Beschwerden könnten mit der zweimal täglichen Anwendung von Everio Airmaster erfolgreich unter Kontrolle sein. In diesem Fall kann Ihr Arzt entscheiden, die Dosis auf einmal täglich zu verringern. Die Dosis kann umgestellt werden auf:

- einmal abends – wenn Ihre Beschwerden **in der Nacht** auftreten
- einmal morgens - wenn Ihre Beschwerden **am Tag** auftreten.

Es ist sehr wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Arztes bezüglich der Anzahl der Inhalationen und der Häufigkeit der Anwendung befolgen.

Wenn Sie Everio Airmaster gegen Asthma verwenden, wird Ihr Arzt Ihre Beschwerden regelmäßig kontrollieren wollen.

Informieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn sich Ihr Asthma oder Ihre Atmung verschlechtert.

Möglicherweise werden Sie stärkeres Keuchen oder häufigeres Spannungsgefühl in der Brust verspüren oder öfter Ihr schnellwirksames „Befreier“-Arzneimittel anwenden müssen. In jedem dieser Fälle ist die Anwendung von Everio Airmaster fortzusetzen, erhöhen Sie jedoch nicht die Anzahl der Inhalationen. Die Brustbeschwerden könnten sich verschlimmern, und Sie könnten ernsthaft erkranken. Suchen Sie Ihren Arzt auf, da Sie möglicherweise eine Zusatzbehandlung benötigen.

Anwendungshinweise

- **Everio Airmaster kann sich von den Inhalatoren unterscheiden, die Sie bisher verwendet haben, daher ist es sehr wichtig, dass Sie ihn richtig anwenden. Ihr Arzt, das medizinische Fachpersonal oder Ihr Apotheker müssen Sie in der Anwendung Ihres Inhalators schulen. Diese Schulung ist wichtig, um sicherzustellen, dass Sie Ihre benötigte Dosis erhalten. Wenn Sie diese Schulung nicht erhalten haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt, das medizinische Fachpersonal oder Ihren Apotheker, damit sie Ihnen zeigen wie Sie Ihren Inhalator richtig benutzen, insbesondere vor der ersten Anwendung.**
Ihr Arzt, das medizinische Fachpersonal oder Ihr Apotheker soll auch von Zeit zu Zeit prüfen, wie Sie das Gerät verwenden, um sicherzustellen, dass Sie es richtig und wie verschrieben anwenden. Den Everio Airmaster nicht richtig, oder wie verschrieben, anzuwenden, kann bedeuten, dass Ihr Asthma nicht so gebessert wird wie es sollte.
- Im Gerät befindet sich eine Blisterpackung, die Salmeterol/Fluticasonpropionat in Pulverform enthält.
- Oben auf dem Gerät befindet sich ein Zählwerk, das Ihnen zeigt wie viele Dosen noch verbleiben. Es zählt auf 0 zurück. Die Zahlen 5 bis 0 erscheinen in roter Farbe, um Sie zu warnen, wenn nur noch wenige Dosen vorhanden sind. Sobald das Zählwerk 0 anzeigt, ist Ihr Inhalator leer.

Anwendung Ihres Inhalators

1. Um Ihren Inhalator zu öffnen, halten Sie ihn waagrecht in einer Hand. Drücken Sie mit dem Daumen den roten Knopf (*siehe Abbildung 1*) und schieben Sie mit dem Daumen der anderen Hand die hellviolette (50/100 Mikrogramm) oder violette (50/250 Mikrogramm) Abdeckung des Mundstücks so weit wie möglich, bis Sie ein Klicken hören (*siehe Abbildung 2*). Damit wird ein kleines Loch im Mundstück geöffnet und eine Dosis Ihres Arzneimittels in das Mundstück befördert.




Abbildung 1




Abbildung 2

Beachten Sie, dass jedes Mal, wenn das Öffnen der Abdeckung des Mundstücks mit einem Klicken endet, im Inneren eine Blisterpackung geöffnet und das Pulver zum Inhalieren vorbereitet wird. Öffnen Sie daher nicht die Abdeckung des Mundstücks, wenn Sie Ihr Arzneimittel nicht anwenden müssen, da dies die Blister öffnet und Arzneimittel verschwendet.

2. Halten Sie den Inhalator vom Mund weg und atmen Sie so tief wie möglich aus. Atmen Sie nicht in Ihren Inhalator hinein.
3. Setzen Sie das Mundstück an die Lippen (*siehe Abbildung 3*). Atmen Sie gleichmäßig und tief durch den Inhalator ein, **nicht durch Ihre Nase**. Nehmen Sie den Inhalator vom Mund weg. Halten Sie den Atem etwa 10 Sekunden an, oder so lange es sich angenehm anfühlt. Atmen Sie langsam aus.




Abbildung 3

Der Inhalator gibt Ihre Dosis des Arzneimittels als ein sehr feines Pulver ab. Es kann sein, dass Sie dieses Pulver schmecken oder spüren. **Wenden Sie keine zusätzliche Dosis aus Ihrem Inhalator an, wenn Sie das Arzneimittel nicht spüren oder schmecken.**

4. Schließen Sie den Inhalator, um ihn sauber zu halten, indem Sie die hellviolette (50/100

Mikrogramm) oder violette (50/250 Mikrogramm) Abdeckung des Mundstücks wieder so weit wie es geht zu sich zurückdrehen. Sie werden ein „Klicken“ hören (*siehe Abbildung 4*). Die Abdeckung des Mundstücks ist nun zurück in der Ausgangsposition und in Ruhestellung. Der Inhalator ist jetzt wieder bereit zur Anwendung Ihrer nächsten geplanten Dosis.

5. Spülen Sie nach der Anwendung den Mund mit Wasser und spucken Sie es aus und/oder putzen Sie Ihre Zähne. Das kann helfen eine Pilzinfektion (Soor) und Heiserkeit zu vermeiden.




Abbildung 4

Reinigung Ihres Inhalators

Halten Sie Ihren Inhalator trocken und sauber.

Falls nötig, können Sie das Mundstück Ihres Inhalators mit einem trockenen Tuch oder Taschentuch abwischen.

Wenn Sie eine größere Menge von Everio Airmaster angewendet haben, als Sie sollten

Es ist wichtig, dass Sie den Inhalator wie verordnet anwenden. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie unabsichtlich mehr Dosen angewendet haben als empfohlen. Es kann Ihnen auffallen, dass Ihr Herz schneller als üblich schlägt und, dass Sie sich zittrig fühlen. Sie können auch unter Schwindelgefühl, Kopfschmerz, Muskelschwäche und Gelenkschmerzen leiden.

Wenn Sie über einen längeren Zeitraum größere Dosen Everio Airmaster angewendet haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Das ist notwendig, da die Anwendung größerer Dosen Everio Airmaster dazu führen kann, dass Ihre Nebennieren weniger Steroidhormone produzieren.

Wenn Sie die Anwendung von Everio Airmaster vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Wenden Sie einfach Ihre nächste Dosis zur gewohnten Zeit an.

Wenn Sie die Anwendung von Everio Airmaster abbrechen

Die vorgeschriebene tägliche Anwendung von Everio Airmaster ist sehr wichtig. **Wenden Sie es so lange an, bis Ihr Arzt Ihnen sagt aufzuhören. Hören Sie nicht mit der Anwendung auf oder reduzieren Sie nicht plötzlich Ihre Dosis Everio Airmaster.** Dies könnte zu einer Verschlechterung Ihrer Atmung führen.

Außerdem kann das plötzliche Abbrechen der Anwendung oder die Dosisreduktion von Everio Airmaster Probleme mit Ihren Nebennieren (Nebennierenschwäche) verursachen (sehr selten), was manchmal zu Nebenwirkungen führt.

Diese Nebenwirkungen können irgendwelche der folgenden beinhalten:

- Magenschmerzen
- Müdigkeit und Appetitlosigkeit, Unwohlsein
- Übelkeit und Durchfall
- Gewichtsverlust

- Kopfschmerz oder Schläfrigkeit
- Verringerte Menge Zucker in Ihrem Blut
- Niedriger Blutdruck und Krampfanfälle

Wenn Ihr Körper unter Stress steht, wie etwa wegen Fieber, Trauma (wie ein Unfall oder eine Verletzung), Infektion oder Operation, kann sich eine Nebennierenschwäche verschlimmern und Sie können eine der oben gelisteten Nebenwirkungen bekommen.

Wenn Sie irgendwelche Nebenwirkungen bemerken, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Um diese Nebenwirkungen zu vermeiden, wird Ihnen Ihr Arzt möglicherweise zusätzliche Kortikosteroide in Tablettenform (wie Prednisolon) verschreiben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Zur Verringerung des Risikos von Nebenwirkungen wird Ihnen Ihr Arzt die niedrigste Dosis dieser Arzneimittel-Kombination für die Kontrolle Ihres Asthmas verschreiben.

Allergische Reaktionen: Unter Umständen kann sich unmittelbar nach Anwendung von Everio Airmaster plötzlich Ihre Atmung verschlechtern. Starkes Keuchen und Husten sowie Atemnot können auftreten. Ebenso kann es zu Juckreiz, Ausschlag (Nesselausschlag) und Schwellungen kommen (normalerweise im Bereich des Gesichts, der Lippen, der Zunge oder des Rachens), oder Sie können plötzlich spüren, dass Ihr Herz sehr schnell schlägt oder Sie fühlen sich schwach und schwindelig (was zu einem Zusammenbruch oder Bewusstlosigkeit führen kann). **Wenn irgendwelche dieser Beschwerden bei Ihnen auftreten oder plötzlich nach der Anwendung von Everio Airmaster auftreten, brechen Sie die Anwendung von Everio Airmaster ab und sprechen Sie sofort mit einem Arzt.** Allergische Reaktionen auf Everio Airmaster treten gelegentlich auf (sie können bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen).

Sehr häufig (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen)

- Kopfschmerz – bessert sich im Laufe der Behandlung üblicherweise.

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)

- Soor (schmerzhafte, creme-gelbe abgehobene Flecken) in Mund und Rachen. Ebenso wunde Zunge und heisere Stimme und Reizung des Rachens. Es kann helfen, wenn Sie nach jeder Einzeldosis den Mund mit Wasser spülen und es sofort ausspucken und/oder Ihre Zähne putzen. Ihr Arzt kann Ihnen zur Behandlung des Soors ein Arzneimittel gegen Pilzbefall verschreiben.
- Schmerzende, geschwollene Gelenke und Muskelschmerzen.
- Muskelkrämpfe.

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)

- Anstieg der Zuckermenge (Glucose) in Ihrem Blut (Hyperglykämie). Wenn Sie an Diabetes leiden, sind möglicherweise häufigere Blutzuckeruntersuchungen und eventuell Anpassungen Ihrer üblichen Diabetesbehandlung erforderlich.
- Katarakt (Trübung der Augenlinse).
- Herzrasen (sehr schneller Herzschlag, Tachykardie).
- zittriges Gefühl (Tremor) und schneller oder unregelmäßiger Herzschlag (Palpitationen) – dies ist normalerweise harmlos und lässt im Verlauf der Behandlung nach.
- Brustschmerzen.
- Ängstlichkeit (diese Nebenwirkung tritt jedoch in erster Linie bei Kindern auf).

- Schlafstörungen.
- Allergischer Hautausschlag.

Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen)

- **Schwierigkeiten mit der Atmung oder Keuchen, welche sich unmittelbar nach der Anwendung von Everio Airmaster verschlechtern.** Wenn das passiert, **hören Sie auf Ihren Everio Airmaster Inhalator anzuwenden.** Verwenden Sie Ihren schnellwirksamen „Notfall“-Inhalator, um Ihnen das Atmen zu erleichtern und **sprechen Sie sofort mit einem Arzt.**
- Everio Airmaster kann die normale Produktion von Steroidhormonen im Körper beeinträchtigen, vor Allem wenn Sie über lange Zeiträume große Mengen angewendet haben. Es können die folgenden Nebenwirkungen auftreten:
 - Wachstumsverzögerung bei Kindern und Jugendlichen,
 - Verringerung der Knochendichte,
 - Grüner Star (Glaukom),
 - Gewichtszunahme,
 - Mondgesicht (Cushing-Syndrom).
 Ihr Arzt wird Sie regelmäßig auf diese Nebenwirkungen untersuchen und sicherstellen, dass Sie die niedrigste Dosis dieser Arzneimittel-Kombination zur Kontrolle Ihres Asthmas anwenden.
- Verhaltensänderungen, z. B. Überaktivität und Reizbarkeit (diese Nebenwirkungen treten jedoch in erster Linie bei Kindern auf).
- Ungleichmäßiger oder unregelmäßiger Herzschlag bzw. zusätzliche Herzschläge (Herzrhythmusstörungen, Arrhythmie). Informieren Sie Ihren Arzt, setzen Sie Everio Airmaster aber nur ab, wenn der Arzt es anordnet.
- Eine Pilzinfektion in der Speiseröhre, die zu Schwierigkeiten beim Schlucken führen könnte.

Häufigkeit nicht bekannt, kann aber dennoch auftreten

- Depression oder Aggression (diese Nebenwirkungen treten jedoch in erster Linie bei Kindern auf).
- Verschwommenes Sehen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
 Traisengasse 5
 1200 WIEN
 ÖSTERREICH
 Fax: + 43 (0) 50 555 36207
 Website: <http://www.basg.gv.at/>

melden.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Everio Airmaster aufzubewahren?

- **Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.**
- Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett Ihres Inhalators nach „Verwendbar bis“ bzw. „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

- Nicht über 30 °C lagern.
- Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Everio Airmaster enthält

Die Wirkstoffe sind: Salmeterol und Fluticasonpropionat.

Everio Airmaster 50 Mikrogramm/100 Mikrogramm

Jede einzelne Inhalation liefert eine abgegebene Dosis (die Dosis, die das Mundstück verlässt) von 47 Mikrogramm Salmeterol (als Salmeterolxinafoat) und 92 Mikrogramm Fluticasonpropionat. Dies entspricht einer Einzeldosis von 50 Mikrogramm Salmeterol (als Salmeterolxinafoat) und 100 Mikrogramm Fluticasonpropionat.

Everio Airmaster 50 Mikrogramm/250 Mikrogramm

Jede einzelne Inhalation liefert eine abgegebene Dosis (die Dosis, die das Mundstück verlässt) von 45 Mikrogramm Salmeterol (als Salmeterolxinafoat) und 229 Mikrogramm Fluticasonpropionat. Dies entspricht einer Einzeldosis von 50 Mikrogramm Salmeterol (als Salmeterolxinafoat) und 250 Mikrogramm Fluticasonpropionat.

Der sonstige Bestandteil ist: Lactose-Monohydrat (siehe Abschnitt 2 unter „Everio Airmaster enthält Lactose“) (enthält Milchproteine).

Wie Everio Airmaster aussieht und Inhalt der Packung

- Der Everio Airmaster-Inhalator enthält einen Folienstreifen mit Blistern, die mit einem weißen bis beigefarbenen Pulver gefüllt sind. Die Folie schützt das Inhalationspulver vor Umwelteinwirkungen.
- Jede Dosis ist einzeln abgepackt.
- Die Geräte aus weißem Plastik mit der hellvioletten (50/100 Mikrogramm) oder violetten (50/250 Mikrogramm) Abdeckung des Mundstücks sind in Kartons verpackt mit: 1, 2, 3 oder 10 × Inhalator(en) mit jeweils 60 Inhalationen.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Zentiva k.s.
U Kabelovny 130
102 37 Prag 10
Tschechische Republik

Hersteller

Oy Medfiles Ltd.
Volltikatu 5, Volltikatu 8
Kuopio, 70700
Finland

Everio Airmaster 50 Mikrogramm/100 Mikrogramm Z.Nr.: 139428

Everio Airmaster 50 Mikrogramm/250 Mikrogramm Z.Nr.: 139429

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und im Vereinigten Königreich (Nordirland) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Schweden	Neuair Airmaster
Österreich	Everio Airmaster
Belgien	Brecur Airmaster 50 microgram/100 microgram/ dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld
	Brecur Airmaster 50 microgram/250 microgram/ dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld
	Brecur Airmaster 50 microgrammes/100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose
	Brecur Airmaster 50 microgrammes/250 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose
	Brecur Airmaster 50 Mikrogramm/100 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation
	Brecur Airmaster 50 Mikrogramm/250 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation
Bulgarien	Еверио Еърмастър 50 микрограма/100 микрограма/доза прах за инхалация, предварително дозиран
	Еверио Еърмастър 50 микрограма/250 микрограма/доза прах за инхалация, предварително дозира
Tschechische Republik	Everio Airmaster
Estland	Everio Airmaster
Frankreich	PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL ZENTIVA 100 microgrammes/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose
	PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL ZENTIVA 250 microgrammes/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose
Ungarn	Fluzalto Airmaster 50 mikrogramm/100 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por
	Fluzalto Airmaster 50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por
Irland	Bronx Airmaster
Lettland	Everio Airmaster 50/100 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, dozēts
	Everio Airmaster 50/250 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, dozēts
Litauen	Everio Airmaster 50/100 mikrogramų/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai
	Everio Airmaster 50/250 mikrogramų/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai
Polen	Neuair Airmaster
Rumänien	Everio Airmaster 50 micrograme /100 micrograme pulbere de inhalat unidoza
	Everio Airmaster 50 micrograme /250 micrograme pulbere de inhalat unidoza
Slowakei	Everio Airmaster 50 mikrogramov/100 mikrogramov
	Everio Airmaster 50 mikrogramov/250 mikrogramov
Spanien	Salmeterol/Fluticasona Zentiva 50 microgramos/100 microgramos/ inhalación, polvo para inhalación (unidosis)
	Salmeterol/Fluticasona Zentiva 50 microgramos/250 microgramos/ inhalación, polvo para inhalación (unidosis)

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2021.