

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Fucidin - Salbe

Wirkstoff: Natriumfusidat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Fucidin - Salbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Fucidin - Salbe beachten?
3. Wie ist Fucidin - Salbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Fucidin - Salbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Fucidin - Salbe und wofür wird sie angewendet?

Dieses Arzneimittel ist eine antibiotikahaltige Salbe zur lokalen Behandlung von

- Entzündungen und eitrigen Erkrankungen der Haut, die durch Bakterien ausgelöst werden, wie z.B. Abszesse, Furunkel, Karbunkel und Nagelbettenerungen
- von Bakterien befallenen, nässenden, juckenden Hautausschlägen (Ekzeme), Wunden und Verbrennungen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Fucidin – Salbe beachten?

Fucidin - Salbe darf nicht angewendet werden,

wenn Sie allergisch gegen Natriumfusidat oder einen der sonstigen Bestandteile von Fucidin - Salbe sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Fucidin Salbe anwenden.

Vorsicht bei der Anwendung in der Nähe der Augen, da die Salbe im Auge eine Reizung verursachen kann.

Bei Anwendung von Fucidin - Salbe mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Bitte informieren Sie dennoch Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Über die Anwendung von Fucidin während der Schwangerschaft und Stillzeit entscheidet Ihr Arzt

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Fucidin - Salbe hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Fucidin - Salbe

Fucidin - Salbe enthält Cetylalkohol und Lanolin, die lokale Hautreaktionen hervorrufen können (z.B. Kontaktdermatitis).

Fucidin - Salbe enthält Butylhydroxytoluol (E321), das lokale Hautreaktionen (z.B. Kontaktdermatitis) oder Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen kann.

3. Wie ist Fucidin - Salbe anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, tragen Sie Fucidin - Salbe 2-3 täglich auf die erkrankten Hautstellen auf. Ein Deckverband ist – besonders bei kleineren Stellen – nicht unbedingt erforderlich.

Wird jedoch ein Deckverband verwendet, so ist darauf zu achten, dass dieser mit der erkrankten Hautstelle nicht verklebt.

Besonders wichtig ist, dass Fucidin - Salbe auch nach dem Abheilen der Erkrankung mindestens 2-3 Tage angewendet wird, damit tatsächlich alle schädlichen Bakterien abgetötet sind. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Beschwerden erneut auftreten.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Fucidin - Salbe zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Fucidin - Salbe angewendet haben, als Sie sollten

Setzen Sie die Behandlung wie vorgeschrieben fort.

Wenn Sie die Anwendung von Fucidin - Salbe vergessen haben

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben, sondern setzen Sie die Behandlung wie vorgeschrieben fort.

Wenn Sie die Anwendung von Fucidin - Salbe abbrechen

Bedenken Sie, wenn Sie die Anwendung vorzeitig abbrechen, dass die Wirkung möglicherweise nicht gegeben ist und die Beschwerden erneut auftreten können.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden üblicherweise folgende Häufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	mehr als 1 Behandler von 100
Gelegentlich:	mehr als 1 Behandler von 1000
Selten:	mehr als 1 Behandler von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Gelegentlich wurde von verschiedenen Hautreaktionen und vor allem Beschwerden am Verabreichungsort, wie z.B. entzündliche Hautreaktionen bei Hautkontakt, Hautjucken, Hautreizungen, vorübergehendes Brennen oder Stechen der Haut, Hautrötungen und Hautausschlag berichtet.

Selten wurden eine Reizung der Bindehaut, Nesselausschlag, Ödeme im Augenhöhlenbereich und Schwellungen der Lippen sowie allergische Reaktionen beobachtet.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

5. Wie ist Fucidin - Salbe aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Haltbarkeit nach dem Öffnen: 90 Tage.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. Weitere Angaben

Was Fucidin - Salbe enthält:

- Der Wirkstoff ist: Natriumfusidat (Acidum fusidicum-Natrium)
1 g Salbe enthält 20 mg Natriumfusidat
- Die sonstigen Bestandteile sind:
Cetylalkohol, Lanolin, flüssiges Paraffin, weißes weiches Paraffin, all-rac- α -Tocopherol und Butylhydroxytoluol (E321).

Wie Fucidin - Salbe aussieht und Inhalt der Packung

Fucidin - Salbe ist eine cremfarbig bis gelb-weiße, durchscheinende, dickflüssige Salbe ohne merklichen Geruch und in Packungen zu 5g, 15g und 30g erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Zulassungsinhaber: LEO Pharma, Wien.

Hersteller:

LEO Laboratories Ltd, Dublin, Irland

oder

LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.
Via E. Schering 21
20054 Segrate (Mailand)
Italien.

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung.

Zulassungsnummer: 13.999

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2021.