

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

### **GACELA Schlankheits-Tabletten**

Wirkstoff:

Calotropis gigantea (Madar) Trit. D4

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was sind GACELA Schlankheits-Tabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von GACELA Schlankheits-Tabletten beachten?
3. Wie sind GACELA Schlankheits-Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind GACELA Schlankheits-Tabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

#### **1. Was sind GACELA Schlankheits-Tabletten und wofür werden sie angewendet?**

GACELA Schlankheits-Tabletten sind ein homöopathisches Arzneimittel und werden zur Gewichtsreduktion eingesetzt.

Die Anwendungsgebiete von GACELA Schlankheits-Tabletten leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Gewichtsreduktion bei Fettleibigkeit

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn das Körpergewicht trotz Behandlung über mehr als 1 Monat nicht abnimmt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von GACELA Schlankheits-Tabletten beachten?**

GACELA Schlankheits-Tabletten dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen *Calotropis gigantea* (Madar) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie GACELA Schlankheits-Tabletten einnehmen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Das Arzneimittel ist dann abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittelprüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

### **Einnahme von GACELA Schlankheits-Tabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind keine bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

### **Einnahme von GACELA Schlankheits-Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel wie z. B. Kaffee, Zigaretten, Alkohol ungünstig beeinflusst werden kann.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.

Die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

GACELA Schlankheits-Tabletten haben keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **GACELA Schlankheits-Tabletten enthalten Lactose**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose (Milchzucker). Bitte nehmen Sie GACELA Schlankheits-Tabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

### **3. Wie sind GACELA Schlankheits-Tabletten einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

**Erwachsene:** 2-3mal täglich 2 Tabletten

Bei Beginn von Schlankheitskuren wird stündlich 1 Tablette eingenommen.

#### Art der Anwendung

##### Zum Einnehmen.

GACELA Schlankheits-Tabletten sollte man zur Verbesserung der Wirksamkeit im Mund zergehen lassen. Die Einnahme sollte vor den Mahlzeiten erfolgen.

#### Dauer der Anwendung

GACELA Schlankheits-Tabletten sollten am besten in Verbindung mit einer ausgewogenen und kalorienreduzierten Ernährung eingenommen werden. Bei der empfohlenen Dosierung zeigt auch eine Dauereinnahme über einen längeren Zeitraum keine negativen Wirkungen.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von GACELA Schlankheits-Tabletten eingenommen haben, als Sie sollten**

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit einer Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

#### **Wenn Sie die Einnahme von GACELA Schlankheits-Tabletten vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

#### **Wenn Sie die Einnahme von GACELA Schlankheits-Tabletten abbrechen,**

obwohl Ihre Beschwerden noch weiter bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel können auch GACELA Schlankheits-Tabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Zu GACELA Schlankheits-Tabletten sind bisher keine Nebenwirkungen bekannt.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Trasengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie sind GACELA Schlankheits-Tabletten aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Tablettenblister und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum (Verw. bis:) nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

Was GACELA Schlankheits-Tabletten enthalten:

- Der Wirkstoff ist: 1 Tablette enthält:

Calotropis gigantea (Madar) Trit. D4                      64 mg

- Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Maisstärke, vorverkleisterte Stärke

#### **Wie GACELA Schlankheits-Tabletten aussehen und Inhalt der Packung**

Weiß, runde Tabletten à 25 Stück in einem Blister.

6 Blister in einer Faltschachtel.

Inhalt: 150 Tabletten

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutischer Unternehmer

Marien-Apotheke

Inh. Dr. Clemens Reuther e.K.

Marktplatz 10

83209 Prien, Deutschland

#### Hersteller

Mauermann-Arzneimittel KG, Heinrich-Knote-Str. 2, 82343 Pöcking, Deutschland

#### Vertrieb

HWS OTC – Service GmbH, Steindorf 65, 5570 Mauterndorf, Österreich

**Z. Nr. 3-00219**

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2020.**