

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

GRAZER EST-GEL

Wirkstoffe: Kamillentinktur, Essigsäure Tonerde, Diphenhydramin

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Grazer Est-Gel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Grazer Est-Gel beachten?
3. Wie ist Grazer Est-Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Grazer Est-Gel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST GRAZER EST-GEL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Grazer Est-Gel ist ein Gel zum Auftragen auf die Haut. Die im Grazer Est-Gel enthaltene Essigsäure Tonerde und die Kamillentinktur haben eine entzündungshemmende und abschwellende Wirkung. Diphenhydramin wirkt juckreizstillend und antiallergisch.

Anwendungsgebiete:

Grazer Est-Gel ist ein kühlendes Gel zur Anwendung bei Insektenstichen, Juckreiz verschiedener Ursache, leichten Verbrennungen, Sonnenbrand und sonnengeröteter Haut.

Grazer Est-Gel wird angewendet bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON GRAZER EST-GEL BEACHTEN?

Grazer Est-Gel darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Kamillentinktur, Essigsäure Tonerde, Diphenhydramin oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei großflächigen Hautschäden, wie schweren Verbrennungen, großflächigen akuten Entzündungen, nässenden oder eitrigen Hauterkrankungen.
- bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 6 Jahren.
- in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Das Gel darf nicht in die Augen oder auf Schleimhäute gelangen.

Nach der Anwendung sind die Hände gründlich zu reinigen.

Die behandelten Körperstellen sollten vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt werden.

Falls keine Besserung eintritt, Nebenwirkungen auftreten oder sich Ihre Symptome verschlimmern, dann müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Kinder und Jugendliche

Grazer Est-Gel ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 6 Jahren bestimmt.

Anwendung von Grazer Est-Gel zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen oder angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen oder anzuwenden.

Es wurden bisher keine Wechselwirkungen bekannt.

Bei großflächiger Anwendung können jedoch Wechselwirkungen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. So könnten dämpfend wirkende Arzneimittel, wie Schlafmittel, aber auch bestimmte Schmerzmittel, blutdrucksenkende Mittel oder Alkohol in ihrer Wirkung verstärkt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Grazer Est-Gel darf aus Sicherheitsgründen in der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht angewendet werden. Der Wirkstoff Diphenhydramin geht in die Muttermilch über.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Achtung: Bei großflächiger Anwendung kann es durch Aufnahme des Wirkstoffes Diphenhydramin zur Beeinträchtigung der Reaktionsfähigkeit kommen.

Grazer Est-Gel enthält Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218) und Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

3. WIE IST GRAZER EST-GEL ANZUWENDEN?

Wenden Sie Grazer Est-Gel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zur äußerlichen Anwendung

Die empfohlene Dosis beträgt:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird eine kirsch- bis walnussgroße Menge des Gels mehrmals täglich auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren tragen das Gel bis maximal 6x täglich, Kinder zwischen 6 und 12 Jahren bis maximal 4x täglich auf.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen:

Das Gel ist nicht zur Anwendung an Säuglingen und Kindern unter 6 Jahren bestimmt.

Dauer der Anwendung:

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie eine größere Menge von Grazer Est-Gel angewendet haben, als sie sollten, kann es vermehrt zum Auftreten von Nebenwirkungen kommen. Sollte Grazer Est-Gel versehentlich verschluckt worden sein, wenden Sie sich bitte unverzüglich an einen Arzt.

Wenn Sie die Anwendung von Grazer Est-Gel vergessen haben, wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorhergehende Anwendung vergessen haben, sondern fahren Sie mit der üblichen Dosierung fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Vereinzelte allergische Hautreaktionen oder Lichtempfindlichkeit der Haut, Rötung, Juckreiz, Bläschenbildung oder Schwellungen beobachtet werden.

Bei großflächiger Anwendung von Grazer Est-Gel, insbesondere auf stärker entzündeten Stellen, kann es infolge der Aufnahme größerer Mengen von Diphenhydramin durch die Haut zum Auftreten von Nebenwirkungen kommen. In seltenen Fällen kann es zu Müdigkeit, Mundtrockenheit und Problemen beim Wasserlassen kommen.

Vor allem bei Kindern kann es in Einzelfällen zum Auftreten von Unruhe, Verwirrheitszuständen und Krämpfen kommen. In diesen Fällen ist umgehend ein Arzt zu verständigen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST GRAZER EST-GEL AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum (Verw.bis) nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie dieses Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Grazer Est-Gel enthält

- Die Wirkstoffe in 100g sind:
5 g Kamillentinktur, 5 g Essigsäure Tonerde, 2 g Diphenhydramin Hydrochlorid.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Gereinigtes Wasser, Ethanol (Alkohol), Hydroxyethylcellulose, aetherisches Zitronenöl, Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216)

Wie Grazer Est-Gel aussieht und Inhalt der Packung

Grazer Estgel ist ein klares gelbliches Gel. Es ist in Aluminiumtuben mit Kunststoffverschluss abgefüllt.

Packungsgröße: 30 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Adler Apotheke
Hauptplatz 4
A-8010 Graz
Tel: 0043 (0) 316 830342
Email: office@adlerapotheke-graz.at

Reg. Nr.: APO-5-01870

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 05/19