

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

GRAZER HÄMORRHOIDENSALBE

Wirkstoffe: Benzocain, Hamamelisfluidextrakt, Dexpanthenol, Levomenthol, Auszug aus Ringelblumenblüten

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Grazer Hämorrhoidensalbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Grazer Hämorrhoidensalbe beachten?
3. Wie ist Grazer Hämorrhoidensalbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Grazer Hämorrhoidensalbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST GRAZER HÄMORRHOIDENSALBE UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Grazer Hämorrhoidensalbe ist eine Salbe zur Anwendung im Afterbereich. Das in der Grazer Hämorrhoidensalbe enthaltene Benzocain wirkt schmerzstillend und juckreizstillend, Hamamelis zusammenziehend (adstringierend), Levomenthol hat einen angenehm kühlenden Effekt, Ringelblumenblüten und das Dexpanthenol wirken entzündungshemmend und heilend.

Anwendungsgebiete:

Grazer Hämorrhoidensalbe hilft bei Hämorrhoiden, bei geröteter, rissiger Haut sowie Juckreiz im Afterbereich.

Grazer Hämorrhoidensalbe wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.

Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON GRAZER HÄMORRHOIDENSALBE BEACHTEN?

Grazer Hämorrhoidensalbe darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Benzocain, Hamamelisfluidextrakt, Dexpanthenol, Levomenthol, Ringelblumenblüten, Korbblütler, oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Kindern unter 12 Jahren. Bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes.

- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von Grazer Hämorrhoidensalbe kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.
- in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

wenn Sie zu Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut (allergischem Kontaktekzem) neigen, sollten Sie die Anwendung von Grazer Hämorrhoidensalbe vermeiden, da die Möglichkeit der Sensibilisierung besteht.

Die Salbe ist nur zur Anwendung im Analbereich bestimmt und darf nicht auf Schleimhäuten und offenen Wunden aufgebracht werden.

Bei Zeichen einer Infektion (massive Rötung, Schmerzen oder Eiterung) ist ein Arzt aufzusuchen. Nach dem Auftragen der Salbe sind die Hände gründlich mit warmen Wasser und Seife zu reinigen. Falls keine Besserung eintritt, Nebenwirkungen auftreten oder sich Ihre Symptome verschlimmern, dann müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Kinder und Jugendliche

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

Anwendung von Grazer Hämorrhoidensalbe zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen oder angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen oder anzuwenden.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Eine Anwendung von Grazer Hämorrhoidensalbe während der Schwangerschaft oder in der Stillperiode sollte aus Sicherheitsgründen unterbleiben.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Grazer Hämorrhoidensalbe hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. WIE IST GRAZER HÄMORRHOIDENSALBE ANZUWENDEN?

Wenden Sie Grazer Hämorrhoidensalbe immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zur lokalen Anwendung

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die Salbe morgens und abends, sowie nach jedem Stuhlgang, dünn unmittelbar um den After herum, aufzutragen.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen:

Grazer Hämorrhoidensalbe ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

Dauer der Anwendung:

Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Grazer Hämorrhoidensalbe kann aufgrund des Mentholgehaltes bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

In seltenen Fällen können allergische Reaktionen, brennende Schmerzen, oder eine vorübergehende lokale Gefühllosigkeit auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können

Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST GRAZER HÄMORRHOIDENSALBE AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Das Behältnis fest verschlossen halten.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum (Verw.bis) nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie dieses Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Grazer Hämorrhoidensalbe enthält

- Die Wirkstoffe in 100g sind: 0,55 g Benzocain, 0,55 g Hamamelisfluidextrakt, 0,55 g Levomenthol, 1,65 g Dexpanthenol, Auszug aus 5,6 g Ringelblumenblüten
- Die sonstigen Bestandteile sind: weißes Vaseline, Bienenwachs, Ultrabas

Wie Grazer Hämorrhoidensalbe aussieht und Inhalt der Packung

Grazer Hämorrhoidensalbe ist eine braungelbe Salbe. Sie ist in Aluminiumtuben mit Kanüle mit Kunststoffverschluss abgefüllt.

Packungsgröße: 30 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Adler Apotheke

Hauptplatz 4
A-8010 Graz
Tel: 0043 (0) 316 830342
Email: office@adlerapotheke-graz.at

Reg. Nr. APO-5-01830

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 06/2019