

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

### GRAZER HÄMORRHOIDENZÄPFCHEN

Wirkstoffe: Polidocanol, Levomenthol, Hamamelisfluidextrakt, Auszug aus Ringelblumenblüten

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Grazer Hämorrhoidenzäpfchen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Grazer Hämorrhoidenzäpfchen beachten?
3. Wie sind Grazer Hämorrhoidenzäpfchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Grazer Hämorrhoidenzäpfchen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. WAS SIND GRAZER HÄMORRHOIDENZÄPFCHEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Das in den Grazer Hämorrhoidenzäpfchen enthaltene Polidocanol wirkt schmerzstillend und juckreizstillend, Menthol hat einen angenehm kühlenden Effekt, Hamamelis wirkt zusammenziehend (adstringierend) und Ringelblumenblüten wirken entzündungshemmend.

**Anwendungsgebiete:** Zum Einführen in den After bei tief liegenden (inneren) Hämorrhoiden, sowie bei Juckreiz im Analbereich.

Nicht länger als 3 Tage anwenden

Grazer Hämorrhoidenzäpfchen werden angewendet bei Erwachsenen ab 18 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON GRAZER HÄMORRHOIDENZÄPFCHEN BEACHTEN?

**Grazer Hämorrhoidenzäpfchen dürfen nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Polidocanol, Levomenthol, Hamamelisfluidextrakt, Ringelblumenblüten, Korbblütler oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren (bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von Menthol aus Grazer Hämorrhoidenzäpfchen kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.
- in der Schwangerschaft und Stillzeit

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Wenn Sie zu Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut (allergischem Kontaktekzem) neigen, sollten Sie die Anwendung von Grazer Hämorrhoidenzäpfchen vermeiden, da die Möglichkeit der Sensibilisierung besteht.

Dieses Arzneimittel enthält Menthol, das bei hoher Dosis neurologische Störungen wie Krampfanfälle bei Säuglingen und Kindern verursachen kann.

Nicht länger als 3 Tage anwenden, aufgrund der Risiken in Verbindung mit der Speicherung von Terpen-Derivaten (zum Beispiel Kampfer, Cineol, Niauli, Wildthymian, Terpeneol, Terpin, Citral, Menthol und ätherische Öle aus Kiefernadel, Eucalyptus und Terpentin) im Körper, einschließlich des Gehirns, vor allem neuropsychologische Störungen; und aufgrund des Risikos von brennenden Schmerzen im After. Die Zäpfchen sind nur zur Anwendung im After bestimmt und dürfen nicht beim Bestehen von offenen Wunden eingeführt werden.

Bei Zeichen einer Infektion (massive Rötung, Schmerzen oder Eiterung) ist ein Arzt aufzusuchen.

Nach dem Einführen der Zäpfchen sind die Hände gründlich mit warmen Wasser und Seife zu reinigen.

Keine höhere Dosis als empfohlen anwenden, da sonst ein höheres Risiko für Nebenwirkungen und Störungen wegen Überdosierung besteht.

Das Arzneimittel ist entzündlich, nicht in die Nähe von Feuer bringen.

Falls keine Besserung eintritt, Nebenwirkungen auftreten oder sich Ihre Symptome verschlimmern, dann müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **Kinder und Jugendliche**

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

### **Anwendung von Grazer Hämorrhoidenzäpfchen zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen oder angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen oder anzuwenden.

Grazer Hämorrhoidenzäpfchen nicht gleichzeitig mit anderen Produkten (Arzneimittel oder Kosmetika) jeder Anwendungsart (oral, rektal, kutan oder inhalativ), die ebenfalls Terpen-Derivate (zum Beispiel Kampfer, Cineol, Niauli, Wildthymian, Terpeneol, Terpin, Citral, Menthol und ätherische Öle aus Kiefernadel, Eucalyptus und Terpentin) enthalten, anwenden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Grazer Hämorrhoidenzäpfchen haben keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

## **3. WIE SIND GRAZER HÄMORRHOIDENZÄPFCHEN ANZUWENDEN?**

Wenden Sie Grazer Hämorrhoidenzäpfchen immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zur lokalen Anwendung

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene ab 18 Jahren:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, morgens und abends, sowie nach jedem Stuhlgang 1 Zäpfchen in den After einführen, jedoch nicht mehr als 3 Zäpfchen pro Tag.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen:

Grazer Hämorrhoidenzäpfchen sind nicht zur Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

Dauer der Anwendung:  
Nicht länger als 3 Tage anwenden.

**Wenn sie eine größere Menge von Grazer Hämorrhoidenzäpfchen angewendet haben, als sie sollten**  
Eine wiederholte und längere Anwendung kann zu brennenden Schmerzen am After führen.  
Eine versehentliche orale Einnahme durch Kinder kann zu neurologischen Störungen führen. In solchen Fällen ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Grazer Hämorrhoidenzäpfchen können aufgrund des Mentholgehaltes bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

In seltenen Fällen können allergische Reaktionen, brennende Schmerzen oder eine vorübergehende lokale Gefühllosigkeit auftreten.

##### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. WIE SIND GRAZER HÄMORRHOIDENZÄPFCHEN AUFZUBEWAHREN?**

Kühl lagern (8 bis 15° C).

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum (Verw.bis) nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie dieses Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### **6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

##### **Was Grazer Hämorrhoidenzäpfchen enthalten**

Die Wirkstoffe sind: 1 Zäpfchen enthält: 30 mg Polidocanol, 30 mg Menthol, 30 mg Hamamelisfluidextrakt, Auszug aus 140 mg Ringelblumenblüten

Die sonstigen Bestandteile sind: Neutralfett, weiße Vaseline, Bienenwachs, Cetylpalmitat, Kieselerde

**Wie Grazer Hämorrhoidenzäpfchen aussehen und Inhalt der Packung**

Grazer Hämorrhoidenzäpfchen sind gelbbraune torpedoförmige Zäpfchen zum Einführen in den Mastdarm. Sie sind in einer weißen Kunststoffolie abgepackt

Packungsgröße: 10 Stück

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Adler Apotheke

Hauptplatz 4

A-8010 Graz

Tel: 0043 (0) 316 830342

Email: office@adlerapotheke-graz.at

**Reg.Nr.** APO-5-02212

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 05/2019**