

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Gründberger Schwedenbitter

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Gründberger Schwedenbitter** jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist **Gründberger Schwedenbitter** und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von **Gründberger Schwedenbitter** beachten?
3. Wie ist **Gründberger Schwedenbitter** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Gründberger Schwedenbitter** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST Gründberger Schwedenbitter UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Gründberger Schwedenbitter besteht aus Extrakten, deren Inhaltsstoffe durch Steigerung der Gallen- und Magensaftsekretion appetitanregend und regulierend bei Verdauungsbeschwerden wirken.

Anwendungsgebiete: Leichte Verdauungsbeschwerden wie Völlegefühl, Blähungen und verschlagene Winde, Appetitlosigkeit, krampfartige Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, verdorbener Magen, verdauungsfördernd nach fetten und schweren Mahlzeiten.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON Gründberger Schwedenbitter BEACHTEN?

Gründberger Schwedenbitter darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Gründberger Schwedenbitter sind, insbesondere bei bekannter Allergie gegen Korbblütler,
- bei Magen- oder Darmgeschwüren,
- bei Erkrankungen der Gallenblase, Gallensteinen, Gallengangsentzündungen- oder verschluss,
- bei Darmverschluss,
- bei schweren Leber- oder Nierenfunktionsstörungen,
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren (Bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes),
- während der Schwangerschaft und Stillzeit,
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegsbeschwerden, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von **Gründberger Schwedenbitter** kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.
- von Alkoholkranken: **Gründberger Schwedenbitter** enthält pro Einzeldosis (5ml) ca. 1,8 g Alkohol.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Gründberger Schwedenbitter ist erforderlich

Patienten mit Herzerkrankungen, Störungen der Nierenfunktion oder Diabetes sollten vor der Anwendung Ihren Arzt fragen. Bei Patienten mit Gallensteinen kann es durch die Anregung des Galleflusses zu Koliken kommen.

Für die Dauer der Anwendung von **Gründberger Schwedenbitter** sollte auf längere Sonnenbäder und intensive UV-Strahlung verzichtet werden, da eine vermehrte Lichtempfindlichkeit der Haut vorliegen kann.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Bei Einnahme von Gründberger Schwedenbitter mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es kann zu Wechselwirkungen mit Medikamenten kommen, welche die Krampfschwelle senken (z.B. bestimmte Mittel gegen Depressionen).

Die Wirkung von Tetracyclinen oder Bisphosphonaten kann beeinträchtigt werden, daher wird ein Abstand von mehreren Stunden zur Einnahme dieser Medikamente empfohlen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Gründberger Schwedenbitter darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen



Dieses Arzneimittel kann die Reaktionsfähigkeit und Verkehrsfähigkeit beeinträchtigen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Gründberger Schwedenbitter

Dieses Arzneimittel enthält 40 Vol-% Ethanol (Alkohol), dh. bis zu 1,8 g pro Dosis (5 ml), entsprechend 45 ml Bier, 19 ml Wein pro Dosis und darf daher Alkoholkranken nicht gegeben werden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. stillenden Mütter, sowie Kindern, Jugendlichen und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

3. WIE IST Gründberger Schwedenbitter EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Gründberger Schwedenbitter immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Vor Gebrauch schütteln.

Bei Verdauungsbeschwerden nehmen Erwachsene ab 18 Jahren 1-3 mal täglich 1 Teelöffel (5ml) unverdünnt oder mit Wasser oder Tee ein.

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

Wenn sich die Symptome verschlimmern, oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Gründberger Schwedenbitter ist nicht zur Langzeitanwendung bestimmt und sollte nur im Bedarfsfall eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Gründberger Schwedenbitter eingenommen haben als Sie sollten,

kann es zu Magen-Darm-Beschwerden kommen.

Bei massiver Überdosierung können Zubereitungen mit Wermutkraut Vergiftungen mit Erbrechen, starken Durchfällen, Harnverhaltung, Benommenheit und Krämpfen

hervorrufen, durch Kampfer können zusätzlich Schwindel und Verwirrtheit auftreten. Myrrhe kann in hohen Dosen außerdem Herzrhythmusstörungen, Nierenreizungen und Störungen des Blutzuckerspiegels verursachen. In diesen Fällen ist sofort ein Arzt zu verständigen.

Wenn Sie die Einnahme von Gründberger Schwedenbitter vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Gründberger Schwedenbitter abbrechen

Gründberger Schwedenbitter ist nicht zur Langzeitanwendung bestimmt und sollte nur im Bedarfsfall eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann **Gründberger Schwedenbitter** Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Selten kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen, Magen-Darm-Beschwerden (wie Durchfall, Übelkeit, Krämpfe), sowie Magenschmerzen durch vermehrte Magensäureproduktion, zu Veränderungen des Geschmacksempfindens, Juckreiz, Kopfschmerzen, oder Herzrasen kommen.

Eine längerfristige Anwendung von Kalmus kann zu Krampfanfällen oder Nierenschäden führen.

Die enthaltene Angelikawurzel kann die Haut lichtempfindlicher machen und in Kombination mit UV-Strahlen zu Hautentzündungen führen.

Gründberger Schwedenbitter kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST Gründberger SCHWEDENBITTER AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Die Flasche fest verschlossen halten und im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Gründberger Schwedenbitter enthält

- Die Wirkstoffe sind: 100 g werden hergestellt aus einem wässrig-alkoholischen Auszug aus Wermutkraut 0,3 g, Kardobenediktenkraut 0,30 g, Myrrhe 0,70 g, Angelikawurzel 0,30 g, Kalmuswurzel 0,70 g, Enzianwurzel 0,30 g, Löwenzahnwurzel 0,50 g, Löwenzahnblättern 0,50 g, Zitwerwurzel 0,35 g, Muskatnuß 0,70 g sowie Magnesiumsulfat 0,70 g und Kampfer 0,04 g
- Die sonstigen Bestandteile sind: gereinigtes Wasser, Ethanol, Ammonsulfid-Zuckerulör E150d

1 ml entspricht ca. 0,9 g

Wie Gründberger Schwedenbitter aussieht und Inhalt der Packung

Dunkelbraune Lösung mit charakteristischem Geruch. Bei **Gründberger Schwedenbitter** handelt es sich um ein Naturprodukt, bei welchem es zu Trübungen kommen kann, welche jedoch die Wirkung nicht beeinträchtigen.
Packungsgröße: 500 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller

Gründberg Apotheke
Sierningerstr. 174a
4400 Steyr
Tel. 07252 / 77276
Fax 07252 / 772766
email: office@gruendberg-apotheke.at

Reg.Nr.: APO-5-xxxxx

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 11/2011