

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Ischler Entschlackungstee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

WAS IST ISCHLER ENTSCHLACKUNGSTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Ischler Entschlackungstee ist eine Teemischung mit schweißtreibender und harntreibender Wirkung.

Er wird angewendet zur Anregung des Stoffwechsels im Rahmen von Entschlackungskuren.

Ischler Entschlackungstee ist aufgrund seines Anwendungsgebietes nicht für die Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bestimmt.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ISCHLER ENTSCHLACKUNGSTEE BEACHTEN?

Ischler Entschlackungstee darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Birkenpollen, gegenüber Korbblütlern wie z.B. Löwenzahn oder gegenüber Fenchel oder Sellerie,
- bei Wasseransammlungen (Ödemen) aufgrund eingeschränkter Herz- und Nierentätigkeit, sowie bei Herz-, oder Nierenerkrankungen, bei denen eine verminderte Flüssigkeitszufuhr empfohlen wird,
- bei Magen-, Darmgeschwüren,
- bei Darmverschluss,
- bei Entzündungen und Störungen im Bereich des Galleabfluss

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Ischler Entschlackungstee ist erforderlich

Beim Vorliegen von chronischen Nierenerkrankungen sowie beim Auftreten von Fieber, Harnverhalten, Koliken oder Blut im Harn ist der Arzt zu kontaktieren.

Bei Anwendung von Ischler Entschlackungstee mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Ischler Entschlackungstee darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

WIE IST ISCHLER ENTSCHLACKUNGSTEE ANZUWENDEN?

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse werden 1 bis 2 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 10 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene:

Morgens und abends vor dem Schlafengehen 1 Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Bei einer Durchspülungstherapie ist auf eine reichliche zusätzliche Flüssigkeitszufuhr zu achten.

Ischler Entschlackungstee sollte im Rahmen von Entschlackungskuren nur über einen begrenzten Zeitraum (maximal 2 Wochen lang) angewendet werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Ischler Entschlackungstees haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

In Einzelfällen können allergische Reaktionen auftreten. Bei empfindlichen Personen kann es zu Magen-Darm-Beschwerden mit Übelkeit, Erbrechen, Durchfall kommen. In seltenen Fällen kann es bei besonders empfindlichen Personen zu Magenbeschwerden durch übermäßige Magensäurebildung kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

WIE IST ISCHLER ENTSCHLACKUNGSTEE AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Was Ischler Entschlackungstee enthält

100 g enthalten: Holunderblüten 3 g, Birkenblätter 30 g, Walnussblätter 6 g, Fenchelfrüchte 3 g, Brennnesselkraut 30 g, Klettenwurzel 6 g, Queckenwurzel 6 g, Löwenzahnwurzel 6 g, Schlehdornblüten 3 g, Klatschmohnblüten 3 g, Eibischblätter 4 g.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Esplanade-Apotheke, Mag.pharm. Anna-Maria Köck KG, Esplanade 18, 4820 Bad Ischl

Tel.: 06132-23427

Fax: 06132-23427-16

Reg.Nr. APO-5-00925

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Jänner 2019.