

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Ischler Hustentropfen für Erwachsene

Wirkstoffe: Ammoniumchlorid, Primelfluidextrakt, Süßholzfluidextrakt, Sulfogujakolsirup, zusammengesetzter Anisspiritus

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen die Ischler Hustentropfen für Erwachsene jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der angeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. WAS SIND DIE ISCHLER HUSTENTROPFEN FÜR ERWACHSENE UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?
2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME DER ISCHLER HUSTENTROPFEN FÜR ERWACHSENE BEACHTEN?
3. WIE SIND DIE ISCHLER HUSTENTROPFEN FÜR ERWACHSENE EINZUNEHMEN?
4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?
5. WIE SIND DIE ISCHLER HUSTENTROPFEN FÜR ERWACHSENE AUFZUBEWAHREN?
6. WEITERE INFORMATIONEN

1. WAS SIND DIE ISCHLER HUSTENTROPFEN FÜR ERWACHSENE UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Ischler Hustentropfen für Erwachsene sind ein teilweise pflanzliches Hustenmittel mit hustenberuhigender und schleimlösender Wirkung. Sie werden angewendet bei Reizhusten und Husten mit hartnäckiger Verschleimung.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME DER ISCHLER HUSTENTROPFEN FÜR ERWACHSENE BEACHTEN?

Ischler Hustentropfen für Erwachsene dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile der Hustentropfen sind, sowie bei Allergien gegen Anethol, Doldenblütler, oder bei Paragruppenallergie
- bei eingeschränkter Leber-, oder Nierenfunktion
- bei bestehenden Magen-, oder Darmerkrankungen inklusive Gastritis oder Magengeschwüre
- bei Asthma
- bei Alkoholabhängigkeit aufgrund des Alkoholgehaltes (35,8 Vol-%)

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ischler Hustentropfen für Erwachsene ist erforderlich

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Behandlung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich. Vor allem bei Atemnot, Fieber, eitrigem oder blutigem Auswurf ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Bei Bluthochdruck, bei Erkrankungen der Herzkranzgefäße oder bei bestimmten Störungen des Mineralstoffwechsels (Hypokaliämie) dürfen Ischler Hustentropfen für Erwachsene nur mit Vorsicht und erst nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden.

Patienten, die Süßholz-hältige Arzneimittel wie Ischler Hustentropfen für Erwachsene einnehmen, sollten keine anderen Süßholz-hältigen Produkte anwenden, auch wenn es sich nicht um Arzneimittel handelt, das es sonst vermehrt zum Auftreten von Nebenwirkungen kommen kann (s. Punkt 4.).

Ischler Hustentropfen für Erwachsene sind nicht zur Anwendung an Säuglingen und Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

Bitte nehmen Sie die Hustentropfen erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Bei Einnahme von Ischler Hustentropfen für Erwachsene mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich nicht um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Es kann zu Wechselwirkungen mit Medikamenten gegen Bluthochdruck kommen. Ischler Hustentropfen für Erwachsene sollten nicht gleichzeitig mit bestimmten entwässernden Medikamenten (Thiazid-Diuretika), Herzglykosiden, Kortison, Abführmitteln, oder anderen Medikamenten eingenommen werden, die den Elektrolythaushalt stören können. Bei der gleichzeitigen Einnahme von Ischler Hustentropfen für Erwachsene mit Salicylaten oder anderen entzündungshemmenden Arzneimitteln, kann deren magenreizende Wirkung verstärkt werden. Beruhigungsmittel und Medikamente, die zu einer Muskelentspannung führen (Muskelrelaxantien), können in ihrer Wirkung verstärkt werden. Keine gleichzeitige Einnahme von zentraldämpfenden Arzneimitteln oder Alkohol.

Schwangerschaft und Stillzeit

In Schwangerschaft und Stillzeit dürfen Ischler Hustentropfen für Erwachsene nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Die Reaktionsfähigkeit beim Lenken von Fahrzeugen sowie das Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen werden nicht beeinträchtigt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Ischler Hustentropfen für Erwachsene

Dieses Arzneimittel enthält 35,8 Vol-% Ethanol (Alkohol), dh. bis zu 0,23 g pro Dosis, entsprechend ca. 6 ml Bier, 2,6 ml Wein pro Dosis. Die Hustentropfen sind aufgrund des Alkoholgehalts nicht für Alkoholranke geeignet. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. stillenden Mütter, sowie Kindern, Jugendlichen und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen. Dieses Arzneimittel enthält Saccharose – siehe auch „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ischler Hustentropfen für Erwachsene ist erforderlich“. Dieses Arzneimittel enthält Methyl-4-Hydroxybenzoat (E 218) und Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

3. WIE SIND DIE ISCHLER HUSTENTROPFEN FÜR ERWACHSENE EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Ischler Hustentropfen für Erwachsene immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie Ihren Apotheker oder Arzt wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene nehmen bei Bedarf 3-5 x täglich 20 Tropfen entweder pur oder in einem lauwarmen Getränk ein. Die schleimlösende Wirkung von Ischler Hustentropfen für Erwachsene wird durch reichliche Flüssigkeitszufuhr unterstützt.

Für Säuglinge und Kinder unter 12 Jahren sind Ischler Hustentropfen für Erwachsene nicht geeignet.

Anwendungsdauer: Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Ischler Hustentropfen für Erwachsene eingenommen haben als Sie sollten,

können Magen-Darm-Beschwerden mit Erbrechen und Durchfall auftreten.

Bei langfristiger Anwendung oder höherer Dosierung kann es zu einer vermehrten Wasseransammlung im Gewebe mit Ödembildung und zu Störungen des Elektrolythaushaltes mit Kaliumverlusten, sowie vermehrt zu Nebenwirkungen, wie im Punkt 4. angeführt, kommen.

Wenn Sie die Anwendung von Ischler Hustentropfen für Erwachsene vergessen haben,

Nehmen Sie keinesfalls die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können Ischler Hustentropfen für Erwachsene Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Selten kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Magenschmerzen, Durchfall, sowie zu Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen) zum Beispiel der Haut mit Hautausschlägen, des Magen-/Darmtraktes, der Atemwege, sowie zu Atemnot, Müdigkeit oder Benommenheit kommen. Das enthaltene Süßholz kann vor allem bei längerfristiger Anwendung zu Kaliummangel (mit Muskelschwäche, Verstopfung, vermehrtem Wasserlassen, Herzrasen), Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen oder zu Störungen im Zentralnervensystem (mit Erbrechen, Kopfschmerzen, Unruhe, Schweißausbrüchen oder Bewusstseinsbeeinträchtigung) führen. Die enthaltenen Konservierungsmittel (Parabene) können allergische Reaktionen auslösen, die möglicherweise erst verspätet auftreten können. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE SIND DIE ISCHLER HUSTENTROPFEN FÜR ERWACHSENE AUFZUBEWAHREN?

Die Flasche fest verschlossen halten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Flasche nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Ischler Hustentropfen für Erwachsene enthalten

Die Wirkstoffe in 100 g sind:

1,00 g Ammoniumchlorid;

8,00 g Primelfluidextrakt, hergestellt aus einem Auszug aus Primelwurzel;

8,00 g Süßholzfluidextrakt, hergestellt aus einem Auszug aus Süßholzwurzel;

1,33 g Sulfogujakolsirup, hergestellt aus 0,1 g Kaliumgujakolsulfonat;

4,00 g zusammengesetzter Anisspiritus, hergestellt aus Anisöl und Ammoniumchlorid

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol, Saccharose, gereinigtes Wasser, Methyl-4-Hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-Hydroxybenzoat (E 216)

1 g entspricht ca. 25 Tropfen

Wie Ischler Hustentropfen für Erwachsene aussehen und Inhalt der Packung

Dunkelbraune Flüssigkeit; 30ml

Pharmazeutischer Unternehmen und Hersteller:

Registrierungsinhaber und Hersteller

Esplanade Apotheke

Mag.pharm. Anna-Maria Köck KG

Esplanade 18

4820 Bad Ischl

Reg.-Nr.: APO-5-00804

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Jänner 2019