

Ischler Magen- und Galletropfen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben, bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. WAS SIND ISCHLER MAGEN- UND GALLETROPFEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?
2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME DER ISCHLER MAGEN- UND GALLETROPFEN BEACHTEN?
3. WIE SIND ISCHLER MAGEN- UND GALLETROPFEN EINZUNEHMEN?
4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?
5. WIE SIND DIE ISCHLER MAGEN- UND GALLETROPFEN AUFZUBEWAHREN?
6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

1. WAS SIND ISCHLER MAGEN- UND GALLETROPFEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Durch eine Kombination verschiedener Heilpflanzen regen Ischler Magen- und Galletropfen die Gallenblasentätigkeit und die Bildung von Magensaft an. Die enthaltenen ätherischen Öle lindern Blähungen und wirken krampflösend.

Ischler Magen- und Galletropfen werden bei Völlegefühl, Verdauungsbeschwerden und bei Appetitlosigkeit eingesetzt. Eingenommen nach einem zu üppigem Essen, wird die Verdauung angekurbelt. Bei einer Einnahme vor einer Mahlzeit, wird der Appetit angeregt.

Die Ischler Magen- und Galletropfen werden angewendet bei Erwachsenen.

Wenn sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME DER ISCHLER MAGEN- UND GALLETROPFEN BEACHTEN?

Ischler Magen- und Galletropfen dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der im Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile des Präparates sind, sowie bei Allergien gegen Doldenblütler, Korbblütler, Menthol, Anethol
- bei Alkoholabhängigkeit
- bei Magen- oder Darmgeschwüren
- bei Lebererkrankungen
- bei Erkrankungen der Gallenblase oder der Gallengänge (Entzündungen, Verschluss, Gallensteine oder andere Gallenerkrankungen)

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Vorsicht ist geboten bei Patienten mit erhöhter Magensäureproduktion (Sodbrennen) mit dem Risiko der Verschlechterung eines bestehenden Reflux (Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre).

Patienten mit schweren Nierenerkrankungen, Diabetes, oder Herzkrankheiten sollten vor der Anwendung von Ischler Magen- und Galletropfen einen Arzt fragen, da das Risiko für eine Störung des Kaliumstoffwechsels besteht (Hyperkaliämie).

Kinder und Jugendliche

Ischler Magen- und Galletropfen sind nicht für die Anwendung an Kindern und Jugendlichen bestimmt.

Anwendung von Ischler Magen- und Galletropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen oder angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen oder anzuwenden.

Die Wirkung von Beruhigungs- oder Schlafmitteln kann verstärkt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
In Schwangerschaft und Stillzeit dürfen Ischler Magen- und Galletropfen nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Achtung: Dieses Arzneimittel kann die Reaktionsfähigkeit und Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen!

Ischler Magen- und Galletropfen enthalten Alkohol

Dieses Arzneimittel enthält 34 Vol-% Ethanol (Alkohol), d.h. bis zu 2,72g pro Dosis (10ml), entsprechend ca. 71 ml Bier, 31 ml Wein pro Dosis. Es besteht gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

3. WIE SIND ISCHLER MAGEN- UND GALLETROPFEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Ischler Magen- und Galletropfen immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben, bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zum Einnehmen.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene ab 18 Jahren nehmen:

Bei Völlegefühl oder Verdauungsbeschwerden (im Bedarfsfall, jedoch maximal 3x täglich) 1-2 Teelöffel (= 5-10ml) in etwas Wasser nach dem Essen.

Bei Appetitlosigkeit (im Bedarfsfall, jedoch maximal 3x täglich) 1 Teelöffel (=5ml) ca. 15min vor dem Essen.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen:

Ischler Magen- und Galletropfen sind nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bestimmt.

Dauer der Anwendung:

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen. Ischler Magen- und Galletropfen sind nicht zur Langzeitanwendung geeignet und sollten generell nie länger als 14 Tage eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Ischler Magen- und Galletropfen eingenommen haben als Sie sollten, kann es zu Übelkeit, Bauchkrämpfen oder Durchfall kommen. Bei erheblicher Überdosierung können Beklemmungsgefühl, Schwindel, Harnverhaltung, Benommenheit, Muskelzittern oder eine Pupillenerweiterung auftreten. In diesem Fall brechen Sie die Einnahme ab und reden Sie mit Ihrem Arzt.

Bei langfristiger Anwendung oder Überdosierung kann der enthaltene Kalmus zu Nierenschäden und Krampfanfällen führen.

Wenn Sie die Einnahme von Ischler Magen- und Galletropfen vergessen haben,

Ischler Magen- und Galletropfen sollten generell nicht regelmäßig, sondern nur im Bedarfsfall eingenommen werden. Nehmen Sie keinesfalls die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können Ischler Magen- und Galletropfen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Gelegentlich können Übelkeit, Bauchkrämpfe, Magenschmerzen, Sodbrennen und lokale Schleimhautreizungen, und in seltenen Fällen Herzrasen, Kopfschmerzen oder Juckreiz auftreten.

Selten kann es zu allergischen Reaktionen, auch der Haut und der Atemwege, und bei hellhäutigen Personen zu einer erhöhten Lichtempfindlichkeit der Haut mit Sonnenbrand-ähnlichen Reaktionen kommen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND ISCHLER MAGEN- UND GALLETROPFEN AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern. Die Flasche fest verschlossen halten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Ischler Magen- und Galletropfen enthalten

Die Wirkstoffe in 100g sind:

100g sind eine Tinktur aus 2g Kamillenblüte; 2g Pfefferminzblättern; 2g Kümmel; 1g Wermutkraut; 3g Angelikawurzel; 1g Kalmuswurzel; 2g Enzianwurzel; 1g Rathaniawurzel; 2g Löwenzahnwurzel; 2g Baldrianwurzel; 2g Hopfenzapfen;

Die sonstigen Bestandteile sind:

Tinktur aus Anis, Tausendguldenkraut und Bitterorangenschale, Ethanol

1g entspricht 0,8ml

Wie Ischler Magen- und Galletropfen aussehen und Inhalt der Packung

Braune Flüssigkeit; 50ml, 100ml

Es werden möglicherweise nicht alle Packungen in Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Esplanade Apotheke

Mag. pharm. Anna-Maria Köck KG

Esplanade 18

4820 Bad Ischl

Reg.-Nr.: APO-5-01537

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Jänner 2019