

PACKUNGSBEILAGE

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang, Hartkapsel Zur Anwendung bei Erwachsenen

Wirkstoff:

Rote Ginsengwurzel

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn die Beschwerden während der Einnahme des Arzneimittels anhalten, oder wenn Nebenwirkungen auftreten, die nicht in der Packungsbeilage beschrieben sind, konsultieren Sie bitte einen Arzt, einen Apotheker oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang beachten?
3. Wie ist Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang und wofür wird es angewendet?

Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung von Erschöpfungszuständen wie Müdigkeit und Schwäche.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang wird bei Erwachsenen angewendet.

Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang beachten?

Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen die Ginsengwurzel (*Panax ginseng* C. A. Meyer), andere Panax Arten, andere Pflanzen aus der Familie der Araliengewächse oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang einnehmen.

Bei sich verschlechternden Krankheitssymptomen während der Einnahme des Arzneimittels konsultieren Sie einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person.

Kinder und Jugendliche

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern und Jugendlichen liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Eine Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird deshalb nicht empfohlen.

Einnahme von Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bislang nicht bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Für Schwangere und Stillende wird daher die Einnahme von Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zur Auswirkung auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

3. Wie ist Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekerseins ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und ältere Patienten

3x täglich 2 Kapseln (600 mg). Die tägliche Dosis beträgt 6 Kapseln (1800 mg).

Kinder und Jugendliche

Die Einnahme durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren wird nicht empfohlen.

Patienten mit Einschränkungen der Nieren- und/oder Leberfunktion

Es liegen keine Daten für eine Dosierungsempfehlung für Patienten mit eingeschränkter Nieren- und/oder Leberfunktion vor.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Nehmen Sie Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang nicht länger als 3 Monate ein.

Wenn Sie eine größere Menge von Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang eingenommen haben, als Sie sollten

Es wurde bisher über keinen Fall von Überdosierung berichtet.

Wenn Sie die Einnahme von Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Überempfindlichkeitsreaktionen (Nesselsucht, Juckreiz), Schlafstörungen und Beschwerden im Bereich des Magen-Darm-Trakts wie Magenbeschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Verstopfung können auftreten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt und ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem, auf dem Umkarton und Blister nach „verwendbar bis“ angegebenen, Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang enthält

Der Wirkstoff ist: 300 mg Rote Ginsengwurzel (*Panax ginseng* C.A. Meyer, radix)

Der sonstige Bestandteil ist: Hypromellose (E464)

Wie Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang aussieht und Inhalt der Packung

Die transparenten Hartkapseln mit gelbem Pulver werden in Blistern (20 Kapseln pro Blister) in einen Umkarton verpackt.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Unternehmer

HWI pharma services GmbH
Rheinzaberner Str. 8
76761 Rülzheim
Deutschland

Hersteller

HWI pharma services GmbH
Rheinzaberner Str. 8
76761 Rülzheim
Deutschland

Reg.Nr.: 739338

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Deutschland: Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang
Österreich: Koreanischer Roter Ginseng CheongKwanJang

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2019.