GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

LUFT komprimiert medizinisch MESSER
Wirkstoff: Luft zur medizinischen Anwendung

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Luft komprimiert medizinisch jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben oder einen Rat benötigen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist *Luft komprimiert medizinisch* und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Luft komprimiert medizinisch* beachten?
3. Wie ist *Luft komprimiert medizinisch* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Luft komprimiert medizinisch* aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST *LUFT KOMPRIMIERT MEDIZINISCH* UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Luft komprimiert medizinisch ist ein medizinisches Gas zur Inhalation.
Der Behälter (Gasflasche oder Flaschenbündel) enthält komprimierte Luft zur medizinischen Anwendung mit einem Sauerstoffgehalt von 20,4 bis 21,4 Vol.-% (O_2) und ca. 78 Vol.-% Stickstoff (N_2).

Anwendungsgebiete sind:
- Ersatz für atmosphärische Luft (z.B. zur Beatmung)
- Trägergas für gasartige Narkosemittel

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON *LUFT KOMPRIMIERT MEDIZINISCH* BEACHTEN?

***Luft komprimiert medizinisch* darf nicht angewendet werden:**
Bei Anwendung unter atmosphärischem Druck sind keine Einschränkungen bekannt.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie *Luft komprimiert medizinisch* anwenden.
Bei gemeinsamer Inhalation mit anderen medizinischen Gasen außer Sauerstoff besteht die Gefahr einer Sauerstoffunterversorgung.

Kinder und Jugendliche
Es sind keine anderen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen als die oben angeführten zu beachten.

Bei Anwendung von *Luft komprimiert medizinisch* mit anderen Arzneimitteln:
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Anwendung von *Luft komprimiert medizinisch* zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol:
Keine Einschränkungen bekannt.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit:
Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:
Eine Behandlung mit *Luft komprimiert medizinisch* ist ohne Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit oder das Bedienen von Maschinen.

3. WIE IST *LUFT KOMPRIMIERT MEDIZINISCH* ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Eine Behandlung mit Überdruck bedarf sorgfältiger Überwachung durch eigens dafür geschulte Ärzte und medizinisches Fachpersonal.

Bei der Verwendung von *Luft komprimiert medizinisch* sind außerdem die Angaben im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Dieses stellt Ihnen Ihr Gaselieferant zur Verfügung.

Die Behandlung kann durchgeführt werden mit Hilfe

- einer Larynxmaske (Gummimaske über dem Kehlkopf)
- einer Atemmaske (z.B. Kunststoff-, Gummimaske, Venturi-Maske)
- eines transportablen Atemgerätes mit Maske
- eines Endotracheal-Tubus (Beatmungsschlauch in der Luftröhre)

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen
Luft komprimiert medizinisch kann genauso wie bei Erwachsenen angewendet werden. Über die anzuwendende Menge entscheidet in jedem Fall der Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge von *Luft komprimiert medizinisch* angewendet haben, als Sie sollten:
Setzen Sie die Behandlung mit der korrekten Menge fort.

Wenn Sie die Anwendung von *Luft komprimiert medizinisch* vergessen haben:
Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Setzen Sie die Behandlung mit der verordneten Menge fort.

Wenn Sie die Anwendung von *Luft komprimiert medizinisch* abbrechen:
Kann sich die Erkrankung, für die Sie Luft komprimiert medizinisch bekommen haben, verschlechtern.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch *Luft komprimiert medizinisch* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Unter Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind Nebenwirkungen bei Anwendung von *Luft komprimiert medizinisch* nicht zu erwarten

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

5. WIE IST *LUFT KOMPRIMIERT MEDIZINISCH* AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf..

Mit Luft in Berührung kommende Teile sind frei von Öl und Fett (auch Cremen und Salben) zu halten. Nur für Luft zugelassene Armaturen und Dichtungsmaterialien verwenden.

Veränderungen und Reparaturen an Behältern, Armaturen und anderen technischen Ausrüstungsteilen dürfen nur von entsprechenden Fachkräften durchgeführt werden.

Die Inhalationshilfen (z. B. Nasenbrille, Atemmaske, Tubus) müssen für die jeweilige Anwendungsart geeignet sein.

Eine missbräuchliche Verwendung der Behälter sowie eine Befüllung durch den Verbraucher oder Dritte ist nicht statthaft

Zur Entnahme von *Luft komprimiert medizinisch* aus einem Behälter ist erforderlichenfalls eine geeignete Druckreduziereinrichtung anzuschließen. Die Bedienungsanleitung für diese Einrichtung ist unbedingt zu beachten. Verunreinigung des Anschlusses vermeiden.

Entnahmeventil nach Gebrauch immer schließen.

Im Gefahrenfall ist das Ausströmen von *Luft komprimiert medizinisch* durch Schließen des entsprechenden Ventils am Behälter (siehe gegebenenfalls Bedienungsanleitung) zu unterbinden.

Behälter gegen Umfallen sichern (z.B. Verwendung eines Flaschenwagens) und vor mechanischer Beschädigung schützen.

Behälter gegen unzulässige Erwärmung (in der Regel über 50°C) schützen.

Sofern bei Flaschen ein Ventilschutz vorgesehen ist, muss dieser bei der Lagerung und dem Transport angebracht sein (z.B. Schutzkappe oder Tragegriff).

Verunreinigung der Behälter (z.B. durch Feuchtigkeit oder Eindringen von Wasser in die Behälter) vermeiden.

Bei der Lagerung und dem Transport von Behältern mit *Luft komprimiert medizinisch* sind außerdem die Angaben im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Die Verwendung von *Luft komprimiert medizinisch* aus teilentleerten Behältern ist bis zum Verfalldatum zulässig.

Leere Behälter oder Behälter mit Restinhalt sollten dem Vertreiber zur Wiederbefüllung oder Entsorgung übergeben werden. (Behälter nicht vollständig entleeren.)

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFROMATIONEN

Was *Luft komprimiert medizinisch* enthält:

Der Wirkstoff ist Luft.
Das Arzneimittel enthält keine weiteren Inhaltsstoffe.

Wie *Luft komprimiert medizinisch* aussieht und Inhalt der Packung:

Luft komprimiert ist ein farb- und geruchloses Gas.

Der Behälter (Gasflasche oder Flaschenbündel) enthält komprimierte Luft zur medizinischen Anwendung in Arzneibuchqualität mit einem Sauerstoffgehalt von 20,4 bis 21,4 Vol.-%.
Luft komprimiert medizinisch wird in verdichteter Form (Druck 100 bis 300 bar) in wiederbefüllbare Gasflaschen mit unterschiedlichem Rauminhalt (Volumen 0,4 bis 60 l) oder in Flaschenbündel (Volumen 300 bis 1200 l) abgefüllt.

Wie erkennt man den Gasinhalt?

Der Gasinhalt ergibt sich überschlagsmäßig aus der Behältergröße (auf dem Behälter eingeschlagen) multipliziert mit dem Behälterdruck, der von der Druckreduziereinrichtung abgelesen werden kann.

z.B.: 10 l x 200 bar = 2000 l oder 2 m³ entspanntes Gas

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

MESSER AUSTRIA GmbH
Industriestraße 5
A-2352 Gumpoldskirchen
Tel-Nr.: +43 (0) 50603-0
Fax-Nr.: +43 (0) 50603-273

Zulassungsnummer:

1-26096

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2012.