

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Mag. Libowitzky's Brust-Hustentee

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Mag. Libowitzky's Brust-Hustentee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

WAS IST MAG. LIBOWITZKY'S BRUST-HUSTENTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Mag. Libowitzky's Brust-Hustentee ist eine Teemischung mit reizlindernder und schleimlösender Wirkung bei Husten.

Er wird angewendet bei Katarrhen der Luftwege und bei trockenem Reizhusten.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren sollte nur auf ärztliche Anweisung erfolgen.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON MAG. LIBOWITZKY'S BRUST-HUSTENTEE BEACHTEN?

Mag. Libowitzky's Brust-Hustentee darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Primeln, gegenüber Doldenblütlern wie Anis und gegenüber Anethol, oder gegenüber Lippenblütlern wie Thymian,
- bei Kindern mit einmal aufgetretener akuter schwerer Kehlkopfentzündung mit Atemnot.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Mag. Libowitzky's Brust-Hustentee ist erforderlich

bei Asthma.

Wenn Sie unter Gastritis oder Magengeschwüren leiden, sollten Sie Mag. Libowitzky's Brust-Hustentee nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden.

Beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder Husten mit eitrigem Auswurf sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Bei Anwendung von Mag. Libowitzky's Brust-Hustentee mit anderen Arzneimitteln

Ein Abstand von mindestens einer Stunde zwischen der Anwendung von Mag. Libowitzky's Brust-Hustentee und der Einnahme anderer Medikamente wird empfohlen, da die Aufnahme anderer, gleichzeitig eingenommener Arzneimittel verzögert werden kann.

Schwangerschaft und Stillzeit

Bisher gibt es keine Anhaltspunkte für Risiken bei der Anwendung von Mag. Libowitzky's Brust-Hustentee in der Schwangerschaft und Stillzeit. Ergebnisse von Untersuchungen zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit liegen aber nicht vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten. Die Anwendung sollte nur im Bedarfsfall und kurzfristig erfolgen.

WIE IST MAG. LIBOWITZKY'S BRUST-HUSTENTEE ANZUWENDEN?

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für 1 Tasse wird 1 Esslöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 10 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Mehrmals täglich eine Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Die Anwendungsdauer sollte nicht länger als 2 Wochen betragen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Mag. Libowitzky's Brust-Hustentee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

In Einzelfällen können allergische Reaktion, Magenbeschwerden, Übelkeit und Erbrechen auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

WIE IST MAG. LIBOWITZKY'S BRUST-HUSTENTEE AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Was Mag. Libowitzky's Brust-Hustentee enthält

100 g enthalten: Eibischblätter 19 g, Eibischwurzel 19 g, Spitzwegerichblätter 19 g, Thymianblätter 19 g, Primelwurzel 19 g, Anis 5 g.

Inhalt der Packung

70 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber:

Apotheke zum Auge Gottes

Stadtplatz 37

3950 Gmünd

Reg.Nr. 5-00570

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Februar 2010.