

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Mag. Schwitzers Combintee Nr. 13 Magen-Beruhigungstee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST MAG. SCHWITZERS COMBINTEE NR. 13 MAGEN-BERUHIGUNGSTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Mag. Schwitzers Combintee Nr. 13 Magen-Beruhigungstee ist eine Teemischung mit beruhigender und reizlindernder Wirkung auf den Magen.

Er wird angewendet bei Magenbeschwerden wie z.B. Sodbrennen, Magendrücken, Aufstoßen und bei krampfartigen Magen-Darmbeschwerden.

Mag. Schwitzers Combintee Nr. 13 Magen-Beruhigungstee ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON MAG. SCHWITZERS COMBINTEE NR. 13 MAGEN-BERUHIGUNGSTEE BEACHTEN?**

**Mag. Schwitzers Combintee Nr. 13 Magen-Beruhigungstee darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbblütlern wie z.B. Kamille, gegenüber Lippenblütlern wie z.B. Melisse oder gegenüber Pfefferminze und Menthol,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit,
- von Kindern unter 12 Jahren,
- bei bekannter Lichtüberempfindlichkeit der Haut,
- bei Lebererkrankungen sowie bei Leberzirrhose,

- bei schweren Herz-/Kreislaferkrankungen,
- bei Zuckerkrankheit (Diabetes),
- bei Kaliummangel,
- bei schwerer Einschränkung der Nierenfunktion.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Mag. Schwitzers Combintee Nr. 13 Magen-Beruhigungstee ist erforderlich**

Sie sollten Mag. Schwitzers Combintee Nr. 13 Magen-Beruhigungstee nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden,

- wenn Sie unter einer hormonabhängigen Erkrankung (z.B. einem östrogenabhängigen Tumor) leiden,
- bei Sodbrennen oder bei Gallenleiden wie z.B. Entzündungen und Störungen im Bereich des Galleabflusses oder Gallensteine.

Während der Anwendung von Mag. Schwitzers Combintee Nr. 13 Magen-Beruhigungstee sollte eine intensive UV-Bestrahlung (lange Sonnenbäder, Höhensonne, Solarium) vermieden bzw. ein ausreichender Sonnenschutz gewährleistet werden.

**Bei Anwendung von Mag. Schwitzers Combintee Nr. 13 Magen-Beruhigungstee mit anderen Arzneimitteln**

Ein Abstand von mindestens einer Stunde zwischen der Anwendung von Mag. Schwitzers Combintee Nr. 13 Magen-Beruhigungstee und der Einnahme anderer Medikamente wird empfohlen, da die Aufnahme anderer, gleichzeitig eingenommener Arzneimittel verzögert werden kann.

Kaliumverluste durch andere Arzneimittel, z.B. die Harnausscheidung steigernde Arzneimittel, können verstärkt werden. Durch Kaliumverluste nimmt die Empfindlichkeit gegenüber bestimmten den Herzmuskel stärkenden Arzneimitteln (Herzglykoside) zu.

Johanniskraut-haltige Arzneimittel können die Wirksamkeit verschiedener anderer Arzneimittel beeinflussen. Daraus kann sich für die betroffenen Arzneimittel eine verminderte und/oder verkürzte Wirkung ergeben. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie gleichzeitig andere Arzneimittel einnehmen, wie zum Beispiel Indinavir oder andere Arzneimittel zur Behandlung von HIV-1 Infektionen, Arzneimittel zur Blutverdünnung, Ciclosporin (Arzneimittel zur Unterdrückung des Immunsystems), Theophyllin (Arzneimittel gegen Asthma), Digoxin (Arzneimittel gegen Herzschwäche) oder die „Pille“. Wenn Ihnen

Ihr Arzt Arzneimittel gegen Depressionen verschreibt, informieren Sie bitte ihren Arzt, dass Sie Mag. Schwitzers Combintee Nr. 13 Magen-Beruhigungstee einnehmen.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Mag. Schwitzers Combintee Nr. 13 Magen-Beruhigungstee darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **WIE IST MAG. SCHWITZERS COMBINTEE NR. 13 MAGEN-BERUHIGUNGSTEE ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse werden 2 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt 10 bis 15 Minuten stehengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Bis zu 3 bis 4 mal täglich 1 Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Die Teemischung sollte ohne Rücksprache mit dem Arzt über einen längeren Zeitraum (maximal 4-6 Wochen) eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Mag. Schwitzers Combintee Nr. 13 Magen-Beruhigungstee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können allergische Reaktionen (wie z.B. Hautschwellung, Juckreiz), Müdigkeit, Unruhe, Magen-Darmbeschwerden auch mit krampfartige Beschwerden und Übelkeit auftreten. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt.

Bei Langzeitanwendung kann es zu einer vermehrten Wasseransammlung im Gewebe, zu Bluthochdruck, Muskelschwäche, Herzrhythmusstörungen und Nierenschäden kommen. Nach sehr hohen Dosen kann es bei hellhäutigen Personen und Personen mit schweren Leberschäden zur Erhöhung der Lichtempfindlichkeit der Haut (Photosensibilisierung) kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### **WIE IST MAG. SCHWITZERS COMBINTEE NR. 13 MAGEN-BERUHIGUNGSTEE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

### **WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was Mag. Schwitzers Combintee Nr. 13 Magen-Beruhigungstee enthält**

100 g enthalten: Johanniskraut 21.5 g, Kamillenblüten 7.0 g, Kalmuswurzel 14.5 g, Melissenblätter 11.5 g, Malvenblätter 7.0 g, Pfefferminzblätter 17.0 g, Süßholzwurzel 21.5 g.

**Reg. Nr. APO-5-01690**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Juli 2010**