

## Gebrauchsinformation: Information für Patienten und Anwender

### Moncher's Doloverde Schmerzsalbe

Wirkstoffe: Methylsalicylat, Menthol, Eugenol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich innerhalb von 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist **Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von **Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** beachten?
3. Wie ist **Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist Moncher's Doloverde Schmerzsalbe und wofür wird sie angewendet?

Die in **Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** enthaltenen natürlich vorkommenden Wirkstoffe besitzen durchblutungsfördernde, schmerzstillende und entzündungshemmende Eigenschaften.

**Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** wird zur äußerlichen Behandlung von Muskel-, Gelenks- und Gliederschmerzen eingesetzt.

Wegen ihrer wärmenden und schmerzstillenden Wirkung wird die Anwendung bei folgenden Beschwerden empfohlen:

Sport- und Unfallverletzungen (z.B. Verstauchungen, Prellungen und Zerrungen, Muskelkater, Sehnen- und Sehnenscheidenentzündungen), Muskelverspannungen, „Hexenschuß“, sowie Gelenksbeschwerden (z.B. rheumatische Beschwerden oder Abnützungerscheinungen der Gelenke).

Wenn Sie sich innerhalb von 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Moncher's Doloverde Schmerzsalbe beachten?

**Moncher's Doloverde Schmerzsalbe darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Methylsalicylat, Menthol, Eugenol, Perubalsam, Erdnußöl oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei ausgedehnten Entzündungen der Haut, Ekzemen und Schuppenflechte.
- von Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von **Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.
- bei Kindern unter 12 Jahren (bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).

- bei bestimmten Atemwegserkrankungen wie Asthma, Pseudokrapp oder Keuchhusten.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Apotheker, bevor Sie **Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** anwenden.

Die Salbe darf nicht in die Augen, auf Gesicht und Schleimhäute oder offene Wunden gelangen.  
Unmittelbar nach dem Auftragen der Salbe Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.

**Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** darf bei Patienten mit Neigung zu Blutungen, Magen- oder Darmgeschwüren oder -entzündungen, sowie bei schweren Leber- oder Nierenschäden nur kleinflächig und kurzfristig angewendet werden.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn Gelenkschmerzen von Schwellungen, Rötungen, oder Fieber begleitet werden, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **Kinder und Jugendliche**

Da keine ausreichenden Daten vorliegen und aufgrund des Gehaltes an Methylsalicylat darf die Salbe nicht bei Kindern unter 12 Jahren angewendet werden.

### **Anwendung von Moncher's Doloverde Schmerzsalbe zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen oder angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen oder anzuwenden.

Bei lang andauernder und großflächiger Anwendung salicylathaltiger Salben sind Wechselwirkungen mit folgenden Substanzen möglich:

- Medikamente zur Blutverdünnung (erhöhte Blutungsgefahr)
- Methotrexat, das bei bestimmten Krebserkrankungen und zur Behandlung bestimmter Formen von Arthritis verwendet wird
- Blutzuckersenkter (zu starke Senkung des Blutzuckerspiegels)
- bestimmte Medikamente gegen Gicht
- bestimmte Medikamente zur Entwässerung
- bei gleichzeitiger Einnahme von kortisonhaltigen Medikamenten kann es zu einer Verstärkung der magenschleimhautschädigenden Wirkung kommen.

### **Anwendung von Moncher's Doloverde Schmerzsalbe zusammen mit Alkohol**

Bei gleichzeitiger Einnahme von Alkohol kann es zu einer Verstärkung der magenschleimhautschädigenden Wirkung kommen.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bei Schwangeren und Stillenden darf eine Behandlung nur über kurze Zeit und keinesfalls großflächig erfolgen.

Stillende dürfen **Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** nicht im Bereich der Brust anwenden!

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Moncher's Doloverde Schmerzsalbe enthält Ethyl-4-hydroxybenzoat, Kaliumsorbat und Erdnußöl**

Personen mit Konservierungsmittelallergien sollten den Gehalt an Ethyl-4-hydroxybenzoat (Ethylparaben) und Kaliumsorbat beachten. Das enthaltene Erdnußöl kann die Entstehung von Allergien fördern.

## 2. Wie ist Moncher's Doloverde Schmerzsalbe anzuwenden?

Wenden Sie **Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zur Anwendung auf der Haut.

Nur auf gesunder Haut anwenden. Nicht auf Schleimhäute, offene Wunden und in die Augen bringen. Nach dem Einreiben mit der Salbe die Hände gut waschen.

Empfohlene Dosis für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Es wird empfohlen, **Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** nach Bedarf 2-3x täglich dünn auf die schmerzhaften Körperstellen aufzutragen und leicht einzumassieren. Eine großflächige Anwendung ist zu vermeiden.

### Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

**Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** ist nicht zur Anwendung an Kindern unter 12 Jahren bestimmt.

Dauer der Anwendung:

Wenn Sie sich innerhalb von 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Eine längerfristige Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

### Wenn Sie eine größere Menge von Moncher's Doloverde Schmerzsalbe angewendet haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

Wenn Sie **Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** zu dick aufgetragen haben, empfiehlt sich das Abwaschen der Salbe mit Wasser.

Bei langfristiger großflächiger Anwendung sind Nebenwirkungen wie Übelkeit oder andere Magen-Darm-Beschwerden, sowie eine erhöhte Blutungsneigung nicht auszuschließen.

### Wenn Sie die Anwendung von Moncher's Doloverde Schmerzsalbe vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Häufig: Wärmegefühl oder leichtes Brennen an der Anwendungsstelle.
- Selten: Allergische Reaktionen der Haut wie Juckreiz, Ausschläge oder Blasenbildung. Die enthaltenen Parabene können Allergien auslösen, die möglicherweise erst verspätet auftreten.
- Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar): Verbrennungen am Applikationsort
- Bestehendes Asthma kann sich bei Überempfindlichkeit gegen Salicylate verschlechtern.

**Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Bei langfristiger großflächiger Anwendung sind Nebenwirkungen wie Übelkeit oder andere Magen-Darm-Beschwerden, sowie eine erhöhte Blutungsneigung nicht auszuschließen.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

**Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen**

**Traisengasse 5**

**AT-1200 WIEN**

**Fax: + 43 (0) 50 555 36207**

**Website: <http://www.basg.gv.at/>**

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist Moncher's Doloverde Schmerzsalbe aufzubewahren?**

Nicht über 25°C lagern. Nach Gebrauch sorgfältig verschließen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht verwenden, wenn Sie Folgendes bemerken:

Sie dürfen **Moncher's Doloverde Schmerzsalbe** nicht verwenden, wenn Sie eine Farbveränderung der Salbe feststellen bzw. ein „ranziger“ Geruch auftritt.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

**6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

**Was Moncher's Doloverde Schmerzsalbe enthält**

- Die Wirkstoffe in 100g sind: Methylsalicylat 10g, Menthol 5,4g, Eugenol 1,3g
- Die sonstigen Bestandteile sind: Nafol 1618, Natriumcetylstearylsulfat (Lanette E), Erdnußöl, Decyloleat (Cetiol V), Emulgin 05, Galenol 1618 DSN, Natriummonohydrogenphosphat, Ethyl-4-hydroxybenzoat, Kaliumsorbat 0,12%, gereinigtes Wasser

**Wie Moncher's Doloverde Schmerzsalbe aussieht und Inhalt der Packung**

Moncher's Doloverde Schmerzsalbe ist eine weiße homogene Salbe mit charakteristischem Geruch nach Gewürznelken und Menthol.

Moncher's Doloverde Schmerzsalbe ist in einem Tiegel zu 100g erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Registrierungsinhaber und Hersteller:

Apotheke Zum Andreas Hofer

Mag.Moncher KG

Andreas Hofer Str.30

A-6020 Innsbruck

Telefon:+43(0)512 584861

Telefax:+43(0)512 584861-9

E-Mail: [apotheke@andreas-hofer.at](mailto:apotheke@andreas-hofer.at)

[www.doloverde.at](http://www.doloverde.at)

Reg.Nr. 536775

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2018**