

Packungsbeilage: Information für Patienten

OSA® GRIPPALSIRUP mit Vitamin C

Flüssigextrakt aus Aloe arborescens + Ascorbinsäure

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung des Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für die Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Osa Grippalsirup mit Vitamin C und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Osa Grippalsirup mit Vitamin C beachten?
3. Wie ist Osa Grippalsirup mit Vitamin C einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Osa Grippalsirup mit Vitamin C aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Osa Grippalsirup mit Vitamin C und wofür wird es angewendet?

Osa Grippalsirup mit Vitamin C enthält einen Extrakt aus den frischen Blättern der Aloe arborescens. Osa Grippalsirup mit Vitamin C kann das Immunsystem anregen und zu einer Erhöhung der Anzahl von B- und T-Lymphozyten sowie der Produktion von Antikörpern beitragen.

Osa Grippalsirup mit Vitamin C enthält Ascorbinsäure (Vitamin C) und deckt den bei Infektionskrankheiten erhöhten Bedarf an Vitamin C.

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung von Infektionen der oberen Atemwege wie bei grippalen Infekten.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für die genannten Anwendungsgebiete registriert ist.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 3 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Osa Grippalsirup mit Vitamin C beachten?

Osa Grippalsirup mit Vitamin C darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen den Aloe arborescens und/oder Vitamin C oder einen der im Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie an oxalhaltigen Nierensteinen leiden,

- wenn Sie an bestimmten Erkrankungen leiden, bei denen zu viel Eisen im Körper gespeichert wird (Thalassämie, Hämochromatose, sideroblastische Anämie).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Osa Grippalsirup mit Vitamin C einnehmen.

Bitte nehmen Sie Osa Grippalsirup mit Vitamin C erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein,

- wenn Sie an einer erblichen Störung des Stoffwechsels der roten Blutzellen (z.B. erythrozytären Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase-Mangel) leiden,
- wenn Sie an einer Nierenfunktionsstörung leiden,
- wenn Sie eine Neigung zur Bildung von Nierensteinen haben.

Kinder

Die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Einnahme von Osa Grippalsirup mit Vitamin C zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Ascorbinsäure (Vitamin C) kann jedoch verschiedene klinisch-chemische Bestimmungsmethoden bzw. deren Ergebnisse beeinflussen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen wird die Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Osa Grippalsirup mit Vitamin C enthält Saccharose, Glucose und Fructose

Dieses Arzneimittel enthält pro Einzeldosis ca. 4 g Saccharose, ca. 20 mg Glucose und ca. 20 mg Fructose. Bitte nehmen Sie Osa Grippalsirup mit Vitamin C erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Osa Grippalsirup mit Vitamin C enthält Sorbitol

Dieses Arzneimittel enthält ca. 60 mg Sorbitol pro Einzeldosis. Sorbitol ist eine Quelle für Fructose. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bevor Sie (oder Ihr Kind) dieses Arzneimittel einnehmen oder erhalten, wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie (oder Ihr Kind) eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern haben oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fructoseintoleranz (HFI) - eine seltene angeborene Erkrankung, bei der eine Person Fructose nicht abbauen kann - festgestellt wurde.

Osa Grippalsirup mit Vitamin C enthält Natriumbenzoat

Dieses Arzneimittel enthält 6,6 mg Natriumbenzoat pro Einzeldosis.

Osa Grippalsirup mit Vitamin C enthält Natrium

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Einzeldosis, d. h. es ist nahezu „natriumfrei“.

3. Wie ist Osa Grippalsirup mit Vitamin C einzunehmen

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau, wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren:
3mal täglich je 5 ml

Kinder von 3 bis 5 Jahren:
2mal täglich je 5 ml

Zur Erleichterung der Dosierung liegt ein Messbecher bei.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.
Nehmen Sie den Sirup vor den Mahlzeiten ein.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Anwendung bei Kindern

Die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge Osa Grippalsirup mit Vitamin C eingenommen haben, als Sie sollten

Aloe arborescens:
Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Ascorbinsäure (Vitamin C):

Tagesdosen von mehr als 2 g Ascorbinsäure bei Erwachsenen (entsprechend ca. 200 ml dieses Arzneimittels) können die Bildung von Nierensteinen fördern. Bei Schmerzen in der Nierengegend oder erschwertem Harnlassen wenden Sie sich an Ihren Arzt. Nach Einnahme von mehr als 3 g Ascorbinsäure bei Kindern (entsprechend ca. 300 ml dieses Arzneimittels) oder mehr als 15 g bei Erwachsenen mit Glucose-6-Phosphatdehydrogenasemangel wurden Einzelfälle von Hämolyse berichtet. Zur Gefahr von Hämolysen (Auflösung der roten Blutzellen) und Nierensteinen: siehe Abschnitt 2 (Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen).

Wenn Sie die Einnahme von Osa Grippalsirup mit Vitamin C vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Keine bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen.

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Osa Grippalsirup mit Vitamin C aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen: 3 Monate.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Osa Grippalsirup mit Vitamin C enthält

- Die Wirkstoffe sind:
5 ml (entsprechend 6,55 g) enthalten:
1,92 g Flüssigextrakt aus frischen Blättern von Aloe arborescens, DEV (Droge-Extrakt-Verhältnis) 1:4, Auszugsmittel Wasser
0,051 g Ascorbinsäure (Vitamin C)
- Die sonstigen Bestandteile sind: Saccharose, eingedickter Aroniasaft (enthält Sorbitol, Glucose, Fructose), Natriumbenzoat E211, gereinigtes Wasser.

Wie Osa Grippalsirup mit Vitamin C aussieht und Inhalt der Verpackung

Rötlich braune Flüssigkeit (Sirup).

Als Verpackung dienen Glasflaschen mit einem Volumen von 100 und 200 ml.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG

Wolfganggasse 45-47

1121 Wien
Tel: 01/ 811 58
Fax: 01 / 811 587
e-mail: office@schmidgall.at

Reg. Nr.: 737313

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2019