

PACKUNGSBEILAGE

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Oscillococcinum Streukügelchen

Wirkstoff: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200 K

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Oscillococcinum und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Oscillococcinum beachten?
3. Wie ist Oscillococcinum einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Oscillococcinum aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Oscillococcinum und wofür wird es angewendet?

Oscillococcinum ist eine homöopathische Arzneispezialität.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- Vorbeugung von grippalen Infekten bei erhöhter Infektgefährdung
- Milderung der Symptome beginnender grippaler Infekte wie
 - Schüttelfrost
 - Fieber
 - Gliederschmerzen
 - Kopfschmerzen

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Kindern ab 2 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Oscillococcinum beachten?

Oscillococcinum darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Anas barbariae hepatis et cordis extractum oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Oscillococcinum einnehmen.

Wenn im Verlauf eines grippalen Infektes eine deutliche Verschlechterung des Allgemeinbefindens, Hautveränderungen (Schwellungen, Ausschläge), Beschwerden bei der Atmung, hohes Fieber, Bauchschmerzen, Bewusstseinsstörungen, Nackensteifigkeit oder heftige Kopfschmerzen auftreten, ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen, da eine sofortige Behandlung nötig sein könnte.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Kinder

Kinder unter 2 Jahren sollten das Arzneimittel nicht einnehmen, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für diese Altersgruppen vorliegen.

Einnahme von Oscillococcinum zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.

Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

Oscillococcinum enthält Saccharose und Lactose

Bitte nehmen Sie Oscillococcinum erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist Oscillococcinum einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

- Bei erhöhter Infektgefährdung, zur Vorbeugung:

Inhalt eines Einzeldosisbehältnisses, 1-mal wöchentlich während Phasen erhöhter Infektgefährdung

- Beim ersten Anzeichen grippeähnlicher Symptome, wie zum Beispiel: Frösteln, Gliederschmerzen und Müdigkeit:

Inhalt eines Einzeldosisbehältnisses, 3-mal täglich


Art der Anwendung und Hinweise zur Anwendung

Sublinguale Anwendung

1. Entnehmen Sie ein Einzeldosisbehältnis aus der Blisterpackung.



2. Öffnen Sie das Einzeldosisbehältnis durch Entfernen der Kappe.



3. Schütten Sie den gesamten Inhalt des Einzeldosisbehältnisses unter Ihre Zunge.



Für Kinder von 2 bis 6 Jahren wird empfohlen, den Inhalt des Einzeldosisbehältnisses in etwas Wasser gelöst zu verabreichen.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Bei vorbeugender Anwendung soll diese auf Phasen erhöhter Infektgefährdung beschränkt werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Oscillococcinum eingenommen haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

Wenn Sie die Einnahme von Oscillococcinum vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bisher wurden keine Nebenwirkungen bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Oscillococcinum aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und jedem Behältnis nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Es wird empfohlen, homöopathische Arzneimittel nicht in der Nähe elektromagnetischer Felder zu lagern (wie zum Beispiel Fernseher, Computerbildschirme, Mikrowellenherde).

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Oscillococcinum enthält

- Der Wirkstoff ist:
1 g Streukügelchen (ca. 200 Stück) wird hergestellt unter Verwendung von 0,01 ml Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200 K
- Die sonstigen Bestandteile sind: Saccharose und Lactose-Monohydrat

Wie Oscillococcinum aussieht und Inhalt der Packung

Dieses Arzneimittel besteht aus fast weißen, runden Streukügelchen in Einzeldosisbehältnissen aus Kunststoff mit 1 g Inhalt.

Eine Packung enthält 6 oder 30 Einzeldosisbehältnisse.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Frankreich

Z.Nr.:

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2022.