

B. . PACKUNGSBEILAGE

GEBRAUCHSINFORMATION

PHLEGMONE SALBE „JACOBY“ FÜR TIERE

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber:
JACOBY GM Pharma AG
Teichweg 2
5400 Hallein

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Phlegmone-Salbe „Jacoby“ für Tiere

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

100 g Salbe enthalten:

Wirkstoffe: Phenol: 1 g, Racemischer Campher: 4 g, Methylsalicylat: 1 g, Terpentin:30 g,
Sonstige Bestandteile: Cochenillerot (E124) 0,10 g

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Phlegmone Salbe „Jacoby“ für Tiere wird angewendet bei:

- - Phlegmonen,
- - Abszessen (zur Reifung),
- - Lymphknotenschwellungen,
- - subakuten und chronischen Haut- und Euterentzündungen

5. GEGENANZEIGEN

Nicht auf geschädigte Haut und auf Schleimhäute aufbringen. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile.

6. NEBENWIRKUNGEN

Mögliche Nebenwirkungen, die bei empfohlener Anwendung auftreten können und deren Häufigkeit:
-Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren) sind allergische Reaktionen möglich.

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, Schweine

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur Anwendung auf der Haut.

Dosierung:

Auf der zu behandelnden Stelle 2-3 mal täglich die Salbe messerrückendick auftragen.

Dauer der Anwendung: 1- 8 Tage bis zur Besserung.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Phlegmone-Salbe „Jacoby“ für Tiere soll nicht auf größere, offene Wunden aufgetragen werden. Nicht in die Augen und auf die Schleimhäute bringen.

10. WARTEZEIT

Rind, Schaf, Ziege: Essbares Gewebe: 3 Tage. Milch:3 Tage

Pferd, Schwein: Essbares Gewebe: 3 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für von Kinder aufbewahren.

Trocken und nicht über 25°C lagern.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Mit Phlegmone Salbe „Jacoby“ behandelte Tiere sind von Kindern fern zu halten.

Das Ablecken der behandelten Fläche ist mit geeigneten Mitteln zu verhindern.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Bei der Anwendung Handschuhe tragen.

Der Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhaut des Anwenders ist zu vermeiden.

Nach der Anwendung Hände waschen.

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und Laktation ist nicht belegt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Die Anwendung des Tierarzneimittels kann zur Steigerung der dermalen Resorption anderer Arzneimittel führen.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

August 2013

15. WEITERE ANGABEN

Z.Nr.: 9.558

Kunststoffiegel mit 200 g bzw. 1000 g Inhalt.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.