

## GEBRAUCHSINFORMATION

Rifen 160 mg/g Pulver zum Eingeben für Rinder

### 1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber: Vetcare Oy, P.O.Box 99, 24101 Salo, Finnland

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller: Galena Pharma Oy, P.O.Box 1450, 70501 Kuopio, Finnland

### 2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Rifen 160 mg/g Pulver zum Eingeben für Rinder  
Ketoprofen

### 3. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

**Arzneilich wirksamer Bestandteil:** Ketoprofen 160 mg/g  
1 Beutel zu 15 g Pulver enthält 2,4 g Ketoprofen und sonstige Bestandteile ad 15 g.  
Rifen ist ein weißes bis gelblich-weißes Pulver.

### 4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Linderung von Entzündungen und Fiebersenkung bei einzelnen Tieren.

### 5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Ketoprofen oder anderen nichtsteroidalen Antiphlogistika (NSAID). Nicht bei Tieren mit Magen-/Darmgeschwüren, hochgradigen Nierenfunktionsstörungen, Blutgerinnungsstörungen oder schweren Kreislaufstörungen (Hypovolämie) anwenden.

Nicht gleichzeitig mit und nicht innerhalb von 24 Stunden nach einem anderen nichtsteroidalen Antiphlogistikum (NSAID) verabreichen, da dies zu Vergiftungserscheinungen führen kann.  
Die gleichzeitige Anwendung von Glukokortikoiden verstärkt möglicherweise die Nebenwirkungen im Magen-Darmtrakt.  
Die gleichzeitige Anwendung von Schleifendiuretika (z.B. Furosemid) kann die Wirkung des Diuretikums vermindern.

### 6. NEBENWIRKUNGEN

Ketoprofen kann die für nichtsteroidale Antiphlogistika typischen Nebenwirkungen hervorrufen, wie z.B. Durchfall, ausgelöst durch gastrointestinale Irritation sowie Geschwürbildung.

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

## 7. ZIELTIERART(EN)

Rind (ausgewachsene Tiere).

## 8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Die empfohlene Dosierung beträgt 4 mg Ketoprofen pro kg Körpergewicht, einmal täglich über 1-3 Tage.

Beutel: Erwachsene Rinder mit 600 kg Körpergewicht: Ein Beutel zu 15 g Pulver einmal täglich über 1 - 3 Tage.

Mehrdosenbehältnis: Die Packung enthält einen Messlöffel. Ein gestrichener Messlöffel enthält 4 g und ist die empfohlene Dosierung für 160 kg Körpergewicht:

Gewicht des Tieres (kg)	Anzahl der Messlöffel (ein gestrichener Messlöffel enthält 4 g)
400	2 ½
480	3
560	3 ½
640	4
720	4 ½

## 9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Das Pulver soll mit Wasser vermischt werden, z.B. in einer Flasche mit ½ l Wasser gut schütteln und sogleich eingeben.

## 10. WARTEZEIT

Essbare Gewebe: 1 Tag

Milch: Null Tage.

## 11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Außenkarton, Etikett oder Beutel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Beutel: Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Mehrdosenbehältnis: Den Behälter fest verschlossen halten. Nach Anbruch trocken und unter 25°C lagern.

## 12. BESONDERE WARNHINWEISE

Für den Anwender:

Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAID) sollten jeglichen Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden. Aufgrund der Gefahr einer Sensibilisierung sollte direkter Kontakt dieses Tierarzneimittels mit Haut, Augen oder Schleimhäuten vermieden werden. Die Verwendung geeigneter Schutzkleidung bestehend aus Handschuhen, Schutzbrille und Mundschutz wird empfohlen. Bei unerwünschtem Kontakt sind betroffene Stellen sofort zu spülen. Nach Anwendung Hände waschen. Bitte beachten Sie, dass dieses Tierarzneimittel eine hohe

Konzentration des Wirkstoffs aufweist und versehentliche Einnahme zu einer ernsthaften Intoxikation beim Menschen führen kann.

Für das Zieltier:

Die Anwendung bei Rindern kurz vor der Geburt sollte vermieden werden, da es zu einer Verzögerung des Geburtsbeginns kommen könnte.

Nicht bei Tieren anwenden, die an Appetitlosigkeit leiden, da bei diesen durch die fehlende Futteraufnahme eine ungenügende Resorption von Ketoprofen erfolgen könnte.

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

16.12.2013

**15. WEITERE ANGABEN**

Z. Nr.: 8-00703

Packungsgrößen: Beutel 3 x 15 g  
Mehr Dosenbehältnis 1 kg und 250 g

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung.  
Vertrieb: Richter Pharma AG, Feldgasse 19, A-4600 Wels