PACKUNGSBEILAGE

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Spenglersan® Kolloid R Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Bei Fortdauern der Krankheitssymptome ist ein Arzt aufzusuchen.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Spenglersan Kolloid R und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Spenglersan Kolloid R beachten?
3. Wie ist Spenglersan Kolloid R anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Spenglersan Kolloid R aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Spenglersan Kolloid R und wofür wird es angewendet?

Spenglersan Kolloid R ist eine registrierte homöopathische Arzneispezialität ohne genehmigte therapeutische Anwendungsgebiete.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Spenglersan Kolloid R beachten?

Spenglersan Kolloid R darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Mycobacterium bovis Antigene nach Spengler, Mycobacterium bovis Antitoxine nach Spengler, Streptococcus pyogenes Antigene nach Spengler, Streptococcus pyogenes Antitoxine nach Spengler oder gegen einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Spenglersan Kolloid R anwenden.

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel immer von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Kinder und Jugendliche

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Anwendung von Spenglersan Kolloid R zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, soll Spenglersan Kolloid R in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

3. Wie ist Spenglersan Kolloid R anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

<u>Art der Anwendung</u>

Zur Anwendung auf der Haut

Sprühen Sie die verordnete Anzahl Sprühstöße in die Ellenbeuge und reiben Sie das Arzneimittel mit dem Daumenballen in die Haut ein. Es ist möglich, die verordnete Menge portionsweise aufzusprühen und einzureiben.

Halten Sie beim Sprühen die Flasche senkrecht und betätigen Sie vor dem erstmaligen Benutzen mehrfach den Sprühmechanismus bis zum Austritt eines feinen Nebels.

Hinweis: Bei Anwendung mehrerer Spenglersan Kolloide sollen diese in einem Abstand von mindestens 2 Stunden oder im täglichen Wechsel angewendet werden.

Dauer der Anwendung

Bei Fortdauern der Krankheitssymptome ist ein Arzt aufzusuchen.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von Spenglersan Kolloid R angewendet haben als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Anwendung von Spenglersan Kolloid R vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 Wien

Österreich

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: http://www.basg.gv.at/

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Spenglersan® Kolloid R aufzubewahren?

Nicht über 25°C aufbewahren. Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Spenglersan Kolloid R in 10 g enthält

Die Wirkstoffe sind:

- Mycobacterium bovis Antigene nach Spengler ad usum externum Dil. D9 3,33 g
- Mycobacterium bovis Antitoxine nach Spengler ad usum externum Dil. D9 3,33 g
- Streptococcus pyogenes Antigene nach Spengler ad usum externum Dil. D9 1,67 g
- Streptococcus pyogenes Antitoxine nach Spengler ad usum externum Dil. D9 1,67 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

- Thymol
- Salzsäure 25% (m/V)
- gereinigtes Wasser

1 Sprühstoß entspricht 0,05 ml Lösung.

Wie Spenglersan Kolloid R aussieht und Inhalt der Packung

Spenglersan Kolloid R ist ein Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung.

Packungsgrößen: 10 ml, 20 ml, 50 ml und 100 ml.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Spenglersan GmbH

Steinfeldweg 13, 77815 Bühl, Deutschland

Tel: 0049722330671

Email: info@spenglersan.de

Reg.-Nr.:

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2019