

B. PACKUNGSBEILAGE

GEBRAUCHSINFORMATION

Sporyl – Salbe für Rinder

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber: Richter Pharma AG, Feldgasse 19, A-4600 Wels

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller: Richter Pharma AG, Durisolstraße 14, A-4600 Wels

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Sporyl - Salbe für Rinder

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

100 g Salbe enthalten:

Wirkstoffe:

Nelkenöl mit einem Gehalt von 2,0 g Eugenol

Cetrimid 1,2 g

Sonstige Bestandteile: Gelbes Vaseline, Cetylstearylalkohol

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung von Dermatomykosen bei Rindern verursacht durch *Trichophyton verrucosum* (Trichophytie, Ring- oder Glatzflechte).

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile.

6. NEBENWIRKUNGEN

Bisher keine bekannt.

Falls Sie dennoch Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Rind

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur Anwendung auf der Haut.

Die befallenen Hautstellen sollten vor der Anwendung mit einer Waschlösung gründlich gereinigt und getrocknet werden.

Dermatophyten befallen auch die Haarfollikel, daher müssen eventuell vorhandene Krusten mit einer harten Bürste entfernt werden.

Danach wird die Salbe 1mal täglich auf die befallenen Stellen und deren Umgebung bis zur vollständigen Abheilung aufgetragen.

Wenn sich während der Therapie innerhalb von 2 Wochen keine klinische Verbesserung zeigt, sollte die Diagnose überprüft werden.

Allgemeine Maßnahmen der Hygiene sollten eingehalten werden, um eine Infektion bzw. Reinfektion zu vermeiden.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Keine.

10. WARTEZEIT(EN)

Null Tage.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25 °C lagern. Das Behältnis fest verschlossen halten.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 1 Monat

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Nicht in die Augen bringen.

Nicht zur Anwendung bei ausgedehnten oder bereits länger bestehenden Hautpilzkrankungen. In diesem Fall ist eine Behandlung des gesamten Tieres und/oder eine Bestandsbehandlung mit einem geeigneten antimykotisch wirkenden Tierarzneimittel in Erwägung zu ziehen.

Zur Vermeidung der Ausbreitung der Trichophytie auf andere Tiere sollten geeignete veterinärmedizinische und tierhalterische Maßnahmen getroffen werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Der Kontakt mit den Augen ist zu vermeiden.

Nach der Anwendung sind die Hände gründlich mit warmem Wasser und Seife zu waschen.

Es wird empfohlen, bei der Anwendung Gummihandschuhe zu tragen.

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder Legeperiode:

Während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Nutzen-Risikobewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:
Keine bekannt.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel), falls erforderlich:
Bei lokaler Anwendung auf der Haut sind Symptome einer Überdosierung bisher nicht beobachtet worden.

Inkompatibilitäten:
Da keine Kompatibilitätsstudien durchgeführt wurden, darf dieses Tierarzneimittel nicht mit anderen Tierarzneimitteln gemischt werden.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Fragen Sie Ihren Tierarzt, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

November 2014

15. WEITERE ANGABEN

Z. Nr.: 16.670

Packungsgröße: 210 g und 100g

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit Zulassungsinhaber in Verbindung.