

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe Weleda

Wirkstoff: Stannum metallicum D1 Trituration

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe beachten?
3. Wie ist Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe und wofür wird sie angewendet?

Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe ist eine homöopathische Arzneispezialität der anthroposophischen Therapierichtung.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis:

- Die Anregung rhythmischer Ausgleichsprozesse bei entzündlich auflösenden und degenerativ verhärtenden Erkrankungen
- besonders zur Vermeidung chronisch produktiver Entwicklungen
z.B. bei Ergussbildung in Körperhöhlen und Gelenken
- zur Begleitbehandlung bei Lebererkrankungen mit verhärtender Tendenz
- Zusatzbehandlung bei depressiven Verstimmungen, besonders mit seelischer Starre

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels der anthroposophischen Therapierichtung in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf anthroposophischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe beachten?

Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Stannum metallicum (Zinn) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Kinder unter 4 Jahren

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung bei Kindern unter 4 Jahren nicht empfohlen.

Anwendung von Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Es sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt.

Anwendung von Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.

Bei einer Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. Wie ist Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 4 Jahren:

Bei Gelenkerguss (geschwollenes Gelenk):

1 bis 2 mal täglich auf das betroffene Gelenk auftragen, über Nacht einen Salbenlappen auflegen.

Bei Pleuraerguss (Flüssigkeitsansammlung in der Pleurahöhle):

1 bis 2 mal täglich einen Salbenlappen über der betroffenen Stelle auflegen.

Zur Leberbehandlung und als Zusatzbehandlung bei depressiver Verstimmung:

Nachts als Salbenlappen über der Lebergegend anwenden.

Art der Anwendung

Zur Anwendung auf der Haut.

Einen 2 bis 3 cm langen Salbenstrang auf die betroffene Stelle auftragen.

Zur Anwendung als Salbenlappen wird ein Stück Leinen- oder Baumwollstoff dünn mit der Salbe bestrichen, auf die entsprechende Körperstelle mit der Salbenseite aufgelegt und befestigt. Der Salbenlappen kann mehrmals verwendet werden. Nach 3 bis 4-maligem Gebrauch sollte erneut etwas Salbe aufgestrichen werden.

Anwendung bei Kindern unter 4 Jahren

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung bei Kindern unter 4 Jahren nicht empfohlen.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge von Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe angewendet haben, als Sie sollten

Bisher wurden keine Fälle einer Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Anwendung von Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bis jetzt wurden keine Nebenwirkungen bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzuzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN, ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel nach *Verwendbar bis:* angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen: 6 Monate

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe enthält

10 g enthalten:

- Der Wirkstoff ist: Stannum metallicum D1 Trituration 0,4 g.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Dickflüssiges Paraffin, Protegin WX (Gelbes Vaseline, Ceresin, hydriertes Rizinusöl, Glycerolmonoisostearat, Polyglyceryl-3-oleat), gelbes Vaseline, gereinigtes Wasser, Lactose-Monohydrat

Wie Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe aussieht und Inhalt der Packung

Stannum metallicum D1 (0,4%) Salbe ist eine weiße bis hellgraue Salbe in einer Aluminiumtube mit Kunststoffverschluss im Überkarton.

Packungsgröße: 25 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

Weleda Ges.m.b.H. & Co KG, Hosnedlgasse 27, AT-1220 Wien.

Tel.-Nr.: 01 256 60 60, E-Mail: dialog@weleda.at

Hersteller:

Weleda AG, Möhlerstraße 3-5, DE-73525 Schwäbisch Gmünd

Tel.-Nr.: 0049 7171 919 109

Z.-Nr.: 336232

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2019.