

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss St. Severin Gallettee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

WAS IST ST. SEVERIN GALLETEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

St. Severin Gallettee ist eine Teemischung, die eine krampflösende und die Sekretion fördernde Wirkung auf die Galle hat.

Er wird angewendet zur Förderung der Gallensekretion.

St. Severin Gallettee ist nicht für die Anwendung an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren geeignet.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ST. SEVERIN GALLETEE BEACHTEN?

St. Severin Gallettee darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind, insbesondere bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbbütlern wie z.B. Ringelblume und gegenüber Pfefferminze und Menthol,
- bei schweren Leber- oder Nierenerkrankungen,
- bei Gelbsucht,
- bei Magen- und Darmgeschwüren,
- bei Entzündungen oder Verschluss der Gallenwege
- bei Darmverschluss,
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von St. Severin Galletee ist erforderlich

- bei Sodbrennen. In diesem Fall darf St. Severin Galletee nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.
- bei Gallensteinen. Durch Förderung der Gallesekretion können Koliken ausgelöst werden.
- Beim Auftreten von Schmerzen in der Nierengegend oder einem Veilchengeruch des Harns ist die Anwendung abubrechen und ein Arzt aufzusuchen.
- Wenn sie unter Bluthochdruck oder einer Erkrankung des Herzens leiden, sollten sie vor Anwendung von St. Severin Galletee einen Arzt befragen.

Bei Anwendung von St. Severin Galletee mit anderen Arzneimitteln

Eine gleichzeitige Anwendung synthetischer Diuretika (Mittel zur Steigerung der Harnmenge) wird nicht empfohlen

Schwangerschaft und Stillzeit

St. Severin Galletee darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

WIE IST ST. SEVERIN GALLETEE ANZUWENDEN?

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse wird 1 Esslöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 10 Minuten stengelassen und dann abgeseiht.

Erwachsene ab 18 Jahren:

3 mal täglich 1 Tasse frisch zubereiteten Tee trinken.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von St. Severin Galletee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

In Einzelfällen können allergische Reaktionen auftreten. In seltenen Fällen kann es bei besonders empfindlichen Personen zu Magenbeschwerden durch übermäßige Magensäurebildung kommen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt.

Bei lang andauernder Anwendung oder Überdosierung kann es zur Steigerung der Herzfrequenz und zu Bluthochdruck, zentralnervösen Anfällen, Störungen der Monatsblutung, Nierenschäden oder Leberschäden kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

WIE IST ST. SEVERIN GALLETEE AUFZUBEWAHREN?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Was St. Severin Gallettee enthält

100 g enthalten: Pfefferminzblätter 25 g, Gelbwurz 25 g, Löwenzahnwurzel 25 g, Wacholderbeeren 20 g, Ringelblumenblüten 5 g.

Reg. Nr. APO-5-01020

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im November 2010.