

GEBRAUCHSINFORMATION

Traumeel - Gel für Tiere

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber und Hersteller:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
76532 Baden-Baden
Deutschland

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Traumeel - Gel für Tiere

Braun bis braun-gelb-grünliches Gel

Homöopathische Arzneispezialität

3. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

10 g enthalten:

Wirkstoffe:

Achillea millefolium	Ø	0,009 g
Aconitum napellus	D1	0,005 g
Arnica montana	D3	0,15 g
Atropa bella-donna	D1	0,005 g
Bellis perennis	Ø	0,01 g
Calendula officinalis	Ø	0,045 g
Echinacea	Ø	0,015 g
Echinacea purpurea	Ø	0,015 g
Hamamelis virginiana	Ø	0,045 g
Hypericum perforatum	D6	0,009 g
Matricaria recutita	Ø	0,015 g
Symphytum officinale	D4	0,01 g
Hepar sulfuris	D6	0,0025 g
Mercurius solubilis Hahnemanni	D6	0,004 g

Sonstige Bestandteile:

Carbomere, Ethanol 96 % (Gesamtethanolgehalt ca. 24,4 Vol.% Alkohol), Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser, Spuren von Lactose-Monohydrat

4. ANWENDUNGSGEBIETE

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Zur unterstützenden Behandlung stumpfer Verletzungen wie Verstauchungen, Quetschungen und Prellungen; zur Behandlung entzündlicher Prozesse des Stütz- und Bewegungsapparats, z. B. bei Arthritis, Tendinitis, Tendovaginitis, sowie zur unterstützenden Behandlung entzündlicher Erkrankungen anderer Gewebe, wie z.B. bei Mastitis, Phlegmone.

Die Anwendung dieser homöopathischen Arzneispezialität in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen wie Arnica, Calendula (Ringelblume), Chamomilla (Kamille), Echinacea (Sonnenhut), Achillea millefolium (Schafgarbe) und Bellis perennis (Gänseblümchen) oder anderen Korbblütlern oder einem der sonstigen Bestandteile.

6. NEBENWIRKUNGEN

Allergische Hautreaktionen (Entzündungen der Haut, Rötung, Schwellung und Juckreiz) können auftreten. Das Mittel ist dann abzusetzen.

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERARTEN

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, Kaninchen und Meerschweinchen

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur Anwendung auf der Haut.

Das Gel wird bis zum Abklingen der Beschwerden mehrmals täglich (bis zu 3-4mal täglich) auf der betroffenen Fläche der Haut aufgetragen.

Wenn die Beschwerden trotz Behandlung länger als 7 Tage anhalten oder sich während der Behandlung verschlimmern, ist eine tierärztliche Beratung dringend erforderlich.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Keine.

10. WARTEZEIT

Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Kaninchen: Essbares Gewebe: 0 Tage
Pferd, Rind, Schaf, Ziege: Milch: 0 Stunden

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

In der Originalverpackung aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Karton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Nicht in die Augen oder auf Schleimhäute bringen. Nicht auf offene Hautstellen auftragen. Bei anhaltenden oder sich verschlimmernden Beschwerden sollte ein Tierarzt befragt werden.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Tierarzt kontrolliert werden.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Der Kontakt von Traumeel Gel mit den eigenen Augen ist zu vermeiden. Nach der Anwendung Hände waschen.

Trächtigkeit, Laktation oder Legeperiode

Zur Verträglichkeit von Traumeel Gel für Tiere bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt anwenden.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

Juli 2019

15. WEITERE ANGABEN

Metalltube mit Schraubverschluss aus Kunststoff mit 50 g und Flasche aus Kunststoff mit 250 g Gel.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Z. Nr.: 835451