

PACKUNGSBESCHRIFTUNGEN FÜR ÖSTERREICH**GEBRAUCHSINFORMATION FÜR**

Vanavit B-Komplex - Injektionslösung für Tiere

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber und für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:
Vana GmbH, Wolfgang Schmälzl-Gasse 6, 1020 Wien

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Vanavit B-Komplex - Injektionslösung für Tiere

3. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält:

Wirkstoff(e):

Thiamin Hydrochlorid	10 mg
Natrium Riboflavinphosphat	4 mg
Pyridoxin Hydrochlorid	4 mg
Nicotinamid	50 mg
Calcium Pantothenat	5 mg
Cyanocobalamin	10 µg

Sonstige Bestandteile:

Natriummethyl-4-Hydroxybenzoat (E 219)	1,14 mg
--	---------

4. ANWENDUNGSGEBIETE

Therapie von Vitamin B-Mangelkrankungen.
Substitution bei erhöhtem Bedarf.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile.

6. NEBENWIRKUNGEN

Allergische Reaktionen sind möglich.

Bei zu rascher intravenöser Injektion von Thiamin kann es zu Exanthenen, Atemnot, Kreislaufkollaps, sowie zu schweren anaphylaktischen Schockzuständen kommen; ebenso wurden Bradykardie und Blockade der vegetativen Ganglien und der Muskelendplatten bei hohen intravenösen Dosen von Thiamin beobachtet. Nicotinamid kann in seltenen Fällen zu Krämpfen, Durchfall, Hypotension, Tachykardie und Hyperglykämie führen. Panthothensäure und Pyridoxin können in sehr seltenen Fällen allergische Hautreaktionen provozieren.

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERARTEN

Rind, Pferd, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, Nerz, Fuchs

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären, subkutanen und sehr langsamen intravenösen Injektion.

Pferd, Rind:	20 - 30 ml
Fohlen, Kalb:	10 - 15 ml
Schaf, Ziege:	3 - 10 ml
Schwein:	10 - 20 ml
Ferkel bis 10 kg:	0,5 - 2 ml
Ferkel von 10 bis 30 kg:	2 - 5 ml
Hund bis 10 kg	0,5 - 2 ml
Hund über 10 kg	2 - 4 ml
Katze, Nerz, Fuchs:	0,5 - 2 ml

Wiederholung der Behandlung nach einer Woche.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Keine bekannt.

10. WARTEZEIT

0 Tage.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C).

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen des Behältnisses: 3 Tage.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Die intravenöse Anwendung sollte sehr langsam erfolgen (siehe Abschnitt „Nebenwirkungen“).

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Bei versehentlicher Selbstinjektion ist ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und Laktation ist nicht belegt.

Überdosierung

Bei Überdosierung kann es zu Erbrechen und Durchfall kommen.

Inkompatibilitäten

Da keine Kompatibilitätsstudien durchgeführt wurden, darf dieses Tierarzneimittel nicht mit anderen Tierarzneimitteln gemischt werden.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie ihren Tierarzt, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

November 2014

15. WEITERE ANGABEN

Z. Nr.: 8-00395

Packungsgrößen:

Durchstechflaschen zu 50 ml, 100 ml, 12 x 50 ml und 12 x 100 ml.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Für den Tierarzt:

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung.