
GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

VETREN® 60.000 I.E./100g - Gel**Wirkstoff:** Heparin-Natrium

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Vetren jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Vetren und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Vetren beachten?
3. Wie ist Vetren anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Vetren aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST VETREN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Vetren 60.000 I.E./100g - Gel wird angewendet

- zur unterstützenden Behandlung bei akuten Schwellungszuständen nach stumpfen Verletzungen
- zur unterstützenden Behandlung bei oberflächlicher Venenentzündung zusätzlich zur Kompressionstherapie (durch Bandagen oder Strümpfe)

Der im Gel enthaltene Wirkstoff Heparin hat eine die Entzündung und Blutgerinnung hemmende Wirkung. Er verhindert auf diese Weise die Entstehung von Blutgerinnseln und führt zu einem schnellen Rückgang von Blutergüssen. Außerdem wirkt Heparin abschwellend und durchblutungsfördernd, sodass Schwellungen schnell abklingen und Spannungsgefühl und Schmerzen nachlassen.

Die besondere Beschaffenheit der Gelgrundlage ermöglicht es, dass die Wirkstoffe rasch von der Haut aufgenommen werden und tief in das Gewebe eindringen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON VETREN BEACHTEN?**Vetren darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Heparin oder einen der sonstigen Bestandteile von Vetren sind.
- wenn Heparin bei Ihnen eine starke Verminderung der Blutplättchen auslöst oder schon einmal ausgelöst hat (allergisch bedingte Thrombozytopenie Typ II), weil dadurch ein erhöhtes Risiko für die Bildung eines Blutgerinnsels besteht.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Vetren ist erforderlich,

- falls Sie schwanger sind. Vermeiden Sie eine großflächige Langzeitanwendung während der Schwangerschaft.

- falls Sie eine offene Verletzung haben. Wenden Sie Vetren nur bei intakter Haut an, nicht bei offenen Verletzungen.

Bringen Sie Vetren nicht mit den Augen und den Schleimhäuten in Berührung. Nehmen Sie daher Augen-, Nasen- und Mundpartie von einer Behandlung aus.

Heparin kann eine starke Verminderung der Blutplättchen auslösen (allergisch bedingte Thrombozytopenie Typ II), dadurch besteht ein erhöhtes Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln (Thrombosen). Sollten Sie Anzeichen für ein Blutgerinnsel bemerken (Spannungsgefühle, Schmerzen, die sich durch Hochlagern des Armes/Beines bessern; Schwellungen, Überwärmung, stärkere Abzeichnung der oberflächlichen Venen), setzen Sie Vetren sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.

Während der Behandlung mit Vetren sollten keine Spritzen in den Muskel verabreicht werden, weil erhöhte Neigung zu Blutergüssen besteht.

Wenden Sie Vetren-Gel nicht unter einem dicht abschließenden Verband (Okklussionsverband) an.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Behandlung nicht eintritt, holen Sie ehestens eine ärztliche Beratung ein.

Bei Anwendung von Vetren mit anderen Arzneimitteln

Bei sehr großflächiger Anwendung und gleichzeitiger Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Mitteln (Antikoagulantien, Acetylsalicylsäure) kann die Blutungsneigung verstärkt werden.

Weitere Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bei äußerlicher Anwendung nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillperiode grundsätzlich nur aus zwingenden Gründen angewendet werden sollen, ist in jedem Fall vor der Anwendung von Vetren ein Arzt zu befragen. Der Eintritt einer Schwangerschaft ist dem Arzt zu melden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Vetren hat keinen oder vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Vetren

Vetren - Gel enthält Macroglycerolricinoleat, welches Hautreizungen hervorrufen kann.

3. WIE IST VETREN ANZUWENDEN?

Wenden Sie Vetren-Gel immer genau nach der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Dosierung an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Verteilen Sie 2-3 mal täglich einen etwa 3 - 5 cm langen Gelstrang (bei Bedarf auch mehr) dünn und gleichmäßig auf der Haut über den erkrankten Gebieten sowie deren Umgebung.

Das Gel zieht schnell in die Haut ein, daher ist ein Einmassieren nicht nötig. Massieren Sie Vetren-Gel bei einer Venenentzündung keinesfalls ein, sondern tragen Sie es dünn auf und lassen Sie es einziehen um eine zusätzliche Reizung der entzündeten Region zu vermeiden.

Die Anwendungsdauer richtet sich nach der Schwere und Dauer des Krankheitsbildes.

Bei Venenentzündung wird eine Anwendung über 1 - 2 Wochen empfohlen.

Bei akuten Schwellungszuständen nach stumpfen Verletzungen wird die Anwendung für ca. 10 Tage empfohlen.

Kinder und Jugendliche

Zur Anwendung von Vetren bei Kindern und Jugendlichen liegen keine ausreichenden Daten vor, daher können keine Dosierungsempfehlungen gemacht werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Vetren angewendet haben, als Sie sollten

Eine Überdosierung ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht bekannt.

Wenn Sie die Anwendung von Vetren vergessen haben

Verwenden Sie nicht die doppelte Menge von Vetren, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Vetren abbrechen

Das Auftreten von Gewöhnungseffekten ist nicht bekannt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Vetren-Gel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Gefäßerkrankungen

Häufigkeit nicht bekannt (auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar): allergisch bedingte Entzündung der Blutgefäße, oft in Verbindung mit Hautausschlägen

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Sehr selten (betrifft weniger als 1 Patienten von 10.000): allergische Reaktionen wie Juckreiz und Rötung der Haut

Brechen Sie in solchen Fällen die Behandlung ab. Die Überempfindlichkeitsreaktionen verschwinden in der Regel nach Absetzen des Medikamentes. Sollten die Überempfindlichkeitsreaktionen auch nach dem Absetzen des Medikamentes bestehen bleiben, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Österreich

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5

1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST VETREN AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und auf der Tube nach "Verwendbar bis:" bzw. „Verw. bis:" angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Vetren enthält

Der Wirkstoff ist :
0,250 - 0,543 g Heparin-Natrium (entspr. 60.000 I.E.)pro 100 g Gel .

Die sonstigen Bestandteile sind:
Macrogolglycerolricinoleat, ätherisches Latschenkieferöl, Carbomer 940, 2-Propanol ,
Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.

Wie Vetren aussieht und Inhalt der Packung

Vetren - Gel ist ein klares, farbloses Gel in einer Aluminiumtube.
Die Packungsgrößen sind 40g und 100g.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber:

Takeda Pharma Ges.m.b.H.
1120 Wien

Hersteller:

Takeda GmbH, Betriebsstätte Singen / Deutschland

Z.Nr. 1-21320

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im März 2014.