

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Vinceel - Hals spray

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Vinceel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Vinceel beachten?
3. Wie ist Vinceel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Vinceel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Vinceel und wofür wird es angewendet?

Vinceel ist ein homöopathisches Arzneimittel. Solche Arzneimittel setzen sich aus verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln zusammen, deren Arzneimittelbilder einander ergänzen. Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

Zur Linderung von Beschwerden bei Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Vinceel beachten?

Vinceel darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Apis mellifica, Atropa bella-donna, Calendula officinalis, Echinacea purpurea, Phytolacca americana, Plantago major, Salvia officinalis, Vincetoxicum hirundinaria, gegen Korbblütler, Bienengift oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Gegen Korbblütler oder Bienengift

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt enthält Ethanol und darf deshalb nicht inhaliert werden.

Bei Auftreten von Fieber ist ein Arzt aufzusuchen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Solche Reaktionen sind zumeist harmlos. Sollten sich die Beschwerden nicht bessern, dann ist das Arzneimittel abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder angewendet werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Arzneimittel abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittelprüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

Nicht in die Augen sprühen.

Nicht in die Nase sprühen.

Kinder

Vinceel ist für die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren nicht geeignet.

Die Anwendung von Vinceel darf bei Kindern von 6 bis 11 Jahren nur nach ärztlicher Anordnung erfolgen.

Anwendung von Vinceel zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Anwendung von Vinceel zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.

Die Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit darf nur nach Empfehlung des Arztes erfolgen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Vinceel hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Vinceel enthält Ethanol

Dieses Arzneimittel enthält geringe Mengen an Ethanol (Alkohol), weniger als 100 mg pro Dosis.

3. Wie ist Vinceel anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

3 bis 5 mal täglich 1 bis 2 Sprühstöße aufsprühen. Falls erforderlich bis zu 8-mal täglich 1 Sprühstoß anwenden.

Anwendung bei Kindern

Kinder von 6 bis 11 Jahren:

3 mal täglich 1 Sprühstoß aufsprühen. Falls erforderlich bis zu 6-mal täglich 1 Sprühstoß anwenden. Die Anwendung von Vinceel darf bei Kindern von 6 bis 11 Jahren nur nach ärztlicher Anordnung erfolgen.


Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Kinder unter 6 Jahren:

Vinceel ist für die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren nicht geeignet.

Spray zur Anwendung in der Mundhöhle. Vinceel dient zum Einsprühen in die Mundhöhle.

Bedienungsanleitung:



1. Sprühdüse drehen, bis sie waagrecht steht.
2. Den Zeigefinger auf den Sprühkopf legen. Vor dem erstmaligen Benutzen von Angin-Heel-Halsspray den Sprühkopf mehrmals kurz drücken, bis ein feiner Sprühnebel entsteht.
3. Die Sprühdüse in die Mundöffnung einführen und auf die entzündete Stelle richten.
4. Den Sprühkopf so oft betätigen, wie in der Dosierungsempfehlung angegeben. Dabei die Flasche möglichst senkrecht halten.

Eltern leiten Kinder von 6 bis 11 Jahren an, den Sprühstoß beim Einsprühen in die Mundhöhle nicht einzuatmen.

Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, dass die Sprühflasche nur von einer Person benutzt wird.

Dieses Produkt enthält Ethanol und darf deshalb nicht inhaliert werden.

Um eine Inhalation zu vermeiden darf während der Verabreichung des Sprühstoßes nicht eingeatmet werden.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge von Vinceel angewendet haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

Wenn Sie die Anwendung von Vinceel vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Allergische Reaktionen wie z.B.: Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut mit Rötung, Schwellung, Juckreiz wurden beobachtet.

Angaben zur Häufigkeit des Auftretens von Nebenwirkungen können nicht gemacht werden.

Beenden Sie die Anwendung von Vinceel wenn diese Nebenwirkungen bei Ihnen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Vinceel aufzubewahren?

Nach dem ersten Öffnen nicht über 30 ° C lagern.

Für das ungeöffnete Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach (Verwendbar bis:) angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Vinceel enthält

Die Wirkstoffe von 10 g Vinceel sind:

Apis mellifica D7 0,125 g; Atropa bella-donna D5 0,125 g; Calendula officinalis D3 0,125 g; Echinacea purpurea D5 0,125 g; Phytolacca americana D3 0,125 g; Plantago major D3 0,125 g; Salvia officinalis D3 0,125 g; Vincetoxicum hirundinaria D5 0,125 g

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol, gereinigtes Wasser, Glycerol 85 %

Wie Vinceel aussieht und Inhalt der Packung

Vinceel ist eine farblose Lösung (Spray zur Anwendung in der Mundhöhle). Die Lösung wird in Flaschen aus Braunglas mit gasfreiem Pumpsystem in einem Umkarton geliefert.

Eine Packung enthält 20 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2 - 4

76532 Baden-Baden

Deutschland

Vertrieb:

Schwabe Austria GmbH

Richard-Strauss-Straße 13

1230 Wien, Österreich

Z. Nr.: 335700

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2019