Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Zovirax 5%-Creme

Wirkstoff: Aciclovir

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Zovirax-Creme und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Zovirax-Creme beachten?
3. Wie ist Zovirax-Creme anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Zovirax-Creme aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Zovirax-Creme und wofür wird sie angewendet?

Zovirax-Creme enthält einen Virus-Hemmstoff, der eine hohe Aktivität gegen bestimmte Viren der Herpes-Gruppe aufweist.

Zovirax-Creme wird angewendet zur Lokalbehandlung von Fieberblasen (Herpes labialis) oder schmerzhaften Bläschen im Genitalbereich (Herpes genitalis).

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Zovirax-Creme beachten?

Zovirax-Creme darf nicht angewendet werden

wenn Sie allergisch gegen Aciclovir, Valaciclovir, Propylenglycol oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Zovirax-Creme anwenden.
Die Creme sollte nicht auf die verletzte Schleimhaut im Mund und in der Scheide aufgebracht werden, da dies zu vorübergehenden Reizerscheinungen führen könnte.

Zovirax-Creme darf keinesfalls am Auge angewendet werden.

Wenn Ihre körpereigene Immunabwehr stark geschwächt ist, sollten Sie vor der Anwendung von Zovirax-Creme einen Arzt um Rat fragen.

Zovirax-Creme sollte nicht zur Vorbeugung der Herpes simplex-Infektionen eingesetzt werden.

Wenn Sie Zovirax-Creme mit dem Finger auf die Lippen auftragen, sollten Sie die Hände vor und nach dem Auftragen gründlich reinigen.

Anwendung von Zovirax-Creme zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bisher wurden bei topischer Anwendung keine klinisch signifikanten Wechselwirkungen beobachtet.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Über die Anwendung von Zovirax-Creme während der Schwangerschaft entscheidet im Einzelfall der Arzt. Bei Verwendung von Zovirax-Creme ist die Aufnahme des Wirkstoffs in den Körper sehr gering.

Bei Herpes-Hauterkrankungen auf oder nahe der Brust soll nicht gestillt werden. Die Dosis, die von einem gestillten Baby nach Anwendung von Zovirax-Creme an der Mutter erreicht wird, ist zu vernachlässigen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Zovirax-Creme

Die Creme enthält unter anderem Propylenglycol, Cetylstearylalkohol und Natriumdodecylsulfat.

Dieses Arzneimittel enthält 800 mg Propylenglycol pro 2g Tube entsprechend 400 mg/g. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.
Wenden Sie bei Babys unter 4 Wochen mit offenen Wunden oder großflächigen Hautverletzungen oder -schäden (wie Verbrennungen) dieses Arzneimittel nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an.

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Dieses Arzneimittel enthält 15 mg (0,75 % w/w) Natriumdodecylsulfat pro 2g Tube entsprechend 7,5 mg/g. Natriumdodecylsulfat kann lokale Hautreaktionen (wie ein stechendes oder brennendes Gefühl) hervorrufen oder Hautreaktionen verstärken, die durch andere auf dieselbe Hautstelle aufgebrachte Produkte verursacht werden.

3. Wie ist Zovirax-Creme anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Zovirax-Creme soll 5 x täglich in vierstündigen Intervallen auf die befallenen Hautstellen aufgetragen werden, wobei die Anwendung über Nacht ausgelassen wird.

Die Behandlungsdauer beträgt üblicherweise 4 Tage bei Herpes-Infektionen im Lippenbereich (Fieberblasen) und 5 Tage bei Herpes-Infektionen im Genitalbereich, kann jedoch im Einzelfall auf Anordnung des Arztes auf bis zu 10 Tage ausgedehnt werden.

Die Behandlung mit Zovirax-Creme sollte zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach Ausbruch der Infektion begonnen werden. Bei häufig wiederkehrenden Infektionen sollte die Behandlung möglichst schon dann begonnen werden, wenn erste Anzeichen wie Jucken, Rötung und Spannungsgefühl auftreten (Prodromalstadium).

Wenn Sie eine größere Menge von Zovirax-Creme angewendet haben, als Sie sollten

Auch bei Verschlucken des gesamten Inhaltes einer 10 g Tube Zovirax-Creme, die 500 mg Aciclovir enthält, sind keine unerwünschten Wirkungen zu erwarten.

Wenn Sie die Anwendung von Zovirax-Creme vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Setzen Sie die Anwendung wie gewohnt fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

sehr häufig	*mehr als 1 von 10 Behandelten*
häufig	*weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten*
gelegentlich	*weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1 000 Behandelten*
selten	*weniger als 1 von 1 000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten*
sehr selten	*weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle*

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Gelegentlich:

Vorübergehendes Brennen oder Stechen auf den behandelten Hautabschnitten nach dem Auftragen der Zovirax-Creme.
Leichte Trockenheit oder Schuppung der Haut, Jucken.

Selten:

Hautrötung, lokale Hautentzündung (Kontaktdermatitis).

Erkrankungen des Immunsystems

Sehr selten:

Akute Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich Ödeme (Wasseransammlung im Gewebe) und Nesselausschlag (Urtikaria).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
AT-1200 WIEN
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: http://www.basg.gv.at/

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Zovirax-Creme aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern.
Nicht im Kühlschrank lagern.
Nach dem Öffnen 10 Tage haltbar.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Tube und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Zovirax-Creme enthält

- Der Wirkstoff ist: Aciclovir. 1 g Creme enthält 50 mg Aciclovir.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Poloxamer, Cetylstearylalkohol, Natriumdodecylsulfat (E 487), weiße Vaseline, flüssiges Paraffin, Propylenglycol, Dimethicon, Glycerolmonostearat, Macrogol-100-stearat, gereinigtes Wasser.

Wie Zovirax-Creme aussieht und Inhalt der Packung

Zovirax-Creme ist eine weiße Creme.
Tube mit 2 g oder 10 g.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:
GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Wien

Hersteller:
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Dublin, Irland

Zulassungsnummer

1-18064

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2022.