

Gebrauchsinformation

aar vir

Wirkstoff: Echinacea-pallida-Wurzel-Trockenextrakt

Zusammensetzung

1 überzogene Tablette enthält:

Trockenextrakt aus Echinacea-pallida-Wurzel (5-7:1) 100mg

Auszugsmittel: Methanol 30% (V/V)

Sonstige Bestandteile:

Arabisches Gummi, Calciumcarbonat, Carmellose-Natrium, Carnaubawachs, Cellulosepulver, Cellacefat, Eisenoxide und -hydroxide E 172, hochdisperses Siliciumdioxid, Kartoffelstärke, Magnesiumstearat, Sucrose (Saccharose), Talkum, Triacetin.

1 überzogene Tablette enthält 185mg Kohlenhydrate (entsprechend 0,015 BE)

Darreichungsform:

Originalpackung mit 20 überzogene Tabletten (N1),

Originalpackung mit 50 überzogene Tabletten (N2),

Originalpackung mit 100 überzogene Tabletten (N3).

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

aar pharma

GmbH & Co. KG

Alleestr. 11

42853 Remscheid

Anwendungsgebiete:

Zur unterstützenden Therapie grippeartiger Infekte.

Was müssen Sie vor der Einnahme von aar vir beachten?

Wann dürfen Sie aar vir nicht anwenden?

Bei Überempfindlichkeit gegen Echinacea pallida radix (Echinacea-pallida-Wurzel) oder gegen einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels oder gegen andere Korbblütler.

Patienten, die immunsuppressiv behandelt werden (z.B. nach Transplantationen), sollen aar vir nicht einnehmen.

Aus grundsätzlichen Erwägungen dürfen aar vir nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw.

Leukämie-ähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), multipler Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektionen, und Autoimmunerkrankungen.

Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden. Dabei ist zu beachten, dass auch die Anwendung bei Frauen im gebärfähigen Alter, die nicht verhüten, sorgfältig abgewogen werden muss, da eine möglicherweise vorliegende Schwangerschaft noch nicht bekannt ist.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung von aar vir bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise:

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von aar vir ist erforderlich

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von aar vir

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte nehmen Sie aar vir erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bei allergisch veranlagten Patienten besteht möglicherweise ein erhöhtes Risiko eines anaphylaktischen Schocks. Fragen Sie erst Ihren Arzt, ob Sie aar vir anwenden dürfen.

Wechselwirkungen:

Bei Einnahme von aar vir mit anderen Arzneimitteln:

Es wurden keine systematischen Wechselwirkungsstudien durchgeführt.

Eine Verstärkung oder Abschwächung der Wirkung anderer Arzneimittel kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Dosierungsanleitung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihr Arzt keine anders lautenden Angaben zur Dosierung gemacht hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da aar vir Dragees sonst nicht wirken können.

Wieviel und wie oft sollten Sie aar vir Dragees einnehmen?

Zweimal täglich sollte 1 überzogene Tablette eingenommen werden.

Was ist zu beachten, wenn aar vir in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigt oder versehentlich)?:

Wenn Sie eine bis 2 Einzeldosen mehr aar vir eingenommen haben, als Sie sollten, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Bei Einnahme von deutlich darüber hinausgehenden Mengen benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme / Anwendung von aar vir vergessen haben

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie Ihnen vom Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Art der Anwendung:

aar vir soll mit ausreichend Flüssigkeit (1 Glas, vorzugsweise Wasser) unzerkaut geschluckt werden.

Dauer der Anwendung:

Wie lange sollten Sie aar vir Dragees einnehmen?

aar vir sollten ohne ärztlichen Rat nicht länger als 10 Tage kontinuierlich eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von aar vir zu stark oder zu schwach ist.

Nebenwirkungen:

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen wie z. B. Juckreiz und Hautrötungen auftreten.

Die Häufigkeit der Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

aar vir Dragees sollen nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nicht über 25°C und in der Originalpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Arzneimittel, für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information: [Monat/Jahr].