

**Gebrauchsinformation:** Information für den Anwender

**Angi Truw N**

Tabletten

Wirkstoffe: Apis mellifica Trit. D3, Chamomilla recutita Ø, Echinacea Ø

**Liebe Patientin, lieber Patient!**

**Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Angi Truw N jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Angi Truw N und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Angi Truw N beachten?
3. Wie ist Angi Truw N einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Angi Truw N aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

**1. WAS IST ANGI TRUW N UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Angi Truw N ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erkältungskrankheiten mit Halsschmerzen und Heiserkeit.

**2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ANGI TRUW N BEACHTEN?**

**Angi Truw N darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Bienengift, Kamille, Echinacea (Sonnenhut) oder andere Korbblütler oder einen der sonstigen Bestandteile von Angi-Truw N sind.

Nicht anwenden in der Schwangerschaft und bei Kindern unter 1 Jahr.

Aus grundsätzlichen Erwägungen ist Angi Truw N nicht anzuwenden bei fortschreitenden Systemerkrankungen (wie Tuberkulose, Sarkoidose), systemischen Erkrankungen des weißen Blutzellsystems (z.B. Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen), Autoimmunerkrankungen (z.B. entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), multipler Sklerose), Immundefizienz (AIDS/HIV-Infektionen), Immunsuppression (z.B. nach Organ- oder Knochenmarktransplantation, Chemotherapie bei Krebserkrankungen), chronischen Viruserkrankungen.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Angi Truw N ist erforderlich:**

Bei Fieber, das länger als drei Tage bestehen bleibt oder über 39°C ansteigt, sowie bei anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Patienten mit atopischen Erkrankungen (z.B. Neurodermitis, allergisches Asthma, Heuschnupfen) besteht möglicherweise ein erhöhtes Risiko eines anaphylaktischen Schocks. Deshalb sollte Angi Truw N von Patienten mit atopischen Erkrankungen nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Kinder:**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern von 1 bis 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Stillzeit:**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Angi Truw N in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Bei Einnahme von Angi Truw N mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Angi Truw N:**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Angi Truw N Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**3. WIE IST ANGI TRUW N EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Angi Truw N immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

**Soweit nicht anders verordnet ist die übliche Dosis für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:**

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, je 1 Tablette einnehmen.

Eine über eine Woche hinausgehende häufige Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3mal täglich 1 Tablette einnehmen.

**Art der Anwendung**

Zum Einnehmen. Lassen Sie bitte die Tablette im Mund zergehen.

**Dauer der Anwendung**

Angi Truw N sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 10 Tage angewendet werden.

### **Hinweis für den Fall der Überdosierung:**

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Angi Truw N zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Angi Truw N Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

### **Mögliche Nebenwirkungen:**

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall, anaphylaktischer Schock, Stevens Johnson Syndrom beobachtet. Bei Patienten mit atopischen Erkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Neurodermitis, allergisches Asthma) können allergische Reaktionen ausgelöst werden. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen. Die Einnahme von Arzneimitteln mit Zubereitungen aus Sonnenhut wird mit dem Auftreten von Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht (Multiple Sklerose (Encephalitis disseminata), Erythema nodosum, Immunothrombozytopenie, Evans Syndrom, Sjörgen Syndrom mit renaler tubulärer Dysfunktion). Bei Langzeitanwendung (länger als 8 Wochen) können Blutbildveränderungen (Verminderung der weißen Blutzellen (Leukopenie)) auftreten.

Es wurde über schwere allergische Reaktionen (Atemnot, Gesichtsschwellung, Kreislaufkollaps, allergischer Schock) bei Schleimhautkontakt nach Anwendung von flüssigen Kamillenzubereitungen berichtet. Die Häufigkeit ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

## **5. WIE IST ANGI TRUW N AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett sowie der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 25°C aufbewahren.

**Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:**

Nach Anbruch soll Angi Truw N nicht länger als 3 Monate verwendet werden.

**6. WEITERE INFORMATIONEN****Was Angi Truw N enthält:**

In 1 Tablette sind verarbeitet als Wirkstoffe:

Apis mellifica Trit. D3            20 mg

Chamomilla recutita Ø            20 mg

Echinacea Ø                        20 mg

Die sonstigen Bestandteile sind Lactose-Monohydrat und Magnesiumstearat.

**Wie Angi Truw N aussieht und Inhalt der Packung:**

Tabletten, Originalpackungen mit 50 Stück.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

TRUW Arzneimittel GmbH

Postfach 3150

D-33261 Gütersloh

Telefon-Nr.: 05241-30074 0

Telefax-Nr.: 05241-30074 15

e-mail: info@truw.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet [ ].

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 6185011.00.00