

## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

### ***Antiseptische Wund + Brand Creme***

Wirkstoffe: Dexpanthenol 0,05 g / 1 g , Chlorhexidinbis(D-gluconat) 0,005 g / 1 g

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Antiseptische Wund + Brand Creme jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Antiseptische Wund + Brand Creme und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Antiseptische Wund + Brand Creme beachten?
3. Wie ist Antiseptische Wund + Brand Creme anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Antiseptische Wund + Brand Creme aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. WAS IST ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?**

Antiseptische Wund + Brand Creme ist ein Hautdesinfektionsmittel.

Antiseptische Wund + Brand Creme wird zur antiseptischen Behandlung von oberflächlichen Wunden wie Schürf-, Riss-, Platz- und Kratzwunden, Verbrennungen 1. Grades angewendet.

#### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME BEACHTEN?**

**Antiseptische Wund + Brand Creme darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe Dexpanthenol und/oder Chlorhexidinbis(D-gluconat) oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sind,
- bei tiefen Wunden, Ulcus cruris

### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Antiseptische Wund + Brand Creme ist erforderlich:**

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung sind nicht erforderlich.

### **Bei Anwendung von Antiseptische Wund + Brand Creme mit anderen Arzneimitteln:**

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten:**

Für Antiseptische Wund + Brand Creme liegen keine klinischen Daten zur Anwendung an Schwangeren vor.  
Antiseptische Wund + Brand Creme soll während der Schwangerschaft nicht großflächig angewendet werden.

Für Antiseptische Wund + Brand Creme liegen keine klinischen Daten über eine Anwendung während der Stillzeit und zum Übergang in die Muttermilch vor.  
Stillende sollten Antiseptische Wund + Brand Creme nicht im Bereich der Brust und nicht großflächig anwenden.

Fragen Sie grundsätzlich vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Antiseptische Wund + Brand Creme:**

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

## **3. WIE IST ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME ANZUWENDEN?**

Wenden Sie Antiseptische Wund + Brand Creme immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Antiseptische Wund + Brand Creme zweimal täglich dünn auf die Wunde auftragen.  
Wenn es erforderlich ist, kann die Wunde mit einem geeigneten Verband (Pflaster, Mullverband etc.) versehen werden.

### **Dauer der Anwendung:**

Die Behandlungszeit soll 1 bis 2 Wochen nicht überschreiten. Für oberflächliche, nicht infizierte Bagatellverletzungen beträgt die optimale Anwendungsdauer 2 Wochen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Antiseptische Wund + Brand Creme zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge Antiseptische Wund + Brand Creme angewendet haben, als Sie sollten:**

Auch bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch (z. B. übermäßigem Auftragen) ist nicht mit Überdosierungserscheinungen zu rechnen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Antiseptische Wund + Brand Creme Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

**Mögliche Nebenwirkungen:**

Nach dem Auftragen kann gelegentlich ein vorübergehendes Brennen auftreten.

Sehr selten kann es nach dem Auftragen von Antiseptische Wund + Brand Creme zu Überempfindlichkeitsreaktionen an der Haut wie allergische Reaktionen vom Soforttyp kommen.

**Meldung von Nebenwirkungen:**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. WIE IST ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube bzw. Faltschachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

**Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 25 °C lagern.

**6. WEITERE INFORMATIONEN**

**Was Antiseptische Wund + Brand Creme enthält:**

Die Wirkstoffe sind Dexpanthenol und Chlorhexidinbis(D-gluconat).

1 g Creme enthält 0,05 g Dexpanthenol und 0,005 g Chlorhexidinbis(D-gluconat).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Gereinigtes Wasser, Glycerol 85 %, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Paraffin, Glycerolmonostearat 40-55, Macrogolstearat 1500, Dimeticon, Cetomacrogol 1000, Hyetellose

**Wie Antiseptische Wund + Brand Creme aussieht und Inhalt der Packung:**

Antiseptische Wund + Brand Creme ist eine weiße Creme und in der Packungsgröße mit [OP30 g, OP50 g, OP75 g, Unverkäufliches Muster 30 g] erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

*Entsprechende Angabe machen*

**Zulassungsinhaber:**

IMG GmbH & Co. KG, D-59381 Ascheberg

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im Dezember 2013 überarbeitet.**