

# Aranisan®

cor



## Mischung zum Einnehmen

### Wirkstoffe:

Atropa bella-donna Dil. D4; Coffea arabica Dil. D2;  
Convallaria majalis Ø; Crataegus Ø; Selenicereus  
grandiflorus Dil. D1.

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Aranisan® cor jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 2 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Aranisan® cor und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Aranisan® cor beachten?
3. Wie ist Aranisan® cor einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aranisan® cor aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. WAS IST ARANISAN® COR UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

**Aranisan® cor ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen.**

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehört: Besserung des Befindens bei nervös bedingten funktionellen Herz-Kreislauf-Störungen, insbesondere Herzklopfen.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ARANISAN® COR BEACHTEN?

**Aranisan® cor darf nicht eingenommen werden**

- bei gleichzeitiger Therapie mit Digitalis-Glykosiden und bei Kaliummangelzuständen.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Aranisan® cor ist erforderlich**

- bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot und bei Wasseransammlung in den Beinen, sowie bei unklaren Beschwerden. In diesen Fällen ist eine ärztliche Abklärung dringend erforderlich.
- bei Erregungsleitungsstörungen und i.v. Calcium-Therapie.
- bei Kindern unter 12 Jahren. Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die vom Arzt diesbezüglich verordneten Arzneimittel.

**Bei Einnahme von Aranisan® cor mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei der gleichzeitigen Einnahme von Aranisan® cor mit Chinidin, Calcium, Arzneimitteln zur Entwässerung, Abführmitteln und bei Langzeittherapie mit Cortison-haltigen Arzneimitteln werden Wirkung und Nebenwirkungen verstärkt.

**Bei Einnahme von Aranisan® cor zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Aranisan® cor in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Aranisan® cor:**

Dieses Arzneimittel enthält 52 Vol.-% Alkohol.

### **3. WIE IST ARANISAN® COR EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Aranisan® cor immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei **akuten Zuständen** alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 x täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei **chronischen Verlaufsformen** 1 – 3 x täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

#### **Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge Aranisan® cor eingenommen haben als Sie sollten:**

Wenn Sie eine größere Menge von Aranisan® cor eingenommen haben als Sie sollten, kann die Anwendung des Arzneimittels zu einer Vergiftung durch die Maiglöckchen – Glykoside (Convallaria majalis) führen. Bei Überdosierung mit Maiglöckchen-Glykosiden sind die Symptome wie bei einer Digitalisvergiftung zu erwarten. Hauptsymptome sind Herzrhythmusstörungen, Übelkeit und Erbrechen, Sehstörungen, Benommenheit, Verwirrtheit und Halluzinationen. Bei Überdosierung benachrichtigen Sie bitte sofort einen Arzt. Er wird entscheiden, welche Gegenmaßnahmen ggf. erforderlich sind.

Bei nur leichter Überdosierung reichen Absetzen des Präparates und eine sorgfältige Überwachung durch einen Arzt aus.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

#### **Hinweis:**

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

### **Meldung von Nebenwirkungen:**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. WIE IST ARANISAN® COR AUFZUBEWAHREN?**

#### **Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/Umkarton unter <verw. bis> angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

#### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate.

### **6. WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was Aranisan® cor enthält:**

Die Wirkstoffe sind:

#### **10 ml enthalten:**

Atropa bella-donna Dil. D4 1 ml; Coffea arabica Dil. D2 0,3 ml; Convallaria majalis Ø 0,25 ml; Crataegus Ø 1 ml; Selenicereus grandiflorus Dil. D1 0,25 ml.

Der sonstige Bestandteil ist: Ethanol 43% (m/m).

1 ml entspricht 31 Tropfen.

#### **Wie Aranisan® cor aussieht und Inhalt der Packung:**

Aranisan® cor ist eine klare, gelborange Flüssigkeit.

Packungsgröße: 100 ml Mischung.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

**WEBER & WEBER GMBH & Co. KG**  
Herschinger Str. 33, 82266 Inning/Ammersee  
Telefon: 0 81 43 / 927-0, Fax: 0 81 43 / 70 84  
[www.weber-weber.de](http://www.weber-weber.de)  
[information@weber-weber.net](mailto:information@weber-weber.net)

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im September 2016.

