

**Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Argentum D30 / Echinacea D6 aa und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Argentum D30 / Echinacea D6 aa beachten?
3. Wie ist Argentum D30 / Echinacea D6 aa anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

Argentum D30 / Echinacea D6 aa Flüssige Verdünnung zur Injektion

1. Was ist Argentum D30 / Echinacea D6 aa und wofür wird es angewendet?

Argentum D30 / Echinacea D6 aa ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Entzündungen.

Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehört zu den Anwendungsgebieten die Anregung der Abwehrkräfte bei akut-entzündlichen und fieberhaften Prozessen aller Art.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Argentum D30 / Echinacea D6 aa beachten?

Argentum D30 / Echinacea D6 aa darf nicht angewendet werden

- bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler,
- bei Säuglingen unter 1 Jahr,
- während der Schwangerschaft.

Aus grundsätzlichen Erwägungen darf die Anwendung nicht erfolgen bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, bösartigen Erkrankungen der weißen Blutzellen (Leukämie bzw. Leukämie-ähnliche Erkrankungen), entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Autoimmun-Erkrankungen, Multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen chronischen Virus-Erkrankungen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Falls nach einer Woche keine Besserung eingetreten ist sowie bei Fieber, das länger als 3 Tage bestehen bleibt oder über 39 °C ansteigt, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln in der Stillzeit Ihren Arzt um Rat.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie ist Argentum D30 / Echinacea D6 aa anzuwenden?

Wenden Sie Argentum D30 / Echinacea D6 aa immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes an.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, gelten die folgenden Dosierungen:

Einzelndosis: - für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 10 Jahre: 1 ml,
- für Schulkinder von 6 bis 9 Jahren: 0,8 ml,
- für Kleinkinder von 1 bis 5 Jahren: 0,5 ml.

Tagesdosis: In der Akutphase, die in der Regel 2 – 4 Tage dauert, wird die Einzelndosis 1 – 2 mal täglich subcutan injiziert. Anschließend erfolgen die Injektionen bis zum Abklingen der Erkrankung 2 – 3 mal wöchentlich.

Die Dosierung von Teilmengen einer Ampulle sollte mit Hilfe einer skalierten Spritze erfolgen. Angebrochene Ampullen dürfen nicht für eine spätere Injektion aufbewahrt werden, da die Sterilität dann nicht mehr gewährleistet ist.

Die subcutane Injektion erfolgt in der Regel in den Oberschenkel oder die Oberarmaußenseite bzw. in die Bauchregion. Nach Säuberung der Einstichstelle (z.B. durch Abreiben mit 70%igem Alkohol) eine Hautfalte bilden und die Injektionsnadel schräg einstechen. Den Spritzenstempel leicht zurückziehen. Sollte Blut erscheinen, wurde ein Blutgefäß getroffen. Die Injektion in diesem Fall an einer anderen Stelle wiederholen. Wenn kein Blut erscheint, langsam injizieren, anschließend die Nadel herausziehen und auf die Einstichstelle kurz mit einem Tupfer drücken. Es wird in jedem Fall empfohlen, die Injektionstechnik durch eine darin erfahrene Person zu erlernen.

Dauer der Anwendung

Wenden Sie Argentum D30 / Echinacea D6 aa ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Wochen an.

Wenn Sie die Anwendung von Argentum D30 / Echinacea D6 aa vergessen haben:

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Argentum D30 / Echinacea D6 aa Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es kann nach der subcutanen Injektion des Arzneimittels zu harmlosen Reizerscheinungen im Bereich der Einstichstelle kommen. Überempfindlichkeitsreaktionen können auftreten.

Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf den Ampullen und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Zusammensetzung

1 Ampulle enthält: Wirkstoffe: Argentum metallicum praeparatum Dil. D30 0,5 g / Echinacea angustifolia, Planta tota Rh Dil. D6 (HAB, V. 21) 0,5 g - letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Mit Natriumchlorid isotonisiert.

Darreichungsform und Packungsgröße

8 Ampullen zu 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: dialog@weleda.de

Stand der Information: März 2014