

ETIKETT / GEBRAUCHSINFORMATION

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Aseptoman

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut.

2. WIRKSTOFFE

63,1 g 2-Propanol

3. SONSTIGE BESTANDTEILE

Butan-1,3-diol, Lanolin-poly(oxyethylen)-75, Duftstoffe, gereinigtes Wasser. Enthält Wollwachs. Enthält einen Duftstoff mit (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal, Zimtaldehyd und Cumarin.

4. DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Lösung zur Anwendung auf der Haut. 150 ml, 500 ml, 1 L, 5 L

5. HINWEISE ZUR UND ART DER ANWENDUNG

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Bakterizid (incl. TbB (*Mycobacterium tuberculosis*)), fungizid, begrenzt viruzid (Ergebnisse aus In-vitro-Versuchen gegen BVDV und Vakzinia-Virus lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. HBV / HIV, HCV). Wirksam gegen unbehüllte Viren (Noro-, Rotaviren)

Dosieranleitung:

Einreiben in die trockenen Hände.

Hygienische Händedesinfektion.

konz. 30 Sek.*

Chirurgische Händedesinfektion

konz. 1,5 Min.*

*Die Hände/Unterarme müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden. Fragen zur Anwendung bitte mit dem Arzt oder Apotheker klären.

6. WARNHINWEIS, DASS DAS ARZNEIMITTEL FÜR KINDER UNERREICHBAR UND NICHT SICHTBAR AUFZUBEWAHREN IST

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

7. WEITERE WARNHINWEISE, FALLS ERFORDERLICH

Nebenwirkungen:

Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Brennen) kommen. Auch Kontaktallergien sind möglich. (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal, Zimtaldehyd und Cumarin können allergische Reaktionen hervorrufen. Auftretende Nebenwirkungen bitte dem Arzt oder Apotheker mitteilen.

Gegenanzeigen:

Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden. Aseptoman darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen 2-Propanol, (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal, Zimtaldehyd, Cumarin oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Stand der Information: 11.2020

8. VERFALLDATUM

Aseptoman ist 3 Jahre haltbar. Das Verfalldatum ist auf der Verpackung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

9. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE AUFBEWAHRUNG

Alkoholhaltig, entzündlich. Flammpunkt: 23 °C. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Elektrische Geräte erst nach Auftrocknung benutzen.

10. GEGEBENENFALLS BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE BESEITIGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER DAVON STAMMENDEN ABFALLMATERIALIEN

Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

11. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld
Tel: +49-5664-9496-0
Fax: +49-5664-8444
E-Mail: post@schumacher-online.com

Mitvertrieb:
Heck Hygiene GmbH
Ostring 1
34277 Fuldabrück

12. ZULASSUNGSNUMMER

Zul.Nr. 24562.00.00

13. CHARGENBEZEICHNUNG

Die Chargennummer ist auf dem Etikett aufgedruckt.

14. VERKAUFSABGRENZUNG

Nicht Verschreibungspflichtig. Nicht apothekenpflichtig.

15. HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Symptome bei Verschlucken größerer Mengen: Euphorie, Enthemmung, Koordinationsstörungen, gerötetes Gesicht, typischer Geruch der Atemluft; in schweren Fällen Koma. Maßnahmen: Magenspülung, notfalls künstliche Beatmung; sonst symptomatisch. Warnhinweis: Enthält Wollwachs. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) auslösen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

16. ANGABEN IN BLINDENSCHRIFT

Die Produkte sind für die Anwendung durch das Fachpersonal bestimmt. Daher sind die Angaben in Blindenschrift nicht erforderlich.