

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu, 6 mg

Hartkapseln

Wirkstoff: Chlorphenaminhydrogenmaleat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu beachten?
3. Wie ist Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu und wofür wird es angewendet?

Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu ist ein Antihistaminikum.

Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu wird angewendet zur kurzfristigen (max. 1 Woche) symptomatischen Behandlung bei

- allergischem Schnupfen und allergisch bedingter Bindehautentzündung des Auges,
- akuter Urticaria (Nesselsucht),
- Histamin-bedingtem Pruritus (Juckempfindung durch den Botenstoff Histamin), wenn eine sedierende (ruhig stellende) Wirkung angezeigt und erwünscht ist.

Nicht geeignet sind Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu zur Behandlung von lebensbedrohlichen anaphylaktischen Akutsituationen.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu beachten?

Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie allergisch gegen Chlorphenaminhydrogenmaleat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- bei Leber- und Nierenfunktionsstörungen,
- bei Unverträglichkeit gegenüber Chlorphenamin oder Dexchlorphenamin.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln einnehmen:

- Engwinkelglaukom (erhöhter Augeninnendruck, sog. grüner Star, aufgrund einer Verengung des Augenkammerwinkels),
- pyloroduodener Obstruktion (Verengung des Magenausgangs) und Blasenhalsostruktion (Verengung des Blasenausgangs).

Kinder und Jugendliche

Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu sind für Kinder nicht geeignet.

Anwendung von Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu verstärken die Wirkung von Arzneimitteln, die einen dämpfenden Einfluss auf das Gehirn haben, wie Beruhigungsmittel (Sedativa), Schlafmittel (Hypnotika) oder andere Arzneimittel mit seelischen Wirkungen (Psychopharmaka).

Worauf muss bei Allergie-Hauttests geachtet werden?

Die Reaktion von Allergie-Hauttests wird abgeschwächt. Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu sollten deshalb 4 Tage vor Durchführung der Tests abgesetzt werden.

Einnahme von Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu verstärkt die Wirkung von Alkohol!

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wenn Sie schwanger sind dürfen Sie Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu nur in schweren Krankheitsfällen unter strenger Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses einnehmen, da keine genügenden Erfahrungen vorliegen.

Wenn Sie stillen, müssen Sie bei Einnahme von Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu über mehr als einige Tage abstillen, da nicht bekannt ist, ob Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu in die Muttermilch übergehen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu können das Reaktionsvermögen vermindern. Dies gilt besonders, wenn Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu zusammen mit Beruhigungsmitteln, Schlafmitteln oder Alkohol eingenommen werden. Sie können dann auf unerwartete und plötzliche Ereignisse nicht mehr schnell und gezielt genug reagieren. Fahren Sie nicht Auto oder andere Fahrzeuge! Bedienen Sie keine elektrischen Werkzeuge oder Maschinen! Arbeiten Sie nicht ohne sicheren Halt! Beachten Sie besonders, dass Alkohol Ihre Verkehrstüchtigkeit noch weiter verschlechtert!

Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu enthält Lactose

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahren): täglich 1 bis 2 Hartkapseln Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu (entsprechend 6 bis 12 mg Chlorphenaminhydrogenmaleat) zur Nacht.

Art der Anwendung

Nehmen Sie die Hartkapseln unzerkaut mit etwas Flüssigkeit ein.

Dauer der Anwendung

Sie dürfen Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu nicht länger als eine Woche anwenden, weil es danach zu einem Nachlassen der Wirkung kommen kann.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine Einzelgabe von Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu versehentlich doppelt einnehmen, hat dies keine Auswirkungen auf die weitere Einnahme, d. h. Sie nehmen Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu danach so ein, wie sonst auch.

Bei Einnahme erheblich zu hoher Arzneimengen kann es zu einem anticholinergen Syndrom mit Ataxie (Störung im geordneten Bewegungsablauf), Erregung, Halluzinationen (Sinnestäuschungen), Muskelzittern, Konvulsionen (Schüttelkrämpfe), erweiterten Pupillen, trockenem Mund und abnorm hohem Fieber kommen.

Rufen Sie bei Auftreten dieser Krankheitszeichen den nächst erreichbaren Arzt zu Hilfe! Mögliche Behandlungsmaßnahmen sind Auslösen von Erbrechen, Magenspülung sowie Gabe von medizinischer Kohle oder von Abführmitteln. Ggf. kann ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Physostigmin gegeben werden (bei starker anticholinergem Symptomatik). Bei Krampfanfällen ist ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Diazepam geeignet.

Wenn Sie die Einnahme von Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Die Einnahme wird unverändert weitergeführt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandelte von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandelte von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

Erkrankungen der Haut

Sehr selten: Hautreaktionen

Erkrankungen des Nervensystems

Sehr häufig: Müdigkeit, Benommenheit

Sehr selten: Dyskinesien (unwillkürliche, störende Bewegungen), psychotische Reaktionen (Auftritt von Bewusstseinsstörungen)

Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes

Häufig: Mundtrockenheit

Herzerkrankungen

Sehr selten: Arrhythmien (unregelmäßige Herzschlagfolge)

Erkrankungen des Blutes

Sehr selten: Störungen des Blutsystems (Agranulozytose, eine Verminderung bestimmter weißer Blutkörperchen; thrombozytopenische Purpura, Blutungen in Haut und Schleimhäuten aufgrund einer Verringerung der Blutplättchen; aplastische Anämie, eine Verminderung der roten Blutplättchen)

Sonstige

Sehr selten: Appetitsteigerung

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. **Wie ist Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Aufbewahrungsbedingungen erforderlich.

6. **Inhalt der Packung und weitere Informationen**

Was Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu enthält

1 Hartkapsel enthält 6 mg Chlorphenaminhydrogenmaleat.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, Mikrokristalline Cellulose, Talkum, Maisstärke, Gelatine, Natriumdodecylsulfat, Farbstoffe: Indigocarmin (E 132), Titandioxid (E 171), Eisen-III-hydroxid-oxid x H₂O (E 172).

Wie Balkis Dr. Henk Schnupfenkapseln Neu aussieht und Inhalt der Packung

Hartkapseln mit Oberteil hellgrün/türkis, Unterteil weiß opak

Packung mit 20 Hartkapseln

Pharmazeutischer Unternehmer:

Recordati Pharma GmbH
Eberhard-Finckh-Str. 55
89075 Ulm
Tel. Nr. 0731 7047 - 0
Fax 0731 7047 - 297

Hersteller:

DOLORGIET GmbH & Co. KG
Otto-von-Guericke-Straße 1
53757 Sankt Augustin/Bonn
Tel.: 02241/317-0
Fax: 02241/317390
E-Mail: info@dolorgiet.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2017.

Versionscode: Z01